

6. RESÚMENES POSTERS

6.1. Hongos

1

EFFECTO DE FUNGICIDAS SINTÉTICOS EN LA CALIDAD FITOSANITARIA Y FISIOLÓGICA DE SEMILLA DE MAÍZ. [Effect of synthetic fungicides on the phytosanitary and physiological quality of corn seed]. Abraham Cordero-García, Leila Minea Vásquez-Siller, Arturo Macera-Rico, María Cristina Vega-Sánchez, Miguel Ángel Ávila-Perches, Antonio Flores-Naveda, Armando Muñoz-Urbina. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). ing_corderogarcia@outlook.com

El maíz (*Zea mays* L.) es la principal fuente de alimentación humana en América. Para el período 2009-2010 México ocupó el quinto lugar en producción a nivel mundial con 22.6 millones de toneladas. Entre las limitantes de la producción de maíz están las enfermedades ocasionadas por hongos asociados a semilla las cuales usualmente son controladas con fungicidas sintéticos. El presente trabajo estudió los efectos de fungicidas sintéticos en la vida de anaquel de semilla de maíz, considerando su calidad sanitaria y fisiológica. Se evaluaron cuatro fungicidas: Baytan, Vitavax 200, Vitavax 34F e Interthiram 480, con tres dosis: baja, media y alta, en cinco genotipos de maíz híbrido producidos por BIDASSEM®, utilizando cuatro repeticiones con 25 semillas cada una para determinar plantas normales germinadas (PNG) y con cinco semillas para las pruebas microbiológicas (malta sal agar). El número de géneros de hongos (NGH) determinado se expresó en porcentaje. Se aplicó un análisis estadístico con un diseño completamente al azar con arreglo factorial. Los géneros detectados fueron: *Fusarium*, *Penicillium*, *Aspergillus* y *Alternaria*, observándose diferencias significativas en NGH

($P=0.0226$); Interthiram obtuvo el mejor control en los genotipos CI 2A, CI17 y CI 3B, L17, detectando un género de hongo en cada uno de ellos, con una germinación que fluctuó entre 92% y 96%. Por lo cual, se concluye que Interthiram 480 representa una alternativa potencial de protección fitosanitaria de semilla de maíz.

2

EFFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE EXTRACTOS VEGETALES Y *Ganoderma lucidum* Curtis CONTRA LA PUDRICIÓN RADICULAR (*Phytophthora cinnamomi* Rands) DEL LIMÓN MEXICANO *Citrus aurantifolia* Christm Swingle. [Biological effectiveness of plant extracts and *Ganoderma lucidum* Curtis against root rot (*Phytophthora cinnamomi* Rands) of Mexican lemon *Citrus aurantifolia* Christm Swingle]. Juan Pérez-Salgado, María Divina Ángel -Ríos, Luz Patricia Ávila -Caballero Jorge Bello -Martínez, Erika Pérez-Ángel. Universidad Autónoma de Guerrero. Junpe242003@yahoo.com

El limón mexicano es un producto de exportación que genera grandes ganancias anuales, sin embargo es afectado por enfermedades como la pudrición radicular (*Phytophthora cinnamomi*). En este trabajo se evaluó la efectividad biológica de *Tagetes lucida* Cav, *Melia azedarach* L, *Ricinus communis*, *Amphipterygium adstringens* Schldtl, *Nicotiana glauca* Graham y *Ganoderma lucidum* contra *P. cinnamomi* como alternativa de control. El material colectado se secó a la sombra, se obtuvieron los extractos etanólicos por arrastre de vapor en equipo Soxhlet, usando el Rotavapor ECO R52 y filtración-esterilización de extractos en bomba de vacío Rocker con filtros membrana millipore. Se colectó suelo y raíces de limón infectados en etapa de crecimiento con síntomas de la enfermedad para

realizar los aislados y confirmar los postulados de Koch. Se aplicaron tres concentraciones: 50, 100 y 150µL diluidas en solución salina, en cajas Petri con PDA y *P. cinnamomi* evaluando; tratamiento, tiempos (24 y 48 h), concentración y sus interacciones. Se realizó un ANOVA y comparación de medias (Tukey $\alpha=0.05$). El tratamiento más efectivo contra este hongo, fue *A. adstringens* con inhibición micelial de 57.23 %, seguido de *N. glauca* (53.67%). La concentración con mayor efectividad fue: 150µL con 48.77%, mientras que la de 50 µL tuvo 32.09 %. El mejor tiempo de inhibición micelial, fue a 24 horas con 54.54 % de inhibición micelial.

3

INCIDENCIA DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN SEMILLAS DE *Pinus montezumae* LAMB. DURANTE SU ALMACENAMIENTO BAJO DOS HUMEDADES RELATIVAS. [Incidence of phytopathogenic fungi in seeds of *Pinus montezumae* Lamb. during its storage under two relative humidity]. Merari Sujey Vázquez-López, Mario Ernesto Vázquez-Badillo, Adriana Antonio-Bautista, Arturo Mancera-Rico. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). vaz.lop_1093@hotmail.com

Entre la problemática del almacenamiento *ex situ* del germoplasma forestal se encuentran los daños ocasionados por hongos, siendo los patógenos de mayor transmisión por semilla. El objetivo fue identificar y cuantificar los géneros de hongos fitopatógenos en semillas de *Pinus montezumae* Lamb. durante su almacenamiento por 180 días bajo dos humedades relativas (HR). Las semillas provenientes del banco de germoplasma de la CONAFOR, fueron suspendidas en recipientes con soluciones sobresaturadas, sal de grano para 60% y sulfato de amonio para 80% de HR, se mantuvieron a 5°C. Los

muestreos se realizaron a los 0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días, utilizando tres repeticiones de 10 semillas, se desinfectaron con NaClO al 1% y sembraron en medio de cultivo Malta Sal Agar, posteriormente se incubaron durante 7 días a 28-30°C y se evaluó la micobiota. Se identificaron géneros por la morfología de las colonias con claves taxonómicas. Se aplicó un diseño experimental completamente al azar y se realizó una prueba de comparación de medias (Tukey $P < 0.05$). En ambas humedades los géneros presentes fueron: *Fusarium*, *Penicillium*, *Alternaria*, y *Rhizopus*. A 60% de HR se observó el mayor porcentaje de semillas libres de hongos (66.19%). La mayor incidencia de géneros (2.16) se presentó a los 30 y 60 días. Únicamente a los 150 días a 80% de HR se observó *Aspergillus* (0.11%). *Alternaria* se redujo significativamente conforme avanzaron los muestreos, en cambio *Penicillium* incrementó y *Fusarium* permaneció constante.

4

DISEÑO Y APLICACIÓN DE BIO-RECUBRIMIENTOS CON ADICIÓN DE ANTIFÚNGICOS NATURALES PARA EXTENDER LA VIDA POSTCOSECHA DE FRESA (*Fragaria x ananassa*). [Design and application of bio-coatings with natural antifungals to extend life postharvest strawberry (*Fragaria x ananassa*)]. Maria Fernanda Vargas-Torrico, Miguel Ángel Aguilar-Méndez, Cinthya Nathaly Quiroz-Reyes, Salvador Valle-Guadarrama. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA)-Legaria. fernanda_vargast@hotmail.com

Se estudió el uso de carboximetilcelulosa (CMC), gelatina y extractos con actividad antifúngica (ECA) extraídos de cáscara de aguacate y de coco en el diseño de películas bio-poliméricas, para evaluar permeabilidad al vapor de agua (McHugh

1993) y pruebas *in vitro* (NOM-111-SSA1-1994). Se empleó un diseño factorial de 2³, las variables de estudio fueron la concentración de glicerol (0.25, 0.30, 0.35) %, pH (4-5-6) y de ECA (200-300-400) ppm. Se evaluó *in vitro* e *in situ* el efecto de ECA sobre el *Rhizopus stolonifer* y *Aspergillus niger*. A través de superficies de respuestas, se seleccionaron las formulaciones con 0.5% CMC, 0.5% gelatina, 0.25%, pH 6 y 200 ppm de ECA, debido a que obtuvieron una permeabilidad al vapor de agua de 2.07 x 10⁻⁸ g m/ m² d-1 Pa-1 y mayor inhibición de hongos (0.5 cm). Las formulaciones *in situ* mostraron que la incorporación de ECA logra reducir en un 40% la infección de frutos de fresa inoculados con *R. stolonifer* y *A. niger*, además de que reduce la pérdida de peso. Los frutos fueron acondicionados a 4°C a lo largo del almacenamiento. Adicionalmente se evaluaron los frutos recubiertos a través de un panel sensorial de jueces no entrenados, los cuales indicaron aceptación en cuanto al sabor hasta el día 11. La incorporación de recubrimientos es una excelente alternativa para controlar la infección ocasionada por hongos en fresa.

5

SITUACIÓN FITOPATOLÓGICA DE LAS ROYAS DEL TRIGO EN VARIEDADES EN EL NORTE DE SINALOA.

[Phytopathological situation of wheat rusts in varieties growth in the North of Sinaloa]. Elizabeth García-León¹, María Florencia Rodríguez-García², Jaime Macías Cervantes¹, Genny Llaven-Valencia¹ y Javier Valenzuela-Valenzuela³. ¹INIFAP-CEVAF, Sinaloa. ²INIFAP-CEVAMEX, México. ³Junta local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, Sinaloa. garcia.elizabeth@inifap.gob.mx.

El uso de un número limitado de variedades para siembras comerciales en el Norte de Sinaloa es propicio para el desarrollo de enfermedades como

las royas, que con la aparición constante de razas favorece la pérdida de resistencia de las variedades en poco tiempo. Por ello, es necesario evaluar continuamente el material disponible para siembra. En el ciclo O-I/2018-19 se sembraron 37 mil ha de trigo harinero: var. Borlaug 100 F2014, Norman F2008, Onavas F2009, Villa Juárez F2009 y cristalino: Cirno C2008 y Quetchehueca ORO C2013, en las cuales se evaluó su reacción en campo ante *P. triticina* y *P. striiformis* f. sp. *tritici*, con la escala modificada de Cobb (1992). De los 35 lotes, 11 fueron positivos a *P. triticina*, con niveles de severidad de 5-10% al embuche y hasta el 60% en espigamiento. Para roya lineal se detectó un foco positivo con severidad del 20% en Onavas F2009. En su mayoría, las variedades son moderadamente susceptibles a roya lineal amarilla y/o roya de la hoja; sin embargo, el productor continúa sembrándolas debido al desconocimiento de las características de los genotipos. Por ello es importante monitorear y caracterizar las razas fisiológicas de royas que inciden en las zonas productoras de Sinaloa y evaluar en más sitios y ciclos agrícolas las variedades comerciales por su resistencia, establecer ensayos con líneas candidatas a liberación para identificar las más adecuadas.

6

ESPECIES DE *Fusarium* ASOCIADAS AL TIZÓN DE LA ESPIGA DEL TRIGO Y FUENTES DE RESISTENCIA EN MÉXICO.

[*Fusarium species* associated with the head blight of wheat and resistance sources in Mexico]. Elizabeth García-León¹, Héctor Eduardo Villaseñor-Mir² Santos Gerardo Leyva-Mir³, Moisés Camacho-Tapia³ y Juan Manuel Tovar-Pedraza⁴. ¹INIFAP-CEVAF, Sinaloa. ²INIFAP-CEVAMEX, México ³UACH, Texcoco. ⁴CIAD A.C. Culiacán, Sinaloa. garcia.elizabeth@inifap.gob.mx.

En México, la producción de trigo harinero se lleva a cabo bajo condiciones de riego y temporal, siendo ésta última donde el tizon de la espiga se desarrolla con frecuencia. La fusariosis de la espiga es causada por un complejo de especies, dentro de las cuales se han caracterizado molecularmente a diecisiete aislados patogénicos y por su nivel de severidad (%) determinado en pruebas de patogenicidad: 1. *Fusarium avenaceum* (90 %), 2. *F. torulosum* (65 %), 3. *F. graminearum* (95%), 4. *F. boothii* (100%), 5. *F. incarnatum* (65%), 6. *F. sporotrichioides* (88%), 7. *F. cerealis* (68 %), 8. *F. equiseti* (98%), 9. *F. poae* (93%), 10. *F. camptoceras* (97%), 11. *F. solani* (84%), 12. *F. sacchari* (99%), 13. *F. temperatum* (97%), 14. *F. phyllophilum* (99%), 15. *F. verticilloides* (99%), 16. *Microdochium nivale* (98%) y 17. *F. sambucinum* (95%) con porcentajes mayores al 50 % de severidad. Se evaluó la resistencia de 16 variedades de trigo harinero liberadas desde los años 70, 80, 90 y 2000 bajo un sistema de parcelas divididas, la unidad experimental estuvo constituida por tres plantas, y se utilizaron tres especies: *Fusarium boothii*, *F. equiseti* y *F. verticilloides*. Se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, niveles menores al 12% de severidad en variedades como Cleopatra VS74, Rebecca F2000 y Altiplano F2007. Este germoplasma podría utilizarse en los programas de mejoramiento contra la fusariosis en trigo.

7

IDENTIFICACIÓN Y PATOGENICIDAD DE *Setophoma terrestris* ASOCIADO A RAÍZ ROSADA Y CORCHOSA DEL TOMATE EN SINALOA, MÉXICO. [Identification and pathogenicity of *Setophoma terrestris* associated with pink and corky root of tomato in Sinaloa, Mexico]. Ana María López-López¹, Josefina León-Félix¹,

Raúl Allende-Molar², Nelson Bernardi Lima³, Juan Manuel Tovar-Pedraza¹, Raymundo Saúl García-Estrada¹. ¹Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Coordinación Culiacán. ²Universidad Veracruzana. ³CONICET-Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Email: ana.lopez@estudiantes.ciad.mx

Durante 2017 y 2018, se observaron plantas de tomate (*Solanum lycopersicum*) con síntomas de raíz corchosa y raíz rosada en campos comerciales en Culiacán, Sinaloa. Por ello, el objetivo de este estudio fue identificar el agente causal de la enfermedad mediante la combinación de técnicas para determinar características morfológicas, secuencias de ADN y pruebas de patogenicidad. A partir de tejidos sintomáticos, se obtuvieron y purificaron aislados fúngicos en medio de cultivo papa-dextrosa-agar y jugo V8-agar. La identificación morfológica de un aislado representativo se realizó usando descripciones especializadas con base en las características de picnidios, setas y conidios. Posteriormente se extrajo el ADN, se amplificó la región completa ITS (ITS1-5.8S-ITS2) y parte del gen 28S, se secuenciaron los productos, y se realizó un análisis BLAST y filogenético bayesiano con secuencias relacionadas. Mediante identificación morfológica y análisis filogenético se identificó a *Setophoma terrestris* (sin. *Pyrenochaeta terrestris*). Finalmente, la patogenicidad del aislado fúngico se verificó en plántulas de tomate de 35 días de edad, las cuales se inocularon en la raíz con discos de agar con micelio. Treinta días después de la inoculación, se observaron síntomas de raíz corchosa y raíz rosada en las plantas inoculadas, mientras que las plantas testigo permanecieron asintomáticas. Esto confirmó que *S. terrestris* es el agente causal de la enfermedad de raíz corchosa y rosada del tomate en Sinaloa.

ANÁLISIS *IN VITRO* DEL ANTAGONISMO DE UNA CEPA SILVESTRE DE *Trichoderma atroviride* HACIA MICROORGANISMOS FITOPATÓGENOS. [*In vitro* analysis of antagonism of a *Trichoderma atroviride* wild strain towards phytopathogen microorganisms]. Karla Ivonne González-Martínez, Virginia Angélica Robinson-Fuentes, Ma. Soledad Vázquez-Garcidueñas, Salvador Ochoa-Ascencio y Gerardo Vázquez-Marrufo. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. karlagonzalez.93@hotmail.com

El aislamiento y la caracterización del mecanismo de ataque de cepas silvestres de *Trichoderma* spp. con potencial para su uso en biocontrol permite seleccionar aquellas más eficientes para el control de especies o variantes de hongos y oomicetes fitopatógenos de relevancia local y regional. Se evaluó la capacidad antagonica *in vitro* de una cepa de *Trichoderma atroviride* (CMU-08) contra distintos fitopatógenos, mediante ensayos de confrontación en cultivos duales, de inhibición por compuestos volátiles y antibiosis empleando agar extracto de malta (AEM), agar papa-dextrosa (PDA) y medio mínimo Vogel (MMV). El antagonismo de la cepa CMU-08 hacia *Fusarium* sp. en los ensayos de confrontación en los tres medios de cultivo fue superior al 100%, en comparación con la inhibición por volátiles (30.5%) y antibiosis (51.1%) en MMV. Para *Colletotrichum gloeosporoides* se encontró la mayor inhibición a través de la producción de metabolitos volátiles, siendo de 92.8% en MMV. Se antagonizó eficientemente mediante confrontación y antibiosis a *Phytophthora cinnamomi*, con 70.2% de inhibición en MMV; en dichos ensayos fue menos eficiente hacia *Botrytis cinerea*, con un valor máximo de inhibición de 38.4% en AEM. La inhibición por volátiles para

estos patógenos fue de 67.0% (*B. cinerea*) y 70.2% (*P. cinnamomi*), ambos en AEM. La cepa CMU-08 antagoniza a distintos microorganismos fitopatógenos mediante diferentes mecanismos, con influencia del medio de cultivo empleado, que resulta en una variación significativa en los porcentajes de inhibición del crecimiento de los fitopatógenos evaluados.

CARACTERIZACIÓN DE ANAMORFOS DE BOTRYOSPHAERIACEAE ASOCIADOS AL BRAZO MUERTO EN VID (*Vitis vinifera* L.) EN LA REGIÓN DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA. [Characterization of botryosphaeriaceae's anamorphs associated with dead arm in grapevine (*Vitis vinifera* L.) from the region of Parras de la Fuente, Coahuila]. José Abraham Obrador-Sánchez, Javier López-Hernández, Sergio Hernández-Rodríguez, y Vicente Hernández-Hernández. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN). joseobsa@msn.com

Varios estudios han identificado a especies de la familia Botryosphaeriaceae como importantes patógenos en los viñedos causando canchales, necrosis en yemas, decaimiento de los brotes, muerte de injertos y brazo muerto. Actualmente, no se tienen reportes de las especies de esta familia encontradas en la zona de Parras de la Fuente, Coahuila, por lo que se requiere realizar la caracterización de los hongos causantes de la enfermedad de brazo muerto en los viñedos de Parras de la Fuente. Se realizaron muestreos durante los meses de febrero y junio de 2019 de madera de vid con síntomas de brazo muerto, las muestras se cortaron en pedazos de 1 cm³, posteriormente se desinfectaron y colocaron en medio PDA para su crecimiento, los hongos aislados se sembraron en agar agua con madera y

se mantuvieron en condiciones lumínicas por 30 días para la formación de picnidios. Los picnidios se recolectaron y maceraron para la obtención de esporas, las cuales se visualizaron en microscopio óptico y se realizó su identificación microbiológica de acuerdo al tipo de estructura y tipo de spora generados. A partir de las mismas se han identificado los géneros *Neofusicoccum* spp., *Diplodia* spp. y *Lasidiopodia* spp., pertenecientes a la familia Botryosphaeriaceae. Actualmente se realiza la extracción de ADN de las cepas para la amplificación de las regiones ITS y β -tubulina para su secuenciación e identificación a nivel especie.

10

ANTAGONISMO DE *Trichoderma* spp. PRESENTE EN LA COMARCA LAGUNERA CONTRA *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (Sacc.) Snyder y Hansen y *Verticillium dahliae* Kleb. [Antagonism of *Trichoderma* spp. present in the region Lagunera against *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* and *Verticillium dahliae*]. Vicente Hernández-Hernández, Javier López-Hernández, Sergio Hernández-Rodríguez y José Abraham Obrador-Sánchez. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, joseobsa@msn.com

Trichoderma spp. es un hongo habitante natural del suelo que puede vivir como saprofito o como parásito sobre otros hongos. La presente investigación consistió en identificar y evaluar el efecto antagónico de cepas de *Trichoderma* spp. nativas de la Comarca Lagunera frente a cepas de *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* y *Verticillium dahliae*, causantes de marchitez vascular en el cultivo de tomate. Se muestrearon 12 huertos localizados en la Comarca Lagunera, obteniendo 86 muestras, de las cuales se aislaron 45 cepas de *Trichoderma* spp. de las que se seleccionaron 12 para identificación

morfológica por claves taxonómicas y su evaluación como antagonistas, mediante enfrentamientos duales por cuadruplicado, en laboratorio frente a los fitopatógenos de acuerdo a la metodología de Bell y colaboradores, 1982; A los datos obtenidos se les realizó análisis de varianza y prueba de medias. Los aislamientos fueron identificados como *T. harzianum* (9 aislados), *T. koningii* (1 aislado) y *T. pseudokoningii* (2 aislados), aislando mayormente la especie *T. harzianum*. Las 3 especies de *Trichoderma* mostraron actividad inhibitoria en el control de *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici* tanto en las pruebas *in vitro*, *T. harzianum* mostró la mayor tasa de inhibición. En el control de *V. dahliae* las especies no mostraron actividad antagonista. Estos resultados coinciden con lo reportado por distintos autores (Sundaramoorthy y Balabaskar, 2013; De Cal *et al.*, 1995), al observar capacidad antagonista contra *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*.

11

MALEZA DE LA FAMILIA POACEAE HOSPEDANTE DE USTILAGINALES EN EL ÁREA URBANA DE TORREÓN, COAHUILA. [Poacea weeds hosts Ustilaginales in the urban area of Torreón, Coahuila]. Sergio Hernández-Rodríguez*, Javier López-Hernández, José Abraham Obrador-Sánchez, Ma. Teresa Valdés-Perezgasga, Fabián García-Espinoza y Vicente Hernández-Hernández. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, sergiohr39@hotmail.com.

La maleza puede causar pérdidas en cultivos, ser tóxicas para el ganado, hospedante de insectos y plagas, como los hongos Ustilaginales que provocan pérdidas y toxicidad en cereales y granos, la familia Poaceae es una de sus hospedantes predilectas. La zona de Torreón se encuentra cercana a zonas agrícolas y ganaderas que podrían

ser afectadas. El objetivo fue identificar especies de maleza de la familia Poaceae hospedantes de Ustilaginales, se realizaron colectas durante junio 2016 a octubre del 2017 en el área urbana de Torreón, Coahuila. Se seleccionaron al azar 400 sitios de muestreo; colectando maleza con carbones en calles, baldíos, parques, industrias, escuelas y residencias. La maleza con presencia de carbón fueron sometidas a un tratamiento de prensado-secado. La identificación de maleza y Ustilaginales se realizó en el laboratorio de Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad-Laguna. Se identificaron las especies: *Ustilago cynodontis* (Pass.) Henn en Zacate grama (*Cynodon dactylon* L.) y *Sporisorium cruentum* Kühn en Zacate Johnson (*Sorghum halepense* (L.) Pers.). La maleza infectada por carbones predominó en la zona oriente de la ciudad, presentándose brotes aislados en la zona poniente, norte y sur, siendo *C. dactylon* más susceptible que *S. halepense*. Se observó que en invierno se presentó mayor número de maleza infectada. Se colectaron 160 plantas infectadas con carbones de las cuales 93.75 % correspondieron a *C. dactylon* y 6.25% a *S. halepense*, presentándose una prevalencia de 1.875% para *C. dactylon* y 0.125% para *S. halepense*.

12

PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA ALFALFA (*Medicago sativa* L.) EN LA COMARCA LAGUNERA, COAHUILA. [Main diseases of alfalfa (*Medicago sativa* L.) in the Lagunera region of Coahuila.] Javier López- Hernández*, Sergio Hernández-Rodríguez, José Abraham Obrador-Sánchez, Ma. Teresa Valdés-Perezgasga, Fabián García-Espinoza y Vicente Hernández-Hernández. Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, *sergiohr39@hotmail.com.

La alfalfa tiene ventajas sobre otros forrajes, como alto rendimiento y contenido de proteínas, vitaminas, minerales y bajo porcentaje de fibra, por lo que es considerada adecuada para la producción de leche. Además, ayuda a enriquecer el suelo, por la capacidad que tiene de fijar nitrógeno. Las enfermedades de la alfalfa son causadas por diferentes organismos que pueden atacar una o varias partes de la planta. Durante el otoño e invierno de 2009-2010 se realizaron cinco muestreos, uno en otoño y cuatro en invierno en alfalfa en el campo experimental de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Unidad Laguna, con el propósito de coleccionar plantas de alfalfa con presencia de síntomas de enfermedad debida a fitopatógenos. El análisis de laboratorio se realizó utilizando un microscopio para detectar y extraer las estructuras de los patógenos presentes. Para observar detalladamente las estructuras de los patógenos, se prepararon varios portaobjetos sobre cada uno de los cuales se depositó una gota de azul de lactofenol o agua. Las estructuras observadas se caracterizaron y se compararon con las descritas en manuales, dichas estructuras se obtuvieron directamente de las plantas. Encontrando principalmente fitopatógenos en la parte aérea: *Stemphylium botryosum*, causante de mancha foliar, *Peronospora trifoliorum*, causante de mildiu, *Alternaria* sp., causante de tizón, *Uromyces striatus*, causante de roya. Además se encontró *Rhizoctonia solani*, que es un fitopatógeno del suelo. En función de la evaluación realizada, los fitopatógenos encontrados representan una amenaza latente para el cultivo de esta planta.

13

POTENCIAL ANTAGÓNICO DE *Trichoderma* spp. AISLADAS DE TEJIDO FOLIAR, RAÍZ Y SUELO DE UN CULTIVO DE SORGO

FRENTE A FITOPATÓGENOS DE RELEVANCIA AGRONÓMICA. [Antagonistic potential of *Trichoderma* spp. isolated from foliar tissue, root and soil of a sorghum culture against agronomic relevant phytopathogens]. Pablo Flores-Cervantes, Virginia A. Robinson-Fuentes y Gerardo Vázquez-Marrufo. UMSNH, CMEB. Email: olbap.fc@gmail.com

El sorgo (*Sorghum. bicolor*) es el cuarto cereal en importancia a nivel mundial, su grano y forraje es utilizado para la elaboración de productos de consumo humano y animal. México es el segundo productor mundial de sorgo, con 6 millones toneladas promedio por año. Los estudios sobre biocontrol con *Trichoderma* spp. asociado a cultivos de sorgo son escasos, sólo se ha analizado su capacidad de biocontrol de una o dos partes de la planta de un agroecosistema, sin comparar la capacidad de biocontrol entre las especies aisladas de las diferentes partes. Entonces, es importante analizar la capacidad antagonista de *Trichoderma* spp. aislada de tejido foliar del sorgo, su raíz y del suelo donde se cultivó. Se eligió un *Trichoderma* spp. de cada muestra para las pruebas de confrontación de cultivo dual (CCD) frente a 3 especies del género *Fusarium*, 4 de *Colletotrichum* y 3 de *Phytophthora*; los ensayos se realizaron por triplicado utilizando medio mínimo Vogel y se clasificó el grado de inhibición de acuerdo a la clasificación de antagonismo de Bell et al. (1982), sin encontrar diferencias significativas ($p < 0.05$). La especie de *Trichoderma* aislada de raíz presentó una mayor inhibición en las pruebas de CCD frente a las especies del género *Fusarium* y *Colletotrichum*, que las especies aisladas de raíz y tejido foliar; además, la inhibición que produjo en todas las pruebas frente a las especies del género *Phytophthora* fue de clase 1.

***Fusarium oxysporum* AGENTE CAUSAL DE LA SECADERA DE LA FRESA (*Fragaria* spp.) EN MORELOS, MÉXICO.** [*Fusarium oxysporum* causal agent of strawberry wilt (*Fragaria* spp.) in Morelos, México]. Dagoberto Guillén Sánchez^{1*}, Daniel Bárcenas Santana¹, Cinthia Yazmín Basaldua¹, Margarita de Lorena Ramos-García². ¹Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc (EE-SuX) de la UAEM. ²UAEM-Facultad de Nutrición. dagoguillen@yahoo.com

La producción de fresa se ha incrementado en México, por sus cualidades gustativas, nutritivas y por generar altos ingresos económicos. En Morelos la producción se ve afectada por la secadera de la fresa, enfermedad frecuente en este cultivo que causa importantes pérdidas. El objetivo de este trabajo fue identificar el agente causal de la secadera en fresa y realizar pruebas de patogenicidad a partir de dos cepas y métodos de inoculación (inoculó mediante un sustrato y suspensión), para ello se analizaron plantas con síntomas típicos de la enfermedad provenientes de una parcela comercial de Yautepec, Morelos, México, a partir de junio de 2018. Se realizaron cámaras húmedas y siembra directa de tejido enfermo en PDA. A los cinco días se tuvo crecimiento micelial y se realizó la identificación del hongo mediante las características morfológicas, y se comparó con una cepa de *F. oxysporum* identificada molecularmente proveniente de Celaya, Guanajuato. Los resultados obtenidos muestran que el agente causal de la secadera en Morelos es *Fusarium oxysporum*, debido a que comparten las mismas características que la cepa de Celaya y en las pruebas de patogenicidad se observaron los síntomas y daños causados por

este hongo al cultivo, su implicación directa en el peso fresco y seco de las plantas. Sin embargo, la comparación entre medias no detectó diferencias significativas en el método de inoculación ni en las cepas evaluadas. Se sugieren futuros estudios de identificación molecular de este género.

15

SEVERIDAD Y EFECTIVIDAD DE FUNGICIDAS *in vitro* SOBRE LA PUDRICIÓN BLANDA DE LOS CÍTRICOS (*Rhizopus nigricans*). [Severity and effectiveness *in vitro* of fungicides against soft rot of citrus (*Rhizopus nigricans*).] Álvaro González-Hernández¹, Daniel Bárcenas-Santana², Dagoberto Guillen-Sánchez¹, Irán Alia-Tejaca¹, Víctor López Martínez¹ e Isaac Magaña López¹.¹UAEM -Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc; ²Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, Puebla. daniel.barcenas@colpos.mx

Con el objetivo de evaluar la susceptibilidad de la pudrición blanda causada por *Rhizopus nigricans* en frutos de cítricos, así como la efectividad biológica de fungicidas *in vitro* para su control; se utilizaron frutos de cítricos de lima persa, limón mexicano, naranja valencia y toronja. Se inocularon mediante discos de la cepa de 5 mm y suspensión de esporas 1×10^6 conidios, se realizaron heridas en el caso de inoculación con discos y con la suspensión se inyectó en los frutos. Mediante el diseño completamente al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones, en donde la unidad experimental fue un fruto, se evaluó el promedio del avance de la enfermedad en mm al transcurso de 7 días. Se evaluó también la efectividad biológica de los fungicidas Tebuconazole, Procloraz, Tiofanato, Tiabendazol y Ciprodinil+Fludioxonil *in vitro* para determinar su efectividad en sus diferentes dosis (baja, media y alta). Los resultados mostraron que *R. nigricans*

infecta a todos los frutos, pero el progreso de la enfermedad fue mayor en Lima persa. Sin embargo, en naranja Valencia la enfermedad fue menos severa por el método de inoculación por suspensión de esporas. Los fungicidas que inhibieron el 100% del crecimiento del hongo fueron Ciprodinil + Fludioxonil, Procloraz y Tiabendazol en dosis media y alta.

16

INOCULACIÓN DE *Trichoderma*, EN EL CRECIMIENTO INICIAL DE *Capsicum annuum* Y SU POTENCIAL PARA EL CONTROL DE *Meloidogyne incognita*. [Inoculation of *Trichoderma*, in the initial growth of *Capsicum annuum* and its potential for the control of *Meloidogyne incognita*]. Elizabeth Herrera-Parra¹, Jairo Cristóbal-Alejo², María Manuela Reyes-Estébanez³. ¹INIFAP. ²Instituto Tecnológico de Conkal. ³Universidad Autónoma de Campeche. elian.herrera09@gmail.com.

Se establecieron con *C. annuum* dos bioensayos en invernadero. En uno se evaluó la capacidad de *Trichoderma* spp. para promover el crecimiento inicial de plántulas a los 36 días después de la siembra (dds) y en otro se estimó su biocontrol contra *M. incognita* a los 96 dds. En el experimento de crecimiento, los tratamientos estuvieron constituidos por cuatro cepas y dos testigos, uno sin la incorporación de *Trichoderma* spp. y otro solo con la aplicación de fertilización química tradicional, en el de biocontrol además de las cuatro cepas se incorporó un testigo sin *Trichoderma* spp. y otro solo con nematicida (oxamil). Los tratamientos se distribuyeron en un diseño experimental completamente al azar. En relación al testigo sin *Trichoderma* spp. *T. atroviride* promovió mayor altura de plántulas, esta cepa al igual que *T. virens* y *T. harzianum*-C2 mejoraron el peso fresco en raíces (60.14%) y

T. atroviride y *T. harzianum*-C2 produjeron mayor biomasa seca de raíz (82.30%). En el biocontrol del nematodo, las plantas testigo sin *Trichoderma* spp. mostraron el mayor índice de agallamiento (IA) con un 85.50%. Los menores IA se estimaron con las cepas de *Trichoderma* spp. (21.60 a 35%); *T. atroviride* redujo la producción de huevos hasta un 63% y la formación de hembras hasta un 14.36%, en relación al nematocida (oxamil). El biocontrol del nematodo con la inoculación de las cepas de *Trichoderma* favoreció el crecimiento general de las plantas ($P \leq 0.01$).

17

PRODUCCIÓN DE CONIDIOS DE *Trichoderma asperellum* ANTAGONISTA DE *Fusarium* spp. DE LA CAÑA DE AZÚCAR. [Conidia production of *Trichoderma asperellum* antagonist of *Fusarium* spp. from sugarcane]. Yaneth Margarita López-Alcántara, Edgar Martínez-Fernández, Patricia Martínez-Jaimes. Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. edgar@uaem.mx

El hongo *Trichoderma asperellum* presenta un alto grado de antagonismo hacia las especies patógenas *Fusarium andiyazi* y *Fusarium sacchari* causantes de la necrosis de las raíces de la caña de azúcar. La producción de cantidades adecuadas de inóculo de *T. asperellum* es un componente esencial de un programa de biocontrol. Este trabajo tuvo como objetivo determinar las condiciones óptimas de producción de los conidios de *T. asperellum*. Se evaluaron los sustratos de granos de arroz y sorgo con diferente contenido de humedad (CH), con tiempos de esterilización de 15, 20, 25 y 30 minutos, bajo un diseño completamente al azar con 16 tratamientos, un testigo y cuatro repeticiones para cada sustrato. Las variables respuesta fueron:

la producción de conidios y la cantidad de biomasa (mezcla de residuos del sustrato y conidios). Asimismo, se determinó la cantidad óptima de inóculo de *T. asperellum* para la producción masiva de conidios en sustrato de arroz. La mayor cantidad de conidios (9.34×10^8 conidios/g) se presentó en el sustrato de arroz con un CH de 28.58% esterilizado durante 15 minutos y la mayor cantidad de biomasa fue de 9.95 g. En el sustrato de sorgo se registró la mayor producción de conidios/g (1.49×10^8) cuando presentó un CH de 20.87% y fue esterilizado por 15 minutos, produciendo 0.56 g de biomasa. Para la producción masiva de conidios de *T. asperellum* sobre sustrato de arroz la cantidad óptima de inóculo fue de 3 mL.

18

***Streptomyces* COMO BIOCONTROLADORES IN VITRO DE *Exserohilum rostratum* Y PRODUCTORES DE SUSTANCIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL** [*Streptomyces* as *in vitro* biocontrol agents of *Exserohilum rostratum* and producers of plant growth promoting substances]. Darío Enrique García-Rojas¹, Pedro Vázquez-Vázquez¹, Daniel Alonso Pérez-Corral², María Fernanda Ruiz-Cisneros², David Ignacio Berlanga-Reyes², José de Jesús Ornelas-Paz², Carlos Horacio Acosta-Muñiz², Claudio Rios-Velasco², Miguel Ángel Salas-Marina³, Eduardo Osorio-Hernández⁴, ¹Universidad Tecnológica de la Costa. ²Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. ³Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. ⁴Universidad Autónoma de Tamaulipas. claudio.rios@ciad.mx.

Las cepas de *Streptomyces*, son conocidas como potenciales agentes de control biológico de fitopatógenos y productoras de sustancias promotoras del crecimiento vegetal. El objetivo del estudio fue

evaluar la actividad antifúngica de *Streptomyces* spp. contra *Exserohilum rostratum* (“*Setosphaeria rostrata*”), así como su capacidad para producir sustancias promotoras del crecimiento vegetal. La actividad antagonista *in vitro* de seis cepas de *Streptomyces* se evaluó por confrontación directa y a través de volátiles contra *E. rostratum* y se estimó la inhibición del crecimiento radial. Así mismo, se determinó la capacidad de *Streptomyces* spp., para producir ácido indol acético (AIA) y sideróforos, además de su potencial para fijar nitrógeno atmosférico y solubilizar fosfatos. Los experimentos se realizaron por triplicado y la separación de medias se realizó con la prueba de Tukey ($p=0.05$). Las inhibiciones fluctuaron de 34.9 a 95.7% en confrontación directa y de 0.6 a 2.2% mediante volátiles. *Streptomyces cangkringensis* strain CIAD-CA07 y *S. misionensis* strain CIAD-CA27 produjeron 3 y 29 $\mu\text{g mL}^{-1}$ de AIA, respectivamente. Todas las cepas produjeron el sideróforo trihidroxamato (ferrioxamina) de 7.8 a 39.3 unidades y fijaron nitrógeno atmosférico. Las seis cepas de *Streptomyces*, podrían ser utilizadas como agentes de control biológico de *E. rostratum* y como biofertilizantes en cultivos hortofrutícolas.

19

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE AISLADOS DE ACTINOMICETOS Y SU ANTAGONISMO *IN VITRO* CONTRA *Fusarium solani*. [Morphological and molecular characterization of actinomycete isolates and their *in vitro* antagonism against *Fusarium solani*]. Jorge Luis Cibrian-Castro, Carlos Carrillo-Rubio, Pedro Vázquez-Vázquez, Universidad Tecnológica de la Costa, María Fernanda Ruiz-Cisneros, Daniel Alonso Pérez-Corral, Guadalupe Isela Olivas-Orozco, David Roberto Sepúlveda-Ahumada, Claudio Rios-Velasco. Centro de Investigación

en Alimentación y Desarrollo, Frédérique Lucciene Denise-Revérchon, Instituto de Ecología. claudio.rios@ciad.mx

El género *Streptomyces* es el más representativo de los actinomicetos, capaces de inhibir el crecimiento de hongos y bacterias fitopatógenas. El objetivo del estudio fue caracterizar morfológica y molecularmente a aislados de actinomicetos y evaluar su actividad antagonista *in vitro* contra el hongo *Fusarium solani*. Los microorganismos se aislaron de suelo de rizosfera de árboles de aguacate de Xalisco, Nayarit, México en el 2018 y se identificaron de acuerdo con sus caracteres morfológicos y moleculares. Se amplificaron los genes 16S y 18S del ARN ribosomal, de actinomicetos y *F. solani*, respectivamente. Se evaluó la actividad biológica *in vitro* de 25 aislados de actinomicetos mediante confrontación directa contra *F. solani*. Las confrontaciones se realizaron por triplicado y la separación de medias se realizó con la prueba de Tukey ($p=0.05$). La inhibición del crecimiento de *F. solani* (98%) ejercida por el aislado A104 (*Streptomyces mauvecolor*), fue significativamente mayor al resto de los aislados (Tukey; $p=0.05$). El 96% de los aislados correspondió al género *Streptomyces*, el 4% restante a *Amycolatopsis umgeniensis*. Dentro de las especies de *Streptomyces*, el 12% correspondió a *S. parvisporogenes*, el resto fue variable, encontrándose las especies *S. werraensis*, *S. septatus*, *S. lactacystinicus*, *S. laculatispora*, *S. blastmyceticus*, *S. mauvecolor*, entre otras. Los actinomicetos identificados, podrían ser candidatos para utilizarse en el manejo de *F. solani*.

20

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA *in vitro* DE MICROORGANISMOS ANTAGONISTAS CONTRA *Fusarium oxysporum* DE RIZOSFERA DE

ÁRBOLES DE AGUACATE EN XALISCO, NAYARIT, MÉXICO. [*In vitro* antifungal activity of antagonistic microorganisms against *Fusarium oxysporum* from avocado trees rhizosphere of Xalisco, Nayarit, Mexico]. María Guadalupe Vega-Torres¹, María Fernanda Ruiz-Cisneros², Daniel Alonso Pérez-Corral², David Ignacio Berlanga-Reyes², José de Jesús Ornelas-Paz², Claudio Rios-Velasco², Octavio Jhonathan Cambero-Campos³, Mario Orlando Estrada-Virgen³, Gregorio Luna-Esquivel³, Frédérique Lucciene Denise-Revérchon⁴. ¹UT de la Costa. ²CIAD. ³UAN. ⁴INECOL. claudio.rios@ciad.mx

Debido a la reciente detección del complejo ambrosial *Euwallacea kuroshio-Fusarium euwallaceae* en México, capaz de afectar árboles de la familia Lauraceae, el objetivo del estudio fue aislar y caracterizar hongos y bacterias antagonistas a *Fusarium oxysporum*, utilizado como hongo modelo. Se recolectaron muestras de suelo de árboles de aguacate (*Persea americana* Mill., Laurales: Lauraceae) cv. Hass en 10 huertos del municipio de Xalisco, Nayarit. Se aislaron e identificaron morfológicamente 117 actinobacterias (*Streptomyces*), 83 bacterias (*Bacillus*) y 43 hongos (*Trichoderma*). De cada grupo de microorganismos, se evaluaron 10 aislados (al azar) contra tres aislados de *F. oxysporum* (hongo modelo), y se caracterizaron molecularmente 10 de estos aislados que mostraron la mayor inhibición del crecimiento radial. Las confrontaciones se realizaron por triplicado y la separación de medias se realizó con la prueba de Tukey ($p=0.05$). Destacaron los aislados A75 (*Streptomyces* sp.), con inhibiciones de *F. oxysporum* que fluctuaron de 26.82 a 67.52%; B65 y B78 (*B. amyloliquefaciens* y *B. velezensis*, respectivamente) con inhibiciones >50% y los 10 aislados de *Trichoderma*, entre 35 y 75%. En huertos de aguacate de Xalisco, Nayarit, existen cepas antagonistas de los

géneros *Streptomyces*, *Bacillus* y *Trichoderma*, con posible potencial para ser usados en el manejo de *F. euwallacea*

21

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DEL EXTRACTO DE HOJAS DE PIMIENTA GORDA SOBRE *Colletotrichum* spp. AISLADOS DE FRUTOS DE *Pimenta dioica*. [Antifungal activity of the pepper fat leaves extract on *Colletotrichum* spp. isolated from fruits of *Pimenta dioica*.]. Aidé Velázquez-Silva¹, Laura Leticia Barrera-Necha¹ y Leticia Robles-Yerena². CEPROBI-IPN¹; CNRF-SENASICA². velazquezaide@hotmail.com.mx

La producción de pimienta gorda (*Pimenta dioica* L. Merrill.) ha disminuido y uno de los factores principales es la antracnosis en fruto; entre 2015-2016 se identificaron y caracterizaron daños por especies del género *Colletotrichum*. El objetivo del presente trabajo fue evaluar *in vitro* el efecto del extracto etanólico de hojas de *P. dioica* contra cuatro especies de *Colletotrichum* como alternativa de control. Para la prueba se reactivaron cuatro aislados (*C. acutatum*, *C. boninense*, *C. fragariae* y *C. gloeosporioides*). El bioensayo consistió en el método del medio envenenado en PDA; se aplicaron concentraciones de 2.5, 5, 10, 20, 30 y 40 mg/mL y un testigo. Se evaluó el crecimiento micelial (CM) y germinación de esporas (GE) en tres tiempos (6, 8, 10 h), se determinó el porcentaje de inhibición para ambas variables. Por cromatografía de líquidos de alta resolución acoplada a espectrometría de masas (HPLC-SM) se identificó y cuantificó la composición química del extracto. Para evaluar las variables se aplicó un diseño experimental aleatorio con seis repeticiones por tratamiento y para el análisis de resultados se utilizó una prueba Kruskal-Wallis y Tukey ($p<0.001$). El CM fue inhibido al 100 % a una concentración de 10 mg/mL en las

cuatro especies; mientras que la GE fue inhibida desde 5 mg/mL en *C. acutatum* y *C. gloeosporioides*. El extracto está constituido fundamentalmente por compuestos oxigenados y principalmente por: ácidos (α -linolénico, linoleico), flavonoides (quercetin-7-O-rhamnoside, isoquercitrina), un fenol (octifenol), un fenilpropanoide (isoeugenol), un flavonol (epicatequina) y una saponina triterpenoide (hederagenina).

22

EVALUACIÓN *in vitro* DE *Trichoderma asperellum* (Ta13-17) CONTRA HONGOS FITOPATÓGENOS. [*In vitro* evaluation of *Trichoderma asperellum* (Ta13-17) against phytopathogen fungi]. Elly Yanhired Peraza-Cocom, Felicia Amalia Moo-Koh, Jairo Cristóbal-Alejo, José María Tun-Suárez. Instituto Tecnológico de Conkal. famk22@hotmail.com

La aplicación de especies de *Trichoderma*, permite disminuir el uso de fungicidas sintéticos dañinos para el ambiente; el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto antagónico *in vitro* de *Trichoderma asperellum* (Ta13-17) contra hongos fitopatógenos. Para estimar el antagonismo, se realizaron confrontaciones duales en medio de cultivo PDA, con ocho hongos fitopatógenos de Chile, maíz y tomate; pertenecientes a los géneros: *Curvularia* (ITC22, ITC26, ZMHC), *Helminthosporium* (ITC03, ZMHH), *Fusarium* (ZMFT) y *Colletotrichum* (ZMCT, ZMCH). Se midió la inhibición de crecimiento micelial de los patógenos a los 5, 8 y 10 días. También, se evaluó el micoparasitismo y la antibiosis, para este último, se utilizó el filtrado del cultivo líquido de Ta13-17 en papa-dextrosa; éste se evaluó en dilución en PDA. Los datos obtenidos fueron analizados en un diseño experimental completamente al azar previa transformación de

los datos, y la comparación de medias fue con el método Tukey ($P \leq 0.05$). El análisis de varianza mostró diferencias significativas ($P \leq 0.01$) en la inhibición del crecimiento micelial, en un rango de 22.3-83.6%. En ITC03 y en ITC26 se estimaron los mayores porcentajes de inhibición con 83.7 y 53.8% a los 10 días después de la confrontación. El micoparasitismo se presentó a los 20 días después de la confrontación, y se observó el 100% de colonización de los patógenos. En la antibiosis, el rango fue de 48.1-5.6%, el aislado ZMCH tuvo un 48.1%, seguido por ZMFT con 45.6%, ZMHC y ITC22 con 42.3% y 40.9%, respectivamente. *T. asperellum* (Ta13-17) tiene potencial para el control de estos fitopatógenos.

23

SUSTANCIAS BIOACTIVAS PARA EL CONTROL DE *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* EN TOMATE. [Bioactive substances to control *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* in tomato]. Magda Rocío Gómez-Marroquín¹, Diana Marcela Burbano-David¹, Sandra Lorena Carmona-Gutiérrez¹, Adriana González-Almario², Mauricio Soto-Suárez¹. ¹Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-Agrosavia; ²Universidad Nacional de Colombia. mrgomez@agrosavia.co.

El control de enfermedades en el cultivo de tomate se realiza principalmente mediante la aplicación de plaguicidas de síntesis química, lo que afecta su sostenibilidad y la salud humana. Una alternativa de control es el uso de sustancias bioactivas como Fosfitos y Silicios. En este trabajo se evaluó el efecto de sustancias bioactivas *in vitro* e *in planta* contra *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici* (*Fol*) agente causal del marchitamiento vascular del tomate, empleando el aislamiento *Fol59*. El medio de cultivo fue suplementado con diferentes

concentraciones de Fosfitos, Silicio y un testigo sin suplementar, colocando un disco de agar de 5 mm del patógeno en contacto con el medio durante 7 días, en un diseño experimental completamente al azar. Se determinó el porcentaje de inhibición. Para los fosfitos de potasio evaluados, se encontró que el crecimiento de *Fol59* fue inhibido entre un 70% y 99% a concentraciones mayores a 1000 ppm. El fosfito de calcio inhibió el crecimiento en un 70% a concentraciones mayores a 50 ppm. Respecto al silicio este inhibió en un 77% el crecimiento del hongo. En ensayos realizados *in planta*, se cuantificó la incidencia y severidad en plantas susceptibles a *Fol59*. La incidencia y severidad fueron de 100% y 96% respectivamente, 14 días después de inoculación en plantas sin aplicación de sustancias bioactivas. En plantas inoculadas y tratadas previamente con sustancias bioactivas, se observó una disminución de la severidad entre un 10.4% y 42% en comparación al tratamiento inoculado.

24

SELECCIÓN DE MICROORGANISMOS ANTAGONISTAS EN EL CONTROL DE *Sclerotium cepivorum* EN AJO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS. [Selection of antagonist microorganisms in the control of *Sclerotium cepivorum* in garlic under controlled conditions]. Yimmy Alexander Zapata-Narváez, Magda Rocío Gómez-Marroquín, Blanca Lucia Botina-Azain. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – Agrosavia. jzapatan@agrosavia.co

La pudrición blanca, producida por *Sclerotium cepivorum* es la principal limitante en la producción de ajo en Colombia disminuyendo su rendimiento entre un 45% a 61%. Su control se realiza principalmente mediante la aplicación de fungicidas (Benomil o Tebuconazol). Sin embargo, su uso

continuo presenta riesgos para la salud humana y el ambiente. En consecuencia, es necesario evaluar y seleccionar alternativas de manejo sostenibles para el cultivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar los microorganismos antagonistas *Trichoderma koningiopsis* Th003, *Trichoderma asperellum* Th034, *Bacillus amyloliquefaciens* Bs006 y *Pseudomonas fluorescens* Pf014 como agentes de control. Se determinó la capacidad de los antagonistas para degradar esclerocios del patógeno, colocando una bolsa de muselina con 100 esclerocios en suelo inoculado con cada antagonista (hongos 1×10^6 conidios. ml^{-1} ; bacterias 1×10^8 células. ml^{-1}). La actividad de control se determinó sobre la incidencia y mortalidad de plantas. Se realizó la inmersión de las semillas por 10 minutos en suspensiones de los antagonistas y Tebuconazol como control. Las semillas fueron sembradas en suelo infestado artificialmente, aplicando los antagonistas cuatro veces durante 45 días. Los resultados mostraron que todos los antagonistas colonizaron el 100% de los esclerocios provocando su degradación y creciendo a partir de ellos. Igualmente, los antagonistas presentaron porcentajes de control entre 30% al 70%, siendo *T. asperellum* Th034 el antagonista que presentó los valores más bajos de incidencia (21%) y mortalidad (21%), similares al obtenido con el control químico.

25

EVALUACIÓN DE ACEITES ESENCIALES EN EL CONTROL DE *Sclerotium cepivorum* IN VITRO. [Evaluation of essential oils for the control of *Sclerotium cepivorum* in vitro]. Yimmy Alexander Zapata-Narváez, Blanca Lucia Botina-Azain, Magda Rocío Gómez-Marroquín. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria–Agrosavia. jzapatan@agrosavia.co

La pudrición blanca, producida por *Sclerotium cepivorum* es la mayor limitante fitosanitaria en la producción de ajo en Colombia. El hongo produce en el suelo esclerocios que persisten por más de 20 años dificultando su control y limitando la siembra de especies de aliáceas. La principal alternativa de control es la aplicación de los fungicidas Benomil o Tebuconazol. En este sentido, se buscan alternativas que permitan controlar esta enfermedad. El objetivo fue determinar el efecto *in vitro* de seis aceites esenciales en tres concentraciones sobre el crecimiento micelial de *S. cepivorum*. Se sembró un disco de agar de 5mm con micelio del patógeno en el centro de cajas Petri con Agar Papa Dextrosa (PDA) suplementado con los aceites esenciales de canela clavo, eucalipto, limón, orégano y tomillo, se emplearon los fungicidas Tebuconazol y Benomil como controles y PDA sin adiciones como testigo absoluto. Se incubó a 18°C durante 12 días, periodo en el que se registró el crecimiento diametral de las colonias y se determinó el porcentaje de inhibición para cada tratamiento. Se observó que las tres concentraciones de los aceites de limón, clavo y tomillo (200 ppm) no inhibieron el crecimiento del patógeno, en tanto que los aceites de canela (150, 200 y 250 ppm) tomillo (400 y 800 ppm) y orégano (150ppm) la inhibición estuvo entre el 50% y 80%. La exposición a los aceites de eucalipto (10000 ppm) y orégano (200 y 250 ppm) inhibió en un 100% el crecimiento del patógeno al igual que los fungicidas.

26

ÁCAROS MICÓFAGOS EN EL CONTROL DE *Colletotrichum gloeosporioides* EN EL CULTIVO DE PAPAYA (*Carica papaya* L.). [Mycophagous mites in the control of *Colletotrichum gloeosporioides* in the papaya crop (*Carica papaya* L.)]. Víctor Jesús Albores-Flores*; Felipe

de Jesús Jiménez-Leaño; María de Lourdes Adriano-Anaya, Gamaliel Velázquez-Ovalle y Miguel Salvador-Figueroa. Instituto de Biociencias, Universidad Autónoma de Chiapas. alboresflores@gmail.com

Actualmente el uso de ácaros micófagos presenta potencial en evaluaciones a nivel de laboratorio. El objetivo del presente trabajo fue determinar la eficiencia de ácaros micófagos en el control de *C. gloeosporioides* en el cultivo de papaya (*Carica papaya* L.). La producción de los ácaros se realizó inoculando 5 hembras y 5 machos en una colonia de hongo (cepario del IBC) previamente crecida en PDA a pH 6.5 a 32 °C en el laboratorio de agricultura sustentable del Instituto de Biociencias (IBC) de la UNACH, para que comieran y se reprodujeran por un lapso de 14 días a temperatura ambiente. Se establecieron tres parcelas de 15 plantas cada una, separadas por una parcela de banano. Los tratamientos fueron, 1) Testigo (con clorotalonil), 2) densidad de 100 ácaros por planta y 3) 200 ácaros por planta, cada parcela con su repetición y la inoculación de los ácaros fue semanal a cada planta. En los primeros dos meses, se encontró una pérdida de la densidad poblacional de ácaros de un 54 % en el tratamiento 2 y de 38 % en el tratamiento 3. La incidencia de la enfermedad en frutos de forma natural en los primeros dos meses fue del 80 % en los tratamientos con ácaros, se redujo en el tercer mes a un 60 % y se mantuvo así hasta el término del estudio. En el testigo la incidencia fue de 50 % de forma natural.

27

ACTIVIDAD ANTIFUNGICA DE POLEN DE ABEJAS SIN AGUIJÓN. [Antifungal activity of stingless bee's pollen]. Víctor Jesús Albores-Flores, Erick Saavedra-Camacho, Julieta Grajales-Conesa,

Alfonso López-García. Instituto de Biociencias, Universidad Autónoma de Chiapas. alboresflores@gmail.com.

Las alternativas de control de *Colletotrichum gloeosporioides*, agente causal de la antracnosis se han centrado en el uso de extractos acuosos y alcohólicos de plantas, y de microorganismos antagonistas, con el objetivo de disminuir el uso de productos químicos. Actualmente se ha estudiado el uso y aplicación de productos de la colmena, como la miel, con la cual se ha registrado su efecto antimicrobiano, así como inhibidor del crecimiento de este hongo. En el presente trabajo se determinó la capacidad anti fúngica de polen de abejas sin aguijón (*Tetragonisca angustula*, *Scaptotrigona mexicana* y *Melipona becheeii*). Las muestras de polen se colectaron de junio del 2017 a febrero de 2018 en los meliponarios ubicados en los municipios de Tapachula, Mazatan y Cacahoatán. Los extractos etanolicos se prepararon utilizando el protocolo de Carpes, con modificaciones a razón de 1g de polen en 5 ml de etanol/ Agua dilución (1:1) a pH 2. Una alícuota de 500 µl de extracto de cada muestra de polen por tipo de abeja fue colocada por cada 10 mL de medio Agar dextrosa papa, posteriormente se colocó un disco de 0.5 cm de colonia del hongo. Únicamente los extractos alcohólicos provenientes de mieles de abeja de *M. becheeii* presentaron actividad anti fúngica, observándose a partir del tercer día de crecimiento alcanzando un tamaño final de 2.5 cm (50 % menos que el testigo). La velocidad máxima alcanzada no fue mayor de 0.6 cm / día.

28

CARACTERIZACIÓN DE *Sphaceloma perseae* EN LA FRANJA AGUACATERA DE MICHOACÁN. [Characterization of *Sphaceloma perseae* in the avocado region of Michoacán].

Mariela Correa-Suárez¹, Salvador Ochoa-Ascencio², Sylvia Fernández-Pavía³, Gerardo Vázquez-Marrufo⁴, Héctor Guillén-Andrade², Guadalupe Valdovinos-Ponce⁵, Manuela Ángel-Restrepo¹. ¹ PIMCB-UMSNH, ² Facultad de Agrobiología-UMSNH, ³ IIAF-UMSNH, ⁴ CMEB-UMSNH, ⁵ Posgrado en Fitosanidad-Colegio de Postgraduados mari.93.cs@gmail.com

Sphaceloma perseae Jenkins, agente causal de la roña del aguacate, es un hongo que infecta frutos y hojas jóvenes de aguacate. En el fruto, causa lesiones elevadas de color marrón a casi negro de 3 a 10 mm de diámetro, en patrón circular y margen irregular. Las lesiones aparecen dispersas; cuando se unen, forman un área corchosa con fisuras marrones que rompen la epidermis y producen una cubierta densa de conidióforos y conidios hialinos. En hojas, la infección ocurre en las superficies adaxial y abaxial, en donde se desarrollan lesiones afelpadas circulares, que se desprenden dejando perforaciones con borde corchoso. La roña del aguacate, presente en países productores de aguacate en África, Asia y América, es una enfermedad de importancia económica que afecta la apariencia del fruto, limitando su aceptabilidad en el mercado. En México, se reporta *S. perseae* en la región productora de Michoacán; sin embargo, no se cuenta con estudios sobre la diversidad del patógeno. Los objetivos del presente estudio fueron identificar molecularmente y caracterizar morfológicamente aislados de *S. perseae* procedentes de frutos de aguacate con síntomas de roña, recolectados en cinco regiones agroecológicas de la franja aguacatera de Michoacán. De un total de 450 aislados, obtenidos de frutos de árboles de 4 meses de edad, 112 fueron confirmados como *S. perseae*, mediante PCR con el uso de primers específicos para esta especie SpF5 (GACCGAACCAACTCTTGAC) y SpR6 (CCACACGCCCAATACCAA). Las características

morfológicas de las colonias cultivadas en PDA y EMA permitieron agrupar los aislados en 26 morfotipos.

29

EFICACIA BIOLÓGICA DE HONGOS MICORRÍDICOS ARBUSCULARES (HMA), *Trichoderma* spp. Y BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL EN EL CULTIVO DE EJOTE (*Phaseolus vulgaris* L.) VARIEDAD JADE. [Biological efficacy of fungi arbuscular mycorrhizal fungi (AMF), *Trichoderma* spp and plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR) in the ejote culture (*Phaseolus vulgaris* L.) Jade variety]. Juan Bernardo Jiménez –Pena-gos, Alejandra Castañeda-González y María Elena Márquez-Gutiérrez. Tecnologías Naturales Internacional S.A de C.V. marquez@bactiva.com

El cultivo del ejote constituye una fuente de alimento con alto valor nutricional, principalmente en países en vías de desarrollo; un manejo adecuado garantiza rendimientos rentables. El objetivo fue validar la acción de *Trichoderma* spp., endomicorrizas y PGPR que constituyen la base de los productos Fosfonat^{MR} y Bactiva^{MR} en la fertilización y su acción biofungicida, El experimento se realizó en una unidad experimental de 1.5 hectáreas del Municipio de Atlixco, en el estado de Puebla. Se inocularon plantas de ejote (*Phaseolus vulgaris* L.) variedad Jade con tres tratamientos (I) Fosfonat^{MR} 250g/ha + Bactiva^{MR} 500g/ha (II) Fosfonat^{MR} 500g/ha + Bactiva^{MR} 500g/ha y (III) Testigo comercial. Empleando un diseño de bloques al azar, se evaluó el rendimiento/ha y la incidencia de principales enfermedades. En el muestreo cuatro, de ambos tratamientos, la viabilidad de *Trichoderma* estuvo entre 10,000UFC/g y 43,000UFC/g, con 128 días de siembra, lo cual coincidió con el mayor porcentaje de

micorrización de raíces y cuantificación de esporas de endomicorriza en suelo (50-83%), así como la disminución de incidencia de *Fusarium oxysporum*. un 70% respecto al muestreo inicial. Los tratamientos con mayor dosis demostraron mejor beneficio del área foliar, altura de la planta, y calidad del fruto; se incrementó el desarrollo de la raíz. Bactiva^{MR} y Fosfonat^{MR} pueden formar parte del paquete tecnológico y su uso se recomienda para la fitosanidad y fertilización.

30

INDUCCIÓN DEL MECANISMO DE DEFENSA VS FITOPATÓGENOS Y REDUCCIÓN DEL DETERIORO POSCOSECHA EN FRESA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE OLIGOSACÁRIDOS PÉCTICOS. [Induction of defense mechanism against phytopathogens and reduction of postharvest deterioration in strawberry, through the application of pectic-oligosaccharides]. José Miguel Morales-Ventura, José Juan Virgen-Ortíz, Citlali Colín-Chávez y Miguel Ángel Martínez-Téllez. Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, A.C. & Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., jose.virgen@ciad.mx

La fresa es apreciada debido a sus atributos sensoriales, nutrientes, y compuestos nutraceuticos protectores de la salud. Este fruto es altamente percedero y de reducida vida poscosecha, es susceptible a infecciones fúngicas y deterioro. La estimulación con elicitores de las defensas naturales de la fresa, pueden ser una estrategia sostenible para preservar su calidad poscosecha. El objetivo fue evaluar el efecto de la aplicación de oligosacáridos pécticos (POS) en frutos de fresa cv “Festival”, sobre la actividad de enzimas de defensa, la firmeza y el deterioro de los frutos. Las fresas se

dividieron en lotes, se asperjaron con una mezcla de POS de 2–20 GP, a concentraciones de 0, 2, 5 y 9 g.L⁻¹; y almacenados a 2°C, 90% HR durante 14 días. Periódicamente se evaluó firmeza, deterioro, y actividad enzimática de quitinasa, β -1,3-glucanasa y fenilalanina-amonioliasa (PAL). Los datos se analizaron mediante ANOVA y se realizó la prueba Tukey-Kramer. La actividad quitinasa fue 1.9-2.7 veces mayor en frutos tratados con POS respecto del control. De forma similar, las actividades β -1,3-glucanasa y PAL se incrementaron significativamente. La aplicación de POS redujo la pérdida de firmeza y el deterioro de los frutos. La aplicación poscosecha de POS induce la activación de enzimas relacionadas con la defensa natural de las fresas y reduce significativamente el deterioro durante su conservación poscosecha.

31

INHIBICIÓN *in vitro* DE LOS HONGOS FITOPATÓGENOS *Colletotrichum gloeosporoides* Y *Fusarium pseudocircinatum* CON METABOLITOS PROTEICOS PRODUCIDOS POR *Lactobacillus graminis*. [In vitro inhibition of the phytopathogenic fungi *Colletotrichum gloeosporoides* and *Fusarium pseudocircinatum* by proteinaceous metabolites from *Lactobacillus graminis*].

Sara Marina López-Morales¹, José Juan Virgen-Ortíz^{2,3}, Fabiola Esquivel-Chávez³, Miguel Ángel Martínez-Téllez². ¹Instituto Tecnológico Superior de Uruapan, ²Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. & ³Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, A.C. jose.virgen@ciad.m

El deterioro de hortofrutícolas frescos por hongos fitopatógenos representa un problema importante por las pérdidas poscosecha que genera. En la búsqueda de alternativas de preservación, el uso

de sistemas biológicos mediante microorganismos y sus metabolitos, puede ser una opción viable y ambientalmente segura en comparación con los fungicidas sintéticos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de inhibición *in vitro* de metabolitos proteicos producidos por *Lactobacillus graminis* contra *Colletotrichum gloeosporoides* y *Fusarium pseudocircinatum*, aislados de mango en Michoacán. Los metabolitos proteicos se obtuvieron por fermentación de *L. graminis* en medio MRS, seguido de su separación y semipurificación por fraccionamiento de las proteínas con sulfato de amonio. Las fracciones dializadas y microfiltradas se evaluaron contra el crecimiento micelial de las cepas *C. gloeosporoides* y *F. pseudocircinatum*, por el método de difusión en disco en medio sólido. El crecimiento micelial se analizó con ANOVA y la comparación de medias con la prueba Tukey-Kramer. La fracción proteica obtenida con 40-60% de saturación presentó la mayor actividad antifúngica, con 41.8±4.7 % y 61.2±5.1 % de inhibición micelial frente a *F. pseudocircinatum* y *C. gloeosporoides*, respectivamente, en comparación con el control. *L. graminis*, un sistema biológico poco estudiado, tiene el potencial de producir metabolitos proteicos con actividad de inhibición del crecimiento micelial de los fitopatógenos *C. gloeosporoides* y *F. pseudocircinatum*.

32

NANOPARTICULAS Y RECUBRIMIENTO NANOESTRUCTURADO DE QUITOSANO CON α -PINENO COMO ALTERNATIVA DE CONTROL DE *Alternaria alternata* EN PIMIENTO. [Nanoparticles and nanostructured chitosan edible coating with α -Pineno as an alternative of control of *Alternaria alternata* in bell pepper].

Gonzalo Hernández-López¹, Laura Leticia Barrera-Necha¹, Rosa Isela Ventura-Aguilar². ¹Instituto

Politécnico Nacional-CEPROBI. ²CONACYT-CEPROBI, IPN. Ibarra@ipn.mx.

Los recubrimientos comestibles adicionados con compuestos bioactivos nanoestructurados tienen un mayor efecto sobre el control de microorganismos. Se evaluó el efecto de nanopartículas de quitosano con α -Pino (NQP) y de un recubrimiento (RNQP) sobre la calidad de pimiento en proceso de maduración y su efecto sobre *A. alternata* a 12°C durante 21 días y a 20°C hasta el día 25. Las NQP se elaboraron por el método de nanoprecipitación y se caracterizaron por microscopía electrónica de transmisión (MET). La composición del RNQP fue: 55% de NQP, 44.6% de quitosano al 1%, 0.3% de glicerol y 0.1% de aceite de canola, y fue caracterizado por MET. La calidad se evaluó por la pérdida de peso, firmeza, color y carotenos totales, así como la incidencia y severidad de *A. alternata*. Se utilizaron seis pimientos por unidad experimental con un tratamiento testigo, se analizaron con un ANOVA de dos vías y comparación de medias por Tukey ($P < 0.05$). Se obtuvieron nanopartículas de 2 a 10 nm. Los pimientos tratados con NQP y RNQP perdieron 5 y 3% de peso, respectivamente y se redujo el tiempo en su firmeza comparado con el testigo. Los carotenos totales disminuyeron por la presencia de *A. alternata*. Además, la enfermedad se presentó al día 22 y la severidad fue constante en todos los frutos. El uso de NQP y del RNQP puede ser una alternativa para el manejo de *A. alternata* en pimiento.

33

CONTROL DE *A. alternata* EN HIGO ALMACENADO A BAJAS TEMPERATURAS UTILIZANDO UN RECUBRIMIENTO BIODEGRADABLE. [Control of *A. alternata* in fig

stored at low temperatures using a biodegradable coating]. Sergio Contreras-Saavedra, Laura Leticia Barrera-Necha, Rosa Isela Ventura-Aguilar, Mónica Hernández-López, Gonzalo Hernández López. Instituto Politécnico Nacional CEPROBI. Ibarra@ipn.mx.

Alternaria alternata es un hongo que causa podredumbre al fruto del higo en la etapa postcosecha evitando que el fruto se comercialice. Una alternativa para contrarrestar este problema, es usar recubrimientos comestibles (RC). El objetivo fue evaluar el efecto de un RC de quitosano, funcionalizado con aceite esencial de canela y extracto de jamaica en el manejo de *A. alternata* y la calidad del higo en dos estados de madurez. Los frutos fueron almacenados a 5 °C y aclimatados a 20 °C, se evaluaron los siguientes tratamientos: T1 testigo, T2 frutos con el recubrimiento, T3 frutos recubiertos e inoculados con *A. alternata* (preventivo), T4 frutos inoculados y después recubiertos (curativo) y T5 frutos inoculados. Se midió la incidencia y severidad de *A. alternata*, en el fruto, la pérdida de peso, firmeza, cambios de color, sólidos solubles totales, acidez titulable, contenido de antocianinas, capacidad antioxidante y respiración. Se aplicó un ANOVA de dos vías y comparación de medias de Tukey ($P < 0.05$). La incidencia y severidad de *A. alternata* fue mayor en higos maduros y durante la aclimatación. El hongo provocó mayor respiración, pérdida de peso e incrementó la capacidad antioxidante en frutos inmaduros principalmente. El RC tuvo mejor efecto cuando se aplicó de manera preventiva que de manera curativa. De manera general, las tecnologías empleadas durante esta investigación tuvieron mejor efecto en higos inmaduros, ya que fueron los que mejor respondieron a los tratamientos aplicados y preservaron la calidad del producto.

34

OBTENCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE FENOLES DE UN EXTRACTO ETANÓLICO DE LA CÁSCARA DE HIGO Y SU ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA SOBRE HONGOS POSTCOSECHA. [Obtention and quantification of phenols of ethanolic extract of the fig skin and its antifungal activity on postharvest fungi]. María Alejandra Is-túriz-Zapata¹, Mariana Pérez-García¹, Sergio Contreras-Saavedra¹, Laura Leticia Barrera-Necha^{1*}. Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos¹ lbarrera@ipn.mx

Los residuos generados durante la producción del higo constituyen una alternativa novedosa para revalorizar la operación productiva del higo. Los polifenoles son compuestos que están presentes mayoritariamente en la piel de frutos de higo, poseen actividad antioxidante y antimicrobiana. El objetivo de este trabajo fue obtener piel de frutos de higo, extractos etanólicos para cuantificar su contenido de fenoles, antocianinas y su actividad antioxidante. Se determinó la tasa de crecimiento micelial (TC), inhibición del crecimiento micelial (ICM), esporulación y germinación, por el método de dilución en agar a diferentes concentraciones del extracto etanólico (2.5 a 50 mg/ml). Los hongos evaluados fueron *Colletotrichum acutatum*, *Fusarium solani*, *Penicillium oxallicum* y *Rhizopus stolonifer*. Se aplicó un ANOVA y comparación de medias por Tukey ($P < 0.0001$). La concentración de los polifenoles totales y antocianinas fueron mayores en la piel del higo, comparadas con las del extracto etanólico. En contraste la capacidad antioxidante del extracto fue mayor (32.9 $\mu\text{mol/g}$) comparada con la piel de higo (21.7 $\mu\text{mol/g}$). En general los hongos presentaron TC similares al control y baja inhibición del crecimiento micelial (23 a 30%). En *F. solani* la esporulación fue de 0.0

esporas/ml a concentraciones de 7.5 a 25 mg/ml. El porcentaje de germinación de esporas en *R. stolonifer* fue de 0 a 5 % a concentraciones de 7.5 a 50 mg/ml. Se concluye que los residuos derivados del higo poseen compuestos fenólicos que presentan actividad antifúngica.

35

DETERMINACIÓN DE QUITINA EN HONGOS POSTCOSECHA Y DE QUITINASAS EN FRUTOS DE PAPAYA "MARADOL". [Determination of chitin in postharvest fungi and chitinases in fruit of papaya "Maradol"]. Jesús Armando Lucas-Bautista, Silvia Bautista-Baños, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional. Rosa Isela Ventura-Aguilar, CONACYT-Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional. Marlenne Gómez-Ramírez, Centro de Investigación de Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, Instituto Politécnico Nacional. E-mail: lukairo21@gmail.com

La quitina es un biopolímero que conforma la pared celular de hongos filamentosos y es degradada por quitinasas mediante la hidrólisis de sus enlaces β -1,4. El fruto de papaya es afectado por diversos hongos que ocasionan pérdidas en postcosecha y, para su control, la detección debe ser rápida y oportuna; en este sentido, los biosensores podrían ser una opción de dicha detección al reconocer el analito que esté involucrado con su presencia como, por ejemplo, la quitina y quitinasas. En este trabajo se cuantificó la quitina presente en hongos fitopatógenos que afectan al fruto de papaya obteniendo valores estadísticamente significativos ($p \leq 0.05$) entre 13 % (*Alternaria alternata*) y 37% (*Penicillium* sp.) de quitina en su biomasa total. Asimismo, se determinó el contenido de quitinasas presentes en cáscara del fruto en cuatro estados de

madurez obteniendo valores significativamente diferentes ($p \leq 0.05$): entre 12,473 (0-25 % coloración amarilla) y 15,514 (100 % coloración amarilla) unidades de quitinasa g^{-1} en muestras congeladas y entre 21,085 (0 %) y 29,457 (25 % coloración amarilla) unidades de unidades de quitinasa g^{-1} en muestras liofilizadas. Estos resultados preliminares forman parte de una primera etapa de reconocimiento de indicadores biológicos para el diseño de un biosensor para su aplicación en papaya.

36

EFFECTO DE LA RESINA DE PINO COMERCIAL SOBRE EL DESARROLLO DE *Colletotrichum gloeosporioides* EN MANGO Y SU EVALUACIÓN EN CALIDAD. [Effect of the commercial pine resin on the development OF *Colletotrichum gloeosporioides* in mango and its evaluation in quality].

Cindy Salas-Marcial, S. Alexa Castañón-Viveros, Margarita Ramos-García. Facultad de Nutrición, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Dagoberto Guillen Sánchez. Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc. cindysalas84@gmail.com

Colletotrichum gloeosporioides es responsable de pérdidas económicas en postcosecha que oscilan entre un 40 y 90% del total de producción de mango. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de la resina de pino comercial sobre *C. gloeosporioides* en mango en comparación a otros químicos y su evaluación de calidad. El hongo se aisló en medio PDA. Se realizó una solución de esporas de 1×10^{10} esp mL^{-1} de *C. gloeosporioides*. Se evaluaron 5 tratamientos (resina de pino al 2%, cuaternarios de amonio al 1%, Cu al 2%, Procloraz al 0.3% y agua corriente). Los frutos se sumergieron durante 15 s en los tratamientos, previo y posterior a la inoculación. Se utilizaron 27 frutos por tratamiento

con madurez fisiológica verde sazón. Se evaluó el crecimiento micelial en el fruto (cm) y se realizaron pruebas de calidad (pérdida de peso, firmeza y solutos solubles totales). Los frutos se almacenaron durante 15 días a una temperatura de 28 ± 2 °C. Los resultados mostraron que la resina de pino al 2% aplicada previa y posterior a la inoculación (3.43 y 3.29 cm, respectivamente), fue estadísticamente similar al fungicida químico Procloraz (3.19 y 2.82 cm, respectivamente). Con respecto a las pruebas de calidad, no se observaron diferencias estadísticas entre las soluciones. La resina de pino disminuye el crecimiento de *C. gloeosporioides* estadísticamente similar al químico (Procloraz).

37

FOSFITO DE POTASIO Y QUITOSANO EN EL CONTROL DE LA ROYA ASIÁTICA DE LA SOYA. [Potassium phosphite and chitosan on the control of asian soybean rust].

Paulino Fernández-Salinas¹, Guillermo Andrés Enciso-Maldonado². ¹Genética Vegetal del Paraguay S. A., Paraguay; ²Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica, Paraguay. gui77eenciso@hotmail.com

La roya asiática de la soya (RAS) (*Phakopsora pachyrhizi*) es la enfermedad de mayor importancia económica en Paraguay. El objetivo fue evaluar el efecto del fosfito de potasio (FP) y quitosano sobre la severidad de la RAS, la eficacia de control, la defoliación y el rendimiento de soya. El experimento se realizó en Yguazú (Paraguay) bajo un diseño en bloques completos al azar con 7 tratamientos y 4 repeticiones. Los tratamientos fueron: T1: Testigo (Agua); T2: Fungicida (F); T3: FP (P 54%, K 36%) + F; T4: FP (P 30%, K 20%) + F; T5: Quitosano (2.5%) + F; T6: Quitosano (1.8%) + FP (P 14.8%, K 7.4%) + F; T7: FP (P 55.2%, K 13.8%) + F. Los tratamientos se aplicaron en R1 y R4. La comparación

de medias se realizó con la prueba de Tukey ($P < 0.05$). Se observaron diferencias significativas entre los tratamientos. T3, T4, T6, T2 y T7 alcanzaron los menores valores de severidad con 5.5, 6.4, 7.5, 7.6 y 7.9 %, respectivamente, y mayor eficacia de control, mientras que T5 y T1 alcanzaron 9.2 y 64 %. Los tratamientos mostraron rendimientos estadísticamente iguales, entre 3333 y 3533 kg.ha⁻¹, excepto T1 que fue estadísticamente diferente con rendimiento de 2741 kg.ha⁻¹. La mayor defoliación ocurrió en el testigo, sin observarse diferencia entre los demás tratamientos. Se concluye que el FP y el quitosano reducen la severidad de la RAS e incrementan el rendimiento de la soja.

38

EVALUACIÓN DE INDUCTORES DE RESISTENCIA EN EL CONTROL DE *Macrophomina phaseolina* EN SOJA. [Evaluation of resistance inducers in the control of *Macrophomina phaseolina* in soybean]. Marco Maidana-Ojeda^{1,2}, Eder Gustavo Aquino¹; José David Caballero¹; Marta Alicia Fernández-Gamarra²; Guillermo Andrés Enciso-Maldonado². ¹Universidad Nacional de Itapúa; ²Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Itapúa. gui77eenciso@hotmail.com

La pudrición carbonosa de la soja, causada por *Macrophomina phaseolina*, es una de las enfermedades más importantes de este cultivo, ocasiona daños de diversa magnitud, presenta alta incidencia y severidad en periodos prolongados de condiciones cálidas y secas. El tratamiento de plantas con inductores de resistencia es una alternativa que se ha venido implementando frente al control de enfermedades en diferentes cultivos agrícolas. El objetivo de este trabajo fue evaluar la eficacia de los inductores de resistencia: Biozyne®, Fosfito de K®, Foltron®, Fosfanato de K® y Euro Fix®, a

concentraciones comerciales y un testigo sin aplicación de producto sobre el control de *Macrophomina phaseolina* en soja a campo. El diseño metodológico utilizado fue de bloques completos al azar (DBCA), con seis tratamientos y cuatro repeticiones. Los tratamientos se aplicaron a la planta a los 60 días después de la siembra. Las variables evaluadas fueron incidencia (%), severidad (%), número de vainas por metro cuadrado, peso de 100 semillas (g) y rendimiento (kg/ha). Los resultados arrojaron diferencias estadísticas no significativas para todas las variables evaluadas, llegando a la conclusión que no hubo afectación por la aplicación de los diferentes inductores de resistencia evaluados para el control de *Macrophomina phaseolina* en soja.

39

CONTROL BIOLÓGICO *in vitro* DE ESPECIES DE *Fusarium* ASOCIADAS A LA MANCHA NEGRA DEL NOPAL VERDURA VARIEDAD MILPA ALTA. [In vitro biological control of *Fusarium* species associated with the black spot of the nopal pads variety Milpa Alta]. Álvaro González-Hernández, Dagoberto Guillen-Sánchez, Víctor López-Martínez, Porfirio Juárez-López, Edgar Martínez-Fernández, Daniel Bárcenas-Santana. Facultad de Agronomía, UAEM. jet-lis19@hotmail.com

En Tlalnepantla, Morelos la productividad y calidad del nopal verdura se reduce por la mancha negra. El objetivo fue identificar, evaluar la patogenicidad y encontrar alguna alternativa de control biológico a las especies asociadas a esta enfermedad. Se colectaron muestras en Tlalnepantla, Mor. y sembraron en PDA. Se identificaron morfológicamente y molecularmente. Para las pruebas de patogenicidad se utilizaron cladodios de tres, siete y 18 meses. Se inocularon discos de PDA con micelio y con

suspensión 1×10^6 esporas/mL en cinco puntos de cada cladodio; se mantuvieron en cámaras húmedas. Se probaron ocho extractos vegetales acuosos *in vitro* el diseño fue completamente al azar con 4 repeticiones en concentraciones de 50, 75 y 100%. Se realizó un análisis estadístico y prueba de medias con SAS 9.0. Al comparar la secuencia en la base de datos NCBI las especies identificadas fueron *F. equiseti* y *F. lunatum*. Hubo diferencias de severidad con respecto a la edad de cladodios, pero no en el método de inoculación. *F. equiseti* es más severo en cladodios de 3 y 7 meses y *F. lunatum* en cladodios de 18 meses. Los extractos con buena efectividad para *F. lunatum* de 100% fueron eucalipto, neem, ajo, manzanilla y chirimoyo; para *F. equiseti* superior al 75% sauce y neem. La severidad de especies de *Fusarium* identificadas difiere en cuanto a la edad de los cladodios. Se consideran como viables los extractos con efectividad mayor al 70%.

40

HONGOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE CHÍA EN PARAGUAY [Fungi associated with chia crop in Paraguay]. Alicia Beatriz Albrecht-Encina¹, Mónica Liliana Albrecht-Encina¹; Guillermo Andrés Enciso-Maldonado², Marco Maidana-Ojeda². ¹ Universidad Nacional de Itapúa; ² Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Itapúa. alicciaa2009@gmail.com

La chía (*Salvia hispanica*) posee incipiente importancia como cultivo agrícola en Paraguay. Considerando que es un cultivo rentable, con potencial de desarrollo y que existe poca información sobre las enfermedades que pueden afectar a la chía en el Paraguay, se realizó el trabajo de investigación con el objetivo de determinar los hongos asociados a la chía, así como la especificación de la capacidad de ser benéficos o patógenos. Se colectaron muestras

de hojas, tallos y raíces de los Departamentos de Itapúa y Misiones durante los ciclos productivos de 2016, 2017 y 2018. Los aislamientos se realizaron en medio PDA (papa-dextrosa-agar). La identificación se hizo con apoyo de claves taxonómicas y PCR. Durante el periodo de estudio se identificaron 11 géneros de hongos. En 2016, *Fusarium equiseti*, *F. solani* y *Alternaria* se encontraron asociadas al cultivo de chía en Itapúa y Misiones. Además, en Itapúa se detectó a *Curvularia* y *Rhizoctonia*, y en Misiones a *Sclerotinia* y *Beauveria*, todos aislados a partir de hojas. En 2017, se identificó *Curvularia*, *Rhizoctonia*, *Colletotrichum* y *Trichoderma* en Itapúa, y *Sclerotinia*, *Fusarium* y *Trichoderma* en Misiones. En 2018, se detectó a *F. equiseti*, *F. solani*, *Trichoderma*, *Macrophomina phaseolina* y *Lasiodiplodia* en Itapúa y *F. equiseti*, *F. solani* y *Mucor circinelloides* en Misiones. De acuerdo al diagnóstico realizado, se detectaron hongos potencialmente patógenos como *Fusarium*, *Macrophomina*, *Sclerotinia*, *Rhizoctonia*, *Colletotrichum*, *Macrophomina* y *Alternaria*, como también hongos con potencial efecto benéfico como *Trichoderma* y *Beauveria*.

41

INHIBICIÓN MICELIAR DE *Cladosporium* sp. CON PRODUCTOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS [Mycelial inhibition of *Cladosporium* sp. with chemical and organic products]. Sergio Ayvar-Serna¹, José Alfredo Flores-Yáñez², Mateo Vargas-Hernández², Clemente de Jesús García-Ávila³, Benito Alcaide-Carranza¹. ¹CEP-CSAEGro, ²Posgrado en Protección Vegetal UACH, ³Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, SENASICA. ayvarsernas@gmail.com

En 2017, la producción de frijol en México generó >\$16 mil millones de ingresos. Durante el cultivo de esta legumbre es constante observar

manchas necróticas en las hojas, lo cual disminuye su productividad. En el marco de una agricultura sustentable, se evaluó la sensibilidad de *Cladosporium* a moléculas químicas y orgánicas para generar información útil para disminuir aplicaciones de químicos. En Tepecoacuilco, Gro., se colectaron hojas de frijol con manchas necróticas, de estas se obtuvo un cultivo monospórico fungoso, se evaluó su patogenicidad mediante aspersión conidial en hojas de frijol y se evaluaron los tratamientos: T1= Control, T2= iodo libre (Q-2000®), T3= mancozeb (MANZATE®), T4= benomilo (PROMYL®), T5= captan (CAPTAN®-50WP), T6= sulfato de cobre (COMET®), T7= *Azadirachta indica* (NIMAX®) y T8= *Allium sativum* (ALLIUM®-LIQUIDO), distribuidos completamente al azar con 4 repeticiones; la unidad experimental fue una caja Petri (Ø= 8 cm) con 20 mL de PDA + la dosis recomendada por el fabricante de los productos. Se evaluó el porcentaje de inhibición de las colonias cada 24 h por 7 días. Se realizó un ANOVA y una comparación de medias de Tukey. El aislamiento se identificó como *Cladosporium* sp. y resultó patogénico en hojas sanas de frijol; además, se encontraron evidencias ($P < 0.0001$) de que el mancozeb, benomilo, captan y sulfato de cobre ejercen acción fungicida contra el hongo, mientras que el iodo libre y el extracto de *A. indica* ejercieron acción fungistática; el extracto de *A. sativum* no inhibió el crecimiento del hongo.

42

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR Y PATOGENICIDAD DE AISLADOS DE *Fusarium* ASOCIADOS A PUDRICIÓN SECA DE LA PAPA EN AHOME, SINALOA. [Molecular identification and pathogenicity of *Fusarium* isolates associated with dry rot on potato in Ahome, Sinaloa]. Edgar Edel Rodríguez-Palafox¹, David Alonso Cota-Rodríguez¹, Hugo Beltrán-Peña¹, Moisés Camacho-Tapia², Gerardo Leyva-Mir², Juan Ma-

nuel Tovar-Pedraza³. ¹Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Los Mochis. ²Universidad Autónoma Chapingo, Parasitología Agrícola. ³CIAD–Coordinación Culiacán. juan.tovar@ciad.mx

El objetivo fue identificar mediante análisis filogenéticos a las especies de *Fusarium* asociadas a papa (*Solanum tuberosum*), así como determinar su patogenicidad. Durante marzo de 2019, se recolectaron plantas de papa con pudrición de tallos y tubérculos en un campo comercial en Ahome, Sinaloa. Se obtuvieron y purificaron un total de 10 aislados de *Fusarium*. La identificación molecular de tres aislados representativos se realizó mediante análisis filogenético usando secuencias del gen de factor de elongación de la traducción (EF-1 α). El análisis filogenético usando el criterio de máxima parsimonia agrupó a los tres aislados dentro del complejo de especies de *F. oxysporum*, sin embargo, los datos de secuencias EF-1 α no mostraron el soporte suficiente para distinguir dentro de las especies crípticas de este complejo. La patogenicidad de los tres aislados se verificó en plántulas y tubérculos de papa var. Alpha, los cuales se inocularon con discos de agar con micelio. Los tallos inoculados presentaron síntomas de pudrición después de tres días, mientras que, los tubérculos presentaron pudrición siete días después de la inoculación. En conclusión, se determinó que aislados pertenecientes al complejo de especies crípticas de *F. oxysporum* son causantes de la pudrición seca en papa en Sinaloa. Se realizará posteriormente la amplificación de secuencias RPB2 con la finalidad de dar mayor soporte al análisis filogenético y determinar las especies de *Fusarium* involucradas en este estudio.

43

MORFOLOGÍA, FILOGENIA Y PATOGENICIDAD DE *Colletotrichum coccodes* CAUSAN-

DO PUNTEADO NEGRO DE LA PAPA EN AHOME, SINALOA. [Morphology, phylogeny, and pathogenicity of *Colletotrichum coccodes* causing black dot of potato in Ahome, Sinaloa]. David Alonso Cota-Rodríguez¹, Juan Luis Pérez-Mora¹, Elizabeth García-León², Nelson Bernardi Lima³, Moisés Camacho-Tapia⁴, Juan Manuel Tovar-Pedraza⁵. ¹Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Los Mochis. ²INIFAP–Valle del Fuerte. ³CONICET–INTA, Argentina ⁴Universidad Autónoma Chapingo, LANISAF. ⁵CIAD–Coordinación Culiacán. juan.tovar@ciad.mx

Durante el ciclo 2018–2019, se observaron síntomas de punteado negro en tallos de papa en un campo comercial en Ahome, Sinaloa. El objetivo de este estudio fue identificar al hongo asociado a la enfermedad mediante caracterización morfológica y análisis filogenético, así como verificar su patogenicidad. Se recolectaron 10 tallos de papa con necrosis y microesclerocios negros. Se obtuvieron 10 aislados monospóricos de *Colletotrichum* y se realizó una caracterización morfológica de las estructuras de reproducción y de las colonias. La identificación molecular se realizó para dos aislados representativos, a los cuales se les extrajo el ADN y se amplificó por PCR la región completa ITS y parte de los genes de gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa y actina. La patogenicidad de los dos aislados se verificó en tallos y tubérculos de papa var. Alpha, los cuales se inocularon con discos miceliales. Los resultados de la morfología coincidieron con las reportadas previamente para *C. coccodes*. El análisis filogenético usando el criterio de inferencia Bayesiana agrupó a los aislados dentro clado de *C. coccodes*. Los tallos inoculados presentaron síntomas de necrosis después de tres días, mientras que, los tubérculos presentaron lesiones necróticas ocho días después de la inoculación. Los tallos control no presentaron síntomas de enferme-

dad. Con base en morfología, filogenia y pruebas de patogenicidad, se confirmó que *C. coccodes* es el agente causal del punteado negro de la papa en Ahome, Sinaloa.

44

PATOGENICIDAD DE AISLAMIENTOS DE *Fusarium* sp., *Phoma* sp. Y *Stemphylium* sp. EN GARAMBULLO (*Myrtillocactus geometrizans*). [Pathogenicity of isolates of *Fusarium* sp., *Phoma* sp. and *Stemphylium* sp. in garambullo]. Diana Isabel García-Pérez, Ana Lilia López-Herrera, Jesús Alejandro González-Lara, Luis Pérez-Moreno y Diana Sanzón-Gómez. Departamento de Agronomía, División de Ciencias de la Vida, Campus Irapuato-Salamanca, Universidad de Guanajuato. Responsable: dianasg7@yahoo.com.mx

El garambullo crece de manera silvestre en zonas áridas del norte de Guanajuato, México y se ha observado recientemente un aumento en la incidencia de plantas enfermas. El objetivo de este trabajo fue determinar la patogenicidad de aislados de *Fusarium* sp., *Phoma* sp. y *Stemphylium* sp. obtenidos de garambullos enfermos. Plantas sanas de 15 cm de altura colectadas en campo se inocularon con un disco de PDA con micelio de colonias en crecimiento activo y se mantuvieron bajo condiciones de malla sombra. Se hicieron 16 repeticiones por tratamiento y un testigo sin micelio. A 36 días después de la inoculación (ddi) se midió el avance del daño (cm), la descripción e incidencia (%) de síntomas. A los 74 ddi se reaisló al agente causal. No hubo diferencia en el avance del daño entre tratamientos y los síntomas característicos fueron: Testigo, el 100% de las plantas presentó abultamiento de color beige-crema y textura ligeramente lisa; *Fusarium*, el 43.8% presentó abultamiento color beige y textura áspera y seca; *Phoma*, el 68.7%

presentó color café claro con presencia de picnidios y abultamiento marcado de textura áspera y seca; *Stemphylium*, el 62.5% presentó abultamiento en las orillas, centro hundido de coloración negra y polvoriento. Los tres hongos se reaislaron de las plantas donde se inocularon.

45

DIAGNÓSTICO DE ANTRACNOSIS EN PLANTAS DE MANGO (*Mangifera indica* L.) EN EL NARANJO, SAN SEBASTIÁN NOPALERA, OAX. [Diagnosis of anthracnose (*Colletotrichum gloeosporioides*) on mango (*Mangifera indica* L.) cultivation at El Naranjo, San Sebastián Nopalera, Oax.]. Elias David Hernández-Cruz¹, Norma Amariani Hernández-Sánchez¹, Isaías Bautista-Bautista¹, Johan Kevin Bautista-Peña¹, Miguel Ángel Bautista-Caballero¹, Eric Osvaldo Bautista-Hernández¹, Elizabeth Belén Barrios-Jiménez¹, Javier Castillo-Cabrera¹, Jesús Castillo-Cabrera¹, Yesenia González-Guzmán³, Ezequiel Fuentes-García¹ y Alfonso Vásquez-López². ¹Instituto Tecnológico del Valle de Etlá Nudo San Sebastián Nopalera. Oaxaca. ²Instituto Politécnico Nacional. CIIDIR-OAXACA. ³Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Oaxaca, México. cone_cruz94@hotmail.com

El cultivo de mango (*Mangifera indica* L.) tiene gran importancia económica en la ranchería el Naranjo, San Sebastián Nopalera, ya que dinamiza la economía local de la comunidad. Recientemente el cultivo de mango es afectado por diversas enfermedades ocasionadas por hongos fitopatógenos que causan pérdidas cuantitativas en la producción. El objetivo de la presente investigación fue identificar los hongos fitopatógenos que causan daño y merman la producción del mango. El muestreo se realizó en huertos de mango de variedad manila seleccionando 5 árboles enfermos durante la etapa

de producción, tomando hojas, frutos y flor. El material vegetal se desinfectó con NaOCl al 2%, posteriormente se lavó con agua destilada y se sembró en medio de cultivo (PDA). Se incubaron a temperatura ambiente (22-25°C) luz natural. Después de 15 días se identificó el hongo asociado a esta sintomatología, a nivel de género y se utilizaron claves taxonómicas. En las muestras vegetales analizadas se aisló *Colletotrichum gloeosporioides* (antracnosis). Al identificar el agente causal de la enfermedad en estudio, se decide establecer programas fitosanitarios que permitan reducir la pérdida de frutos de calidad comercial en esta zona.

46

INOCULACIÓN DE HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN GUANÁBANA CON ESTRÉS HÍDRICO EN INVERNADE-RO. [Inoculation of arbuscular mycorrhizal fungi in graviola with water stress at greenhouse]. Michelle González-López, Evangelina E. Quiñones-Aguilar, Cecilia Guízar-González, Jhony Enríquez-Vara, Gabriel Rincón-Enríquez*. Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ. *grincon@ciatej.mx.

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) promueven el crecimiento de plantas y confieren tolerancia al estrés hídrico. El objetivo de este estudio fue evaluar dos especies de HMA (*Funneliformis mosseae*; FM y *Rhizophagus intraradices*; RI) y dos consorcios (Cerro del Metate: CM; Agua Dulce: AD) en la tolerancia a estrés hídrico en *Annona muricata*. Se utilizaron plántulas de guanábana de 60 días. Se estableció un experimento bifactorial (cinco niveles HMA: FM, RI, CM, AD y sin HMA; dos niveles de riego: normal: 63% humedad en sustrato y bajo: 29%) con seis repeticiones. Las variables evaluadas después de 1.5 años de la micorrización fueron: altura de planta (AP), diámetro de tallo (DT), contenido de clorofila relativa (CR)

y eficiencia del fotosistema II (Phi2). Independientemente del régimen de riego, las plantas micorrizadas con CM presentaron mayor AP que el control (102 ± 5.3 y 81 ± 8.4 cm respectivamente; Tukey $P\leq 0.05$); de igual manera, las plantas con los consorcios de HMA CM y FM presentaron mayor DT que el control (14.02 ± 0.7 , 14.57 ± 0.9 , 11.65 ± 1.2 , respectivamente; Tukey $P\leq 0.05$). El contenido de CR fue mayor en plantas con CM respecto al control (39 ± 1.1 , 34 ± 1.2 respectivamente; Tukey $P\leq 0.05$). No se observaron diferencias en Phi2 entre plantas tratadas con micorrizas y el control; sin embargo, se observó interacción significativa entre los dos factores. Se concluye que el consorcio CM y la especie FM son inoculantes micorrízicos con capacidad promotora de crecimiento y pueden contribuir a tolerar el estrés hídrico en *A. muricata* en etapa de vivero.

47

IDENTIFICACIÓN DE HONGOS ASOCIADOS A CANCRO Y MARCHITEZ DE CUPRESÁCEAS EN MÉXICO. [Identification of fungi associated to Cupressaceae canker and wilt in Mexico]. Jire Ajeleth Muñoz-Jaimes, Lervin Hernández-Ramos, Magnolia Moreno-Velázquez, Nayeli Carrillo-Ortiz, Adrián González-Saucedo. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, Dirección General de Sanidad Vegetal-SENASICA. jire.munoz.i@senasica.gob.mx

En ramas y hojas de *Cupressus* sp. y *Chamaecyparis lawsoniana* procedentes de Chihuahua y Estado de México respectivamente, se observaron canchros en ramas y cambios en la coloración de hojas. El objetivo del trabajo fue determinar los organismos fungosos asociados a la sintomatología observada. Fragmentos de tejido vegetal sintomático, sin desinfectar y fragmentos desinfectados con

hipoclorito de sodio al 1% y enjuagados con agua destilada estéril fueron sembrados medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA), e incubados a $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$, así como en papel secante bajo las mismas condiciones de incubación y humedad del 80%. La identificación de los organismos partió de cultivos monospóricos en PDA, obtenidos a partir del desarrollo de organismos fungosos sobre el tejido vegetal. La identificación morfológica se basó en claves dicotómicas, corroborada mediante secuenciación de la región ITS y la reconstrucción filogenética con secuencias de referencia. *Alternaria* sp. *Cladosporium* sp. y *Didymella* sp. fueron aislados e identificadas por morfología a partir de las dos especies vegetales, corroborando molecularmente a este último como *D. coffea-arabicae*. Para *Chamaecyparis lawsoniana*, mediante filogenia molecular se identificaron: *Trichoderma atrovirise*, *Seiridium unicorne* y *D. curtisii*. Para *Cupressus* sp. se identificó por morfología a *Epicoccum* sp. y *Pestalotiopsis* sp., y mediante secuenciación a *D. subglomerata* y *D. glomerata*. Derivado de la diversidad obtenida, la siguiente fase de la investigación consistirá en la realización de pruebas de patogenicidad, con el objetivo de determinar el o los agentes causales que ocasionan la sintomatología observada.

48

DIFERENCIACIÓN MORFOLÓGICA E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE AISLADOS DE *Pestalotiopsis* spp. [Morphological differentiation and molecular identification of *Pestalotiopsis* spp. isolates]. Adrián González-Saucedo¹, Lervin Hernández-Ramos¹, Jire Ajeleth Muñoz-Jaimes¹, Magnolia Moreno-Velázquez¹, Nayeli Carrillo-Ortiz¹. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, DGSV-SENASICA¹. adrian.gonzalez@senasica.gob.mx

El género *Pestalotiopsis* incluye hongos saprófitos y fitopatógenos, cuya diferenciación morfológica presenta limitaciones dado que su variación intra e interespecífica, dificulta el establecimiento robusto de límites entre especies. El análisis filogenético a través de secuencias de genes es una herramienta que permite diferenciar especies, cuando los caracteres morfológicos no son concluyentes. El objetivo de estudio fue determinar la diversidad morfológica de diferentes aislados de *Pestalotiopsis* contrastándolos con su identificación molecular. Catorce aislados procedentes de diferentes cultivos y localidades se caracterizaron morfológicamente por su tasa de crecimiento micelial, pigmentación colonial, pigmentación conidial, longitud y ancho conidial, longitud del apéndice basal, y número y longitud de los apéndices apicales. Se establecieron las relaciones filogenéticas de los aislados a través del análisis de secuencias de la región ITS1, 5.8S e ITS2 del ADNr. Molecularmente se determinaron las especies: *Neopestalotiopsis clavispora*, *N. foedans*, *Pestalotiopsis caudata*, *P. humus*, *P. mangiferae*, *P. microspora*, *P. versicolor* y *P. virgatula*, encontrando variación morfológica para los aislados de *N. clavispora* y *N. foedans* provenientes de diferentes cultivos hospedantes. El análisis de secuencias de la región ITS brindó información útil para la determinación de especies; sin embargo, el análisis complementario de otros genes como β -tubulina y factor de elongación podría aportar mayor robustez en casos donde los caracteres morfológicos y las secuencias de la región ITS no son suficiente polimórficas.

49

INTERACCIÓN DE *Lasiodiplodia theobromae* Y HUANGLONGBING CAUSANDO MUERTE DE RAMAS EN LIMÓN MEXICANO.

[Interaction of *Lasiodiplodia theobromae* and citrus huanglongbing causing death of branches in Mexican lime trees]. José Joaquín Velázquez-Monreal¹, Rafael Ríos-Velazco¹, Ángela Paulina Arce-Leal², Mario Orozco-Santos¹ y Francisco Javier Delgado-Virgen³. ¹INIFAP, Campo Experimental Tecomán. ²IPN, CIIDIR-Unidad Sinaloa. ³IT de Colima. velazquez.joaquin@inifap.gob.mx

El cultivo de limón mexicano (LM) afectado por Huanglongbing (HLB) presenta también fuerte daño por muerte de ramas (MR). El objetivo de este trabajo fue determinar la etiología de MR. Para lo cual se realizaron los postulados de Koch. En INIFAP-Colima, plantas de LM se inocularon con HLB en invernadero, confirmándose la infección a las 4 y 8 semanas mediante PCR tiempo real en el IPN-CIIDIR-Unidad Sinaloa. En campo se colectaron muestras de MR en LM y limón persa (LP); además de una muestra de fruto de mango con necrosis, de Jalisco. Se hicieron siembras de las muestras en medio PDA, los hongos aislados se identificaron considerando sus características morfológicas. Tres aislados de hongo obtenidos de LM, uno de LP y uno de mango se inocularon cada uno en cinco plantas de LM previamente infectadas con HLB y se incluyó un testigo. De plantas que mostraron MR se reaisló el hongo. Como resultado primero se confirmó la infección por HLB (*Candidatus Liberibacter asiaticus*) en las plantas de LM. De las muestras de campo se aisló un hongo identificado como *Lasiodiplodia theobromae*. Los cinco aislados de este patógeno causaron MR en las plantas de LM, con incidencia de 40 a 100%, sin manifestarse en el testigo. De las plantas que resultaron enfermas se reaisló a *L. theobromae*, cumpliéndose los postulados de Koch, como agente causal de MR en árboles afectados por HLB.

PUDRICIÓN DE LA MAZORCA EN MAÍZ (*Zea mays* L.) EN ZONAS TROPICALES DE MÉXICO. [Decay of the maize cob (*Zea mays* L.) in tropical zones of Mexico]. Santos Gerardo Leyva-Mir¹, Alma Rosa Solano-Báez², Viridiana García-Reyes¹, Guillermo Marquez-Licon³, Moisés Camacho-Tapia⁴. ¹Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. ²Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. ³Instituto Politecnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ⁴Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, Universidad Autónoma Chapingo. lsantos@correo.chapingo.mx

El maíz (*Zea mays*) es una especie que pertenece a la familia Poaceae. *Z. mays* es una planta anual, de porte robusto, con un tallo simple y erecto, originaria de México y cultivada por debajo del nivel del mar y hasta los 3800 msnm. La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar morfológica y molecularmente al agente causal de la pudrición de mazorca en los estados de Hidalgo y Tabasco. Las muestras fueron recolectadas 2018, y después fueron llevadas al laboratorio de Micología del Departamento de Parasitología Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo, donde se realizó la caracterización morfológica y molecular del hongo presente en ambas muestras. En seguida mediante la aplicación de los postulados de Koch se confirmó la patogenicidad de los aislamientos provenientes de las muestras de cada estado. Las características morfométricas del hongo presente en las muestras de Hidalgo y Tabasco coincidieron con las descritas para la especie *S. maydis*, lo cual fue apoyado por el análisis de la secuencia de ADN obtenida que mostró un 99% de identidad con esta especie. Ambos aislamientos causaron tizón foliar en plántulas de maíz.

ETIOLOGÍA DE LA PUDRICIÓN DEL MAÍZ (*Zea mays* L.) EN VERACRUZ, MÉXICO. [Etiology of rot corn (*Zea mays* L.) in Veracruz, Mexico]. Santos Gerardo Leyva-Mir¹, Zenaida Juárez-Luna¹, Leticia Robles-Yerena¹, Dimas Mejía-Sánchez¹, Moisés Camacho-Tapia². ¹Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. ²Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, Universidad Autónoma Chapingo. lsantos@correo.chapingo.mx

Se recolectó material en los municipios de Espinal, Tlapacoyan y Misantla, Veracruz Méx., los cuales presentaban síntomas de necrosis color marrón a negro que se dispersaba en la parte de la vaina originándose a partir de un nudo del tallo de la planta de maíz. Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue: identificar el hongo causante de la pudrición del tallo de maíz mediante pruebas morfológicas y moleculares, y evaluar la eficacia de productos químicos para su control. Para ello los aislamientos se realizaron en condiciones de laboratorio, los aislados obtenidos se purificaron por cultivos monospóricos. La morfología de los aislados se realizó en medios de cultivo selectivos CLA, SNA y PDA. La extracción de ADN se realizó por el método de Dellaporta Mini, la amplificación por PCR y secuenciación se realizó con los primers ITS. Se evaluaron productos a dosis comerciales para el control de *Fusarium* como: Tiabendazol (Tecto 60- Syngenta), Captan (Captan 50 PH), Mancozeb (Manzate) y *Bacillus subtilis* cepa QST 713(Serenade- Bayer Crop Science), a diferentes concentraciones. Como resultados de acuerdo a los análisis morfológicos y moleculares se confirmó a *Fusarium equiseti* como especie asociada a la pudrición del tallo en maíz, por otra parte, se determinó que Captan es el mejor producto químico, seguido de Serenade, en los cuales las

plantas de maíz mostraron mayor altura, número de hojas y diámetro del tall.

52

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A *Fusarium* spp. EN VARIEDADES MEXICANAS DE TRITICALE (*X Triticosecale* Wittmack). [Evaluation of resistance to *Fusarium* spp. in mexican varieties of triticale (*X Triticosecale* Wittmack)]. Santos Gerardo Leyva-Mir¹, Gloria Sánchez-Jiménez¹, Mateo Vargas-Hernández², Moisés Camacho-Tapia³, Héctor Eduardo Villaseñor-Mir⁴, María Florencia Rodríguez-García⁴. ¹Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo (UACH). ²Departamento de Suelos, UACH. ³Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, UACH; ⁴Campo Experimental Valle de México, INIFAP. lsantos@correo.chapingo.mx

El tizón de la espiga causado por *Fusarium* spp., es una enfermedad que afecta el rendimiento y calidad del grano, además de producir distintos tipos de micotoxinas. Con el objetivo de evaluar la resistencia de 7 variedades mexicanas de triticale a *Fusarium camptoceras*, *F. graminearum* y *F. boothii*, se estableció un experimento en el laboratorio nacional de royas y otras enfermedades del trigo del Campo Experimental Valle de México del INIFAP. Las pruebas de patogenicidad se realizaron durante la etapa de la antesis, por medio de la inoculación con copetes de algodón sumergidos en una suspensión de conidios a una concentración de 1×10^6 mL⁻¹. Posteriormente se indujo a una epifitía artificial durante siete días. Se evaluó la severidad de la enfermedad en las espigas a los 7, 10, 14, 18, 22, 26, 33, 40, 47 días después de la inoculación utilizando una escala visual. Los resultados demostraron que la variedad Bicentenario presentó los porcentajes más bajos de severidad para *F. boothii* y

F. camptoceras (28.11 y 38.5 %, respectivamente), mientras que para *F. graminearum* fue la variedad Siglo XXI (25.83 %), por lo tanto, se comportaron como las variedades más tolerantes. Las variedades más susceptibles fueron Alamos, Eronga y Secano por presentar los mayores porcentajes de severidad (98.75, 94.88, 80.86 % respectivamente).

53

BIOCONTROL DE *Fusarium euwallaceae* MEDIANTE MICROORGANISMOS MARINOS EN CONDICIONES *in vitro*. [Biocontrol of *Fusarium euwallaceae* using marine microorganisms *in vitro*]. Evangelina E. Quiñones-Aguilar¹, Luis Hernández-Montiel^{2*}, Clemente García-Ávila³, Jesús Trinidad-Cruz¹, Gabriel Rincón-Enríquez^{1*}. ¹Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ; ²CIBNOR; ³CNRF-DGSV-SENASICA. *lhernandez@cibnor.mx; *grincon@ciatej.mx.

Fusarium euwallaceae (*Fe*) es un hongo fitopatógeno de *Lauraceae*, agente causal de la marchitez por fusarium en aguacate (*Persea americana*). *Fe* tiene una relación simbiótica con el escarabajo barrenador *Euwallaceae*. Una manera de enfrentar la enfermedad es con la aplicación de microorganismos, como bacterias o levaduras, que destruyan esta simbiosis o que compitan contra el hongo. Algunos microorganismos de origen marino han mostrado actividad como agentes de control biológico (ACB) de enfermedades fúngicas de postcosecha. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de bacterias y levaduras marinas como agentes de control biológico para *Fe* en condiciones *in vitro*. Se realizó un experimento completamente al azar con siete tratamientos: cuatro levaduras, dos bacterias y sin ACB; cada tratamiento tuvo cuatro repeticiones y la unidad experimental consistió de una placa de Petri con medio PDA. En el centro de

la placa se colocaron 10 µL de bacteria o levadura (10^7 UFC mL⁻¹) y 24 h después, en dos extremos de la placa se colocaron dos discos miceliales de *Fe* (diámetro de 0.5 cm). Después de 10 días de confrontación, se cuantificó el diámetro de inhibición del crecimiento entre los dos discos de *Fe*. Los resultados mostraron que las cepas bacterianas de *Streptotrophomonas rhizophila* K1 y K2, tuvieron un diámetro de inhibición significativamente mayor (55 mm de inhibición, Tukey $p \leq 0.05$), en comparación al tratamiento sin ACB. Esto sugiere que las cepas bacterianas marinas podrían emplearse en experimentos de control *in vivo* y en la interacción con el escarabajo ambrosial.

54

BIOCONTROL DE *Fusarium oxysporum* Y *Dickeya chrysanthemi* POR *Bacillus subtilis* Y *Trichoderma* spp. EN PLANTAS DE *Aloe vera* EN INVERNADERO. [Biocontrol of *Fusarium oxysporum* and *Dickeya chrysanthemi* by *Bacillus subtilis* and *Trichoderma* spp. on plants of *Aloe vera* at greenhouse]. Eduardo Osorio-Hernández, Sarahi Rubio-Tinajero, Ma. Teresa de Jesús Segura-Martínez. Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamaulipas, México. eosorio@docentes.uat.edu.mx

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de *Bacillus subtilis* y *Trichoderma* spp. frente a *Fusarium oxysporum* y *Dickeya chrysanthemi* bajo condiciones de invernadero en plantas de sábila (*Aloe vera*). Se evaluaron 16 tratamientos *B. subtilis* (B1 y B2), *T. harzianum* (T1), *T. asperellum* (T1), combinaciones, TRICHUX® (*Trichoderma*) y BACILLIOSS® (*Bacillus* spp.), incluyendo un testigo, cada uno con cinco repeticiones. Los tratamientos se inocularon en una maceta con una planta de sábila. El experimento se evaluó durante seis

meses y al final se registró el tamaño de las plantas, número de hojas, peso de raíz, incidencia y unidades formadoras de colonias (*Trichoderma* spp., *B. subtilis* y *F. oxysporum*). Los resultados del análisis de varianza mostraron diferencia significativa ($p=0.05$) para la altura de plantas. Los tratamientos T1 y T2 mostraron una altura de las plantas de 40.33 y 38.66 cm. En cuanto al número de hojas y el peso de raíz, T1 fue el tratamiento que destacó con 10 hojas y peso de raíz de 18.80 g. En el caso de los tratamientos de *B. subtilis* y *Trichoderma* spp. frente a *D. chrysanthemi* no hubo diferencia significativa ($P=0.05$). Las plantas inoculadas *T. harzianum* y la mezcla de *B. subtilis* + *T. asperellum* mostraron un mayor crecimiento de la planta, producción de hoja y raíz, y de menor incidencia de *F. oxysporum*.

55

CONTROL IN VITRO DE AISLADOS NATIVOS DE *Fusarium oxysporum* Y *Dickeya chrysanthemi* FRENTE A *Bacillus subtilis* Y *Trichoderma* spp. [In vitro control of native isolates of *Fusarium oxysporum* and *Dickeya chrysanthemi* front of *Bacillus subtilis* and *Trichoderma* spp]. Sarahi Rubio-Tinajero, Benigno Estrada-Drouaillet, Eduardo Osorio-Hernández. Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Cd. Victoria, Tamaulipas, México. eosorio@docentes.uat.edu.mx

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto antagónico de cepas nativas de (Cd. Victoria) *Trichoderma* spp., y *Bacillus subtilis* (B4 y B5) frente a *Fusarium oxysporum* y *Dickeya chrysanthemi* *in vitro*. El trabajo se realizó en el laboratorio de microbiología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para ello se utilizaron cuatro tratamientos (*T. asperellum* =TJ, *T. harzianum* =TP) contra *F. oxysporum* y *D. chrysanthemi*) más el

testigo (solo el fitopatógeno) con cinco repeticiones. Las variables evaluadas fueron porcentaje de inhibición y diámetro del halo de inhibición (cm). Los resultados mostraron que no hubo diferencia significativa entre los tratamientos ($P=0.05$). Para el caso del control de *F. oxysporum* el tratamiento TP fue el mejor, debido que registró un porcentaje de inhibición de 70.50 % y se clasifica como clase 1 según la escala de Bell *et al.* (1982). Por otra parte, los resultados frente a *D. chrysanthemi* no hubo diferencia significativa ($P=0.05$). Sin embargo, TP obtuvo el porcentaje más alto de inhibición con 41.93 %. Las cepas nativas de *T. asperellum* y *T. harzianum*, resultaron con mayor inhibición de crecimiento contra *F. oxysporum* y *D. chrysanthemi*. Por otra parte, *B. subtilis* mostró antagonismo frente a *F. oxysporum* y también mostró halo de inhibición frente a *D. chrysanthemi*. En base en lo anterior se concluye que *Trichoderma* y *Bacillus* tienen la capacidad de inhibir en la *F. oxysporum* y *D. chrysanthemi*.

56

NANORECUBRIMIENTOS DE QUITOSANO-ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO SOBRE LA CALIDAD POSTCOSECHA EN FRUTOS DE JITOMATE. [Nano coatings of chitosan-essential oil of thyme on the quality postcosecha in tomato fruits]. Zormy Nacary Correa-Pacheco, Kárel Damari García-Paniagua, Silvia Bautista-Baños, María Luisa Corona-Rangel. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Centro de Desarrollo de Producto Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. zncorreapa@conacyt.mx

En la actualidad, para prolongar el tiempo de vida útil de las frutas y vegetales, se están buscando alternativas naturales. En este trabajo, se evaluaron las variables de calidad (color, firmeza, pH, sólidos

solubles totales y carotenoides), fisiológicas (pérdida de peso y respiración) y actividad antimicrobiana de nanorecubrimientos de quitosano-aceite esencial de tomillo sobre la calidad postcosecha del jitomate en etapa de madurez, luego de 7 días de almacenamiento a una temperatura de 10 °C y humedad relativa de 70%. Se elaboraron 6 formulaciones con nanopartículas de quitosano (NPQs) y nanopartículas de quitosano-aceite esencial de tomillo (NPTs) al 15, 30 y 45 % y se inoculó *Pectobacterium carotovorum* antes de la aplicación de los nanorecubrimientos. De los resultados, no hubo diferencia significativa en la pérdida de peso, debido a una posible distribución uniforme del recubrimiento sobre el fruto. La concentración de NPQs de 45%, disminuyó la velocidad de respiración de jitomate debido probablemente a un menor intercambio de moléculas gaseosas con el medio circundante por la presencia de las nanopartículas. El mayor efecto inhibitorio contra *P. carotovorum* se presentó para la concentración de 15% de NPQs y NPTs, con valores de 42.25 y 69.00 UFC, respectivamente. La aplicación de recubrimientos basados en NPQs y aceite esencial de tomillo, representa una alternativa viable y amigable con el ambiente, para la conservación de productos hortofrutícolas.

57

EVALUACIÓN *IN VITRO* DE FUNGICIDAS CONTRA PATÓGENOS CAUSANTES DE PUDRICIONES DE FRUTO DE GUANÁBANA (*Annona muricata* L.) EN NAYARIT, MÉXICO. [*In vitro* evaluation of fungicides against pathogens causing soursop (*Annona muricata* L.) rots in Nayarit, Mexico]. Gerardo Bayardo-Cambero, Carlos Cambero-Ayón, Orlando Estrada-Virgen, Ricardo Flores-Canales, Jhonathan Cambero-Campos. Universidad Autónoma de Nayarit. Guero4646@hotmail.com

En Nayarit, la guanábana disminuye su rendimiento por los patógenos *Colletotrichum gloeosporioides*, *Pestalotiopsis* sp. causantes de pudriciones secas, y *Lasiodiplodia pseudotheobromae* causante de pudriciones blandas. El objetivo fue encontrar alternativas para el control de estos hongos mediante evaluaciones *in vitro* de los fungicidas Switch® 62.5 WG (Cyprodinil + Fludioxonil) y Pull® 75 WG (Óxido cuproso). Para las evaluaciones *in vitro* se contaminó el medio de cultivo PDA con los fungicidas en cajas de Petri utilizando dosis baja (2.5 gr/L), media (5 gr/L) y alta (7.5 gr/L), se colocó un explante con cada patógeno en el centro de las cajas, se utilizaron cuatro cajas por dosis por cada fungicida, se incubaron a 24 ± 2 °C en oscuridad, para determinar el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial (PICM), se realizaron mediciones diarias con un vernier digital, se utilizó un diseño experimental y se les aplicó una separación de medias mediante la prueba de tukey ($p= 0.05$). Switch® y Pull® alcanzaron un porcentaje de inhibición de 92 % y 100 % con sus dosis altas, respectivamente, mientras que sus dosis baja y media presentaron PICM de 82.54 % a 87.77 %, respectivamente. Posteriormente, se transfirieron los explantes a PDA en ausencia de los fungicidas, se observó que Switch® y Pull® mostraron acción fungicida para *C. gloeosporioides* y fungistática para *Pestalotiopsis* sp. y *L. pseudotheobromae*. Betancourt (2019) reportó un 95 % de inhibición *in vitro* sobre *C. gloeosporioides* en guanábana con los fungicidas Switch® y Pull®.

58

DISEÑO DE OLIGONUCLEÓTIDOS ESPECÍFICOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE *Fusarium mexicanum*. [Specific primers design

for identification of *Fusarium mexicanum*]. Ricardo Santillán-Mendoza, Amelia Cristina Montoya-Martínez, Daniela Pineda-Vaca, Sylvia Patricia Fernández-Pavía, Nuria Gómez-Dorantes, Gerardo Rodríguez-Alvarado. Laboratorio de Patología Vegetal, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. gra.labpv@gmail.com

En México, *F. mexicanum* es el patógeno causante de malformación del mango (MMD) y de caoba de hoja grande (BLMMD). En el ámbito mundial, al menos cinco especies de *Fusarium* son agentes causales de MMD. El objetivo del presente estudio fue desarrollar marcadores SCAR (secuencias caracterizadas de una región amplificada) derivados de análisis de secuencias repetidas simples internas (ISSR) para la identificación rápida de *F. mexicanum*. ADN genómico de cinco especies causantes de MMD, *F. mexicanum*, *F. mangiferae*, *F. pseudocircinatum*, *F. sterilihyphosum* y *F. tupiense*, fueron amplificados con 14 oligonucleótidos ISSR. Las bandas polimórficas exclusivas para *F. mexicanum* fueron cortadas del gel de agarosa, purificadas, ligadas en un plásmido y electroporadas en *Escherichia coli*. Los fragmentos clonados en *E. coli* se secuenciaron y nueve pares de oligonucleótidos SCAR fueron diseñados y sintetizados. La universalidad, especificidad y sensibilidad de los oligonucleótidos fue analizada mediante PCR. Los resultados indican que dos pares de oligonucleótidos amplifican de forma específica el ADN genómico de *F. mexicanum*, no siendo así para las otras especies causantes de MMD, en donde no se obtuvo amplificación. Además, todas las cepas de *F. mexicanum* analizadas amplificaron, independientemente de si fueron aisladas de MMD o BLMMD, por último, el ensayo de sensibilidad indicó que la concentración de ADN requerida está en el rango de 10 pg a 250 ng.

EFFECTO DE LA LUZ UV-C SOBRE LA CALIDAD SANITARIA Y FISIOLÓGICA EN MAÍZ FORRAJERO [UV-C light effect in sanitary and physiological quality in fodder maize]. ¹Joana Martha Fernández-Gutiérrez, ¹Gabriela Sánchez-Hernández, ²Claudia Hernández-Aguilar, ²Flavio Arturo Domínguez-Pacheco y ¹María Cristina Julia Pérez-Reyes. ¹Unidad de Investigación en Granos y Semillas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, ²Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional. crisp28@yahoo.com.mx

La irradiación con luz UV-C se ha empleado como una tecnología con efecto biocida para control de microorganismos en frutos, granos, alimentos, entre otros. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la luz UV-C sobre la microbiota, germinación y vigor en maíz amarillo forrajero procedente de Santa Úrsula Chiconquiaco, Puebla (ciclo agrícola P-V 2018), empleando tres tiempos de exposición (5, 10 y 15 min) a una longitud de onda 254 nm. La germinación y el vigor se evaluaron por el método de longitud media de plúmula y la microbiota endógena y exógena por el de placa agar, bajo un diseño experimental completamente al azar, con cuatro repeticiones y un testigo. Se encontraron diferencias ($P \leq 0.05$) entre los tratamientos, observando mayor efecto fungistático sobre la microbiota exógena a los 10 y 15 min (72.2 y 86.3% UFC, respectivamente), en comparación al testigo (97.7% UFC). El tiempo de exposición de 10 min presentó la mayor reducción (26.0%) de la microbiota. Asimismo, en todos los tratamientos probados y testigo la germinación fue del 100%, y el vigor en un rango de 12.17-12.97 cm con respecto al testigo (12.78 cm). Los resultados encontrados

muestran que la luz UV-C se puede emplear como un método alternativo para el control de hongos en grano de maíz forrajero sin tener efectos negativos sobre la calidad fisiológica.

AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE *Trichoderma* spp. NATIVO CON POTENCIAL DE CONTROL DE *Fusarium oxysporum* EN ESPÁRRAGO (*Asparagus officinalis* L.). [Isolation and selection of *Trichoderma* spp. native with control potential of *Fusarium oxysporum* in asparagus (*Asparagus officinalis* L.)]. Ángeles Sarahi Gabriela Alvarado-Suárez¹, Ángel Rebollar-Alviter², Alejandro Romero-Bautista², Uriel Acosta-González² ¹Instituto Tecnológico del Valle de Morelia, ²Universidad Autónoma Chapingo, CRUCO Morelia-Michoacán. Sarahia96@gmail.com

Un total de 60 aislamientos de *Trichoderma* fueron obtenidos a partir de 6 plantaciones de espárrago en los Municipios de Álvaro Obregón, La Piedad y Tarímbaro Michoacán, Huanímaro y Pénjamo Guanajuato, México. El objetivo fue evaluar el potencial antagonístico de *Trichoderma* spp. sobre *Fusarium oxysporum* asociado al amarillamiento del espárrago. El aislamiento de *Trichoderma* spp. se realizó en medio PDA a partir de diluciones de suelo de la rizosfera en agua destilada estéril. El aislamiento de *F. oxysporum* se obtuvo de plantaciones con los síntomas típicos de la enfermedad y se identificó amplificando por PCR la región ITS del ADNr y la región TEF1a. Se evaluó el potencial antagonístico de *Trichoderma* por pruebas de confrontación dual en medio PDA utilizando un diseño completamente al azar con 6 repeticiones. Se determinó el porcentaje de inhibición y el tipo de antagonismo (escala de Bell) cuando *F. oxysporum* sin la presencia de *Trichoderma* spp. llenó la

caja. Mediante estadística descriptiva los resultados indicaron que en general los aislamientos de *Trichoderma* spp. evaluados inhibieron entre el 17 y 45% el crecimiento micelial de *F. oxysporum*, los cuales establecieron el primer contacto entre los 5 y los 7 días (de 11 expuestos), con una inhibición tipo 2 (*Trichoderma* spp. sobrecreció a *F. oxysporum*). Del total de aislamientos evaluados, el 26% inhibieron más del 40%. Estos serán usados en pruebas posteriores *in planta* en presencia del patógeno.

61

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL *in vitro* DEL AGENTE CAUSAL DE LA MARCHITEZ VASCULAR DEL TOMATE (*Solanum lycopersicum* L.) EN PARÁCUARO, MICHOACÁN. [Identification and control *in vitro* of the causal agent of vascular wilt of tomato plant (*Solanum lycopersicum*.) from Parácuaró Michoacán]. Uriel Márquez-Santacruz, José Luciano Morales-García¹. Martha E. Pedraza-Santos¹, Ana Tztzqui Chávez-Bárceñas¹, Karina Lizeth Morales-Montelongo¹. Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”. U.M.S.N.H. marquezsantacruzuriel@hotmail.com

El marchitamiento vascular es un problema fitosanitario que limita la producción del cultivo de tomate (*Solanum lycopersicum*) a nivel mundial y nacional, ocasiona pérdidas económicas hasta del 60 %. Los objetivos fueron: identificar el agente causal de la marchitez vascular de jitomate y evaluar su control *in vitro*. Se colectaron plantas del Municipio de Parácuaró Michoacán, con síntomas de marchitamiento, se realizaron aislamientos en medio PDA, para identificar el patógeno; en este mismo medio se hicieron las pruebas de sensibilidad con los productos químicos y un extracto vegetal (*Larrea tridentata*), Azoxystrobin, Folpet, Tiabendazol, Benomilo, Mancozeb y Octanoato de

cobre, de cada tratamiento se evaluaron 3 dosis: 100, 500 y 1000 ppm respectivamente. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 21 tratamientos, 4 repeticiones y un testigo. Se efectuó un análisis de varianza y Prueba de Tukey ($p=0.05$). Mediante claves especializadas se identificó a *Fusarium oxysporum* f. sp. *lycopersici*, mediante la utilización de plantas diferenciales: El rey F1, Patria 4853 F1, 387 F1, 386 F1 y Rio Grand se identificó la Raza 3. Estadísticamente los mejores productos fueron: Tiabendazol y Benomilo en las dosis (100, 500 y 1000 ppm), Mancozeb y Folpet solo en (500 y 1000 ppm) y Octanoato de cobre a 1000 ppm con 0% de crecimiento contra el 100 % del testigo.

62

CONTROL QUÍMICO DE LA ROYA DE LA HOJA EN CEBADA EN CONDICIONES DE TEMPORAL. [Chemical control for leaf rust in rainfed barley]. María Florencia Rodríguez-García¹, Miguel González-González¹, Julio Huerta-Espino¹, Salomón Solano-Hernández² y Héctor Eduardo Villaseñor-Mir¹. ¹INIFAP-CEVAMEX. ²INIFAP-CEBAJ. rodriguez.maria@inifap.gob.

En México el 70% de la producción de cebada se concentra en los Valles Altos de la Mesa Central. Este cereal es afectado por diversas enfermedades siendo la roya de la hoja (RH) la de mayor importancia, debido a que no hay disponibilidad de variedades resistentes. Durante el ciclo P-V 2018, bajo condiciones de temporal e incidencia natural de la enfermedad, se estableció un ensayo bajo un diseño factorial en bloques completos al azar, en Sta. Lucia Edo. de México y La Unión, Tlaxco, Tlaxcala, para evaluar la efectividad biológica de los fungicidas Azimut 320 SC y Folicur 25 EW y las variedades Esmeralda, Maravilla y Doña Josefa. El

análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas para rendimiento y severidad de la enfermedad para variedades, tratamientos y localidades (Tukey, $p=0.05$). La variedad con mayor resistencia fue Maravilla (30MS) y la más susceptible Doña Josefa (60S). El fungicida más eficaz fue Azimut 320 (Azoxystrobin+ Tebuconazole). Se observó respuesta de las variedades a los fungicidas: con Azimut, Doña Josefa fue la más productiva con rendimiento de 4,403 kg/ha, seguida de Maravilla con 3,751 kg/ha. Se observó un efecto negativo en el rendimiento de Esmeralda con la aplicación de Folicur. El conocimiento del nivel de resistencia a RH en las variedades sembradas comercialmente, permitirá realizar un manejo integrado efectivo el cual se reflejará en la producción final.

63

EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE ROYA LINEAL AMARILLA EN CEBADA. [Evaluation of fungicides for control of stripe rust in barley]. María Florencia Rodríguez-García¹, Miguel González-González¹, Julio Huerta-Espino¹, Salomón Solano-Hernández² y Héctor Eduardo Villaseñor-Mir¹. ¹INIFAP-CEVAMEX. ²INIFAP-CEBAJ. rodriguez.maria@inifap.gob.mx.

La roya lineal amarilla (RLA) de la cebada ha recobrado importancia en los últimos ciclos de producción en los Valles Altos de México, debido a la introducción de variedades no adaptadas a las regiones productoras, así como a la adaptación del patógeno a condiciones de sequía y altas temperaturas, y a la falta de variedades resistentes. Se estableció un ensayo bajo un diseño factorial en bloques completos al azar, en Temascalapa Edo. de México y Moxolahuac, Tlahuapan, Puebla, durante el ciclo P-V 2018 bajo condiciones de temporal e

incidencia natural de la enfermedad, para evaluar la efectividad biológica de los fungicidas Azimut 320 SC y Folicur 25 EW en las variedades Apizaco, ABI Voyager y AC Metcalfe. El análisis de varianza mostró diferencias altamente significativas para severidad de la enfermedad para variedades, tratamientos y localidades (Tukey, $p=0.05$). La variedad con resistencia moderada a susceptible fue AC Metcalfe, mientras que Apizaco fue susceptible. No hubo diferencias estadísticas significativas para fungicidas en ABI Voyager y AC Metcalfe; sin embargo, en la variedad susceptible (Apizaco) el mejor control se obtuvo con Azimut. El mayor rendimiento de grano se registró en Voyager (2,266 kg/ha), mientras que Apizaco tuvo el menor (1,471 kg/ha); sin embargo, ambas variedades tuvieron un rendimiento similar cuando se les aplicó Azimut.

64

CONTROL *in vitro* CON EXTRACTOS VEGETALES DE *Colletotrichum gloeosporioides* PENZ., CAUSANTE DE ANTRACNOSIS DE LA VID. [Control *in vitro* with vegetable extracts of *Colletotrichum gloeosporioides* Penz., causing antracnose of the grape]. Antonio Mena-Bahena², Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera¹, Vladimir de la Cruz-Ramírez¹, Maricela Apáez-Barrios², Elvira Nava-Pineda¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ayvarsernas@hotmail.com

Los daños y pérdidas causados por *Colletotrichum* en pre o post cosecha limita la exportación de frutos de la VID. Es por lo anterior, que la presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar a nivel *in vitro* la capacidad antifúngica de distintos extractos vegetales contra *Colletotrichum* sp., por lo cual, se probaron los siguientes tratamien-

tos: T1= Testigo, T2= *Allium sativum* + *Capsicum* spp (CAPSIALIL), T3= *Lippia graveoiens* + *Capsicum* spp + *Allium sativum* (LIPPOIL), T4= *Cinnamomum cassia* + *C. zeylanicum* (CINNOIL), T5= *Reynoutria sachalinensis* (REGALIA MAXX), los cuales se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 5 repeticiones, la unidad experimental consistió en una caja Petri con 15 mL de PDA + la dosis recomendada por el fabricante de los productos empleados. Para evaluar el efecto de los tratamientos se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento de *Colletotrichum* sp. Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y a una prueba complementaria de separación de medias por el método de Tukey, los resultados mostraron diferencias altamente significativas ($P < 0.0001$). Los productos comerciales CapsiAlil, Lippoil, Cinnoil y Regalía Maxx presentaron una efectividad de 100% en el control del patógeno *Colletotrichum gloeosporioides*.

65

BIOCONTROL *in vitro* DE *Fusarium solani* PATÓGENO DE CALABACITA ZUCCHINI [Biocontrol *in vitro* of *Fusarium solani* pathogen of zucchini squash]. Antonio Mena-Bahena², Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera¹, Vladimir de la Cruz-Ramírez¹, Maricela Apáez-Barrios², Armando Sánchez-González¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ayvarsernas@hotmail.com

Hongos edáficos como *Fusarium*, causan la pudrición de raíz, afectan el rendimiento y productividad del cultivo de calabacita zucchini. El objetivo del presente estudio fue evaluar *in vitro* distintas cepas de *Trichoderma* sobre *Fusarium solani*. Se probaron los siguientes tratamientos: T1=

Trichoderma sp. (nativa Metlapa), T2= *T. virens* (PHCRootmate), T3= *Trichoderma* sp. (Fithan), T4= *Trichoderma* sp. (Bactiva), T5= *T. asperellum* (nativa Cocula), T6= *Trichoderma* sp. (Biobravo), T1= *T. asperellum* (nativa Chilapa) y T8= Testigo; se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 5 repeticiones. La unidad experimental consistió en una caja Petri con 15 mL de PDA. Se evaluó la antibiosis de cada cepa sobre el hongo patógeno, mediante la prueba de celofán. Se evaluó el efecto de éstos, sembrando *F. solani* en el centro de la caja, se incubaron a temperatura ambiente (+ 28 °C), en el laboratorio; se midió el diámetro de la colonia del hongo cada 24 horas por 7 días y se calcula el porcentaje de inhibición. Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y a una prueba complementaria de separación de medias por el método de Tukey, los resultados mostraron una actividad fungistática ligera sobre el hongo patógeno, los cuales *Trichoderma* sp. (nativa de Metlapa), *T. virens* (PHC Rootmate), *Trichoderma* sp. (Fithan), *Trichoderma* sp. (Bactiva), *T. asperellum* (nativa de Cocula), *Trichoderma* sp. (Biobravo) y *T. asperellum* (nativa Chilapa); tuvieron efectividad inhibidora de 8.7, 7.5, 10.0, 8.7, 5.0, 11.2 y 11.2, respectivamente.

66

CONTROL *in vitro* CON *Trichoderma* spp., DE *Alternaria solani* Jones & Grout. PATÓGENO DE CHILE HABANERO [Control *in vitro* with *Trichoderma* spp., of *Alternaria solani* Jones & Grout. pathogen of habanero pepper]. Antonio Mena-Bahena², Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera¹, Vladimir de la Cruz-Ramírez¹, Maricela Apáez-Barrios², Samuel Tetla-Solano¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ayvarsernas@hotmail.com.

Es frecuente la incidencia de manchas o tizones foliares provocados por *Alternaria* spp. que afecta el área fotosintética y disminuye el crecimiento y productividad de la planta. El objetivo en la presente investigación, fue evaluar distintas cepas de *Trichoderma* sobre *Alternaria* sp., por lo cual, se probaron los siguientes tratamientos: *Trichoderma* sp. (Fithan); *T. virens* (PHCRootmate); *Trichoderma* sp. (Biobravo); *Trichoderma* sp. (Bactiva®); *Trichoderma* sp. (Nativa Cuautla); *T. asperellum* (nativa Cocula), *T. asperellum* (nativa Chilapa) y un Testigo, los cuales se distribuyeron en un diseño completamente al azar con 4 repeticiones. Se evaluó la antibiosis de cada cepa sobre el hongo patógeno, mediante la prueba de celofán sobre PDA. Se evaluó el efecto de éstos, sembrando *F. solani* en el centro de la caja, se incubaron a temperatura ambiente, en el laboratorio; se midió el diámetro de la colonia del hongo cada 24 horas por 7 días y se calculó el porcentaje de inhibición. Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y a una prueba complementaria de separación de medias por el método de Tukey. Los resultados mostraron una actividad fungistática sobre el hongo patógeno, *Trichoderma* sp. (Fithan); *T. virens* (PHCRootmate); *Trichoderma* sp. (Biobravo); *Trichoderma* sp. (Bactiva®); *Trichoderma* sp. (Nativa Cuautla); *T. asperellum* (nativa Cocula) y *T. asperellum* (nativa Chilapa) tuvieron efectividad inhibidora de 4.70, 10.66, 11.60, 20.69, 20.69, 6.27, 10.66 respectivamente.

67

DETERMINACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA MANCHA AFELPADA EN ÁRBOL DE HULE (*Hevea brasiliensis*). [Determination of the causal agent of plush spot in rubber tree (*Hevea brasiliensis*)]. Adriana Rosalía Gijón-Hernández¹, Iris Marley Pérez-Gálvez¹, Brenda Torres-Huerta¹, Elías Ortiz-Cervantes². ¹CENID-COMEF-INIFAP,

²Campo Experimental El Palmar, CIR-Golfo Centro-INIFAP. adigih@hotmail.com.

Veracruz ocupa el primer lugar en producción y superficie con plantaciones de hule (*Hevea brasiliensis*) en México. Las enfermedades que lo atacan con frecuencia son ocasionadas por hongos, los cuales afectan las plantaciones y ocasionan pérdidas considerables en términos de producción de látex. El objetivo fue identificar el agente causal de la mancha afelpada en cultivo de hule. En octubre de 2016 se realizaron muestreos en plantaciones de las Choapas, Veracruz y se recolectaron hojas con lesiones circulares presentes en el envés y el haz, causando arrugamiento, deformación y rompimiento del tejido afectado. El material fue desinfectado y sembrado en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) y con preparaciones en fresco para observar las estructuras del hongo. Para la identificación se utilizaron claves taxonómicas específicas para género y especie. Se identificaron morfológicamente las lesiones, las cuales fueron circulares afelpadas de 8 a 10 mm de diámetro de color verde olivo a negro. En base a las estructuras, el hongo correspondió a *Fusicladium heveae* (anamorfo de *Microcyclus ulei*), por presentar conidios septados, curvos, lisos y hialinos, los cuales se tornaron de una coloración grisácea o verde olivo. La enfermedad es conocida como SALB, por sus siglas en inglés (*South American Leaf Blight*), es una de las enfermedades más importantes del cultivo de hule en América y ocasiona la caída prematura de hojas jóvenes, y bajo condiciones favorables puede causar la defoliación total en viveros y jardines clonales.

68

AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE MICROORGANISMOS CON POTENCIAL ANTAGONISTA A LA ROYA DEL CAFETO

(*Hemileia vastatrix*). [Isolation and characterization of microorganisms with antagonistic potential to coffee rust (*Hemileia vastatrix*)]. Martín Durán-Mendoza y Alberto Uc-Vázquez, Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. auc@ciatej.mx.

A nivel mundial, México es el principal productor de café orgánico con un total de 852.2 mil toneladas. Múltiples problemas sanitarios afectan el cultivo de café, siendo la roya ocasionada por *Hemileia vastatrix* la enfermedad más importante; provoca pérdidas del 30-100% de la producción. El control de la enfermedad se realiza principalmente, a través del uso de variedades resistentes y aplicación de agroquímicos. El uso excesivo de agroquímicos ha provocado el desarrollo de resistencia química y no es una estrategia compatible con el cultivo orgánico del café. El objetivo de este trabajo fue aislar, identificar y caracterizar microorganismos con potencial antagonista para el control de la roya del café. En dos periodos, se colectaron muestras de suelo y follaje de cuatro localidades productoras de café en Chiapas. Las muestras fueron procesadas mediante diluciones seriadas de acuerdo con protocolos especializados y utilizando los medios de cultivo: Papa-Dextrosa-Agar (PDA), PDA con antibióticos, ADS, R2A y PDA+ Paraquat. Diluciones de 1×10^{-3} a 1×10^{-5} de cada muestra fueron sembradas por triplicado. Crecimientos microbianos obtenidos en 24, 48, 72 y 96 h se seleccionaron y purificaron. Se obtuvieron 128 microorganismos, de los cuales 75 son bacterias, 30 hongos filamentosos y 19 levaduras. Se identificaron los géneros *Fusarium*, *Penicillium*, *Aspergillus*, *Trichoderma*, *Bacillus* y actinomicetos. El potencial antimicrobiano de los aislados está siendo determinado mediante su actividad quitinasa y glucanasa.

SUSCEPTIBILIDAD DE CEPAS DE *Botrytis cinerea* AISLADAS DE VIÑEDOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, MÉXICO FRENTE A FUNGICIDAS QUÍMICOS DE SÍNTESIS.

[Susceptibility of *Botrytis cinerea* strains isolated from vineyards of the state of Querétaro, Mexico against chemical fungicides of synthesis]. Iliana Vásquez-Lara, Lourdes Soto-Muñoz, Ramón Alvar Martínez-Peniche, Jorge Artemio Zegbe-Domínguez. Universidad Autónoma de Querétaro. qfb.ili.lara@hotmail.com

Botrytis cinerea es el hongo causante de la “podredumbre gris”. En uva para vinificación, afecta la calidad organoléptica de los vinos, ocasionando pérdidas económicas. El control de esta enfermedad es principalmente, mediante la aplicación de fungicidas químicos de síntesis, sin embargo, el uso indiscriminado ha ocasionado que el hongo desarrolle resistencia. El objetivo fue evaluar la susceptibilidad de cepas de *B. cinerea* provenientes de viñedos queretanos a fungicidas químicos de síntesis. Los aislados obtenidos fueron identificados a nivel especie y genotipo, mediante reacciones de PCR. Se evaluó el grado de virulencia y la susceptibilidad frente a seis fungicidas (*in vitro*/ en fruto). La información de los experimentos se sometió a un análisis de varianza de Fisher, la separación entre medias de tratamiento bajo pruebas de Tukey ($p \leq 0.05$) y se realizó un análisis de correlación entre las variables involucradas. Los resultados mostraron que de 41 aislados obtenidos e identificados como *B. cinerea*, 4 correspondieron al genotipo Transposa, 36 a Vacuma y un aislado presentó únicamente el transposon Boty. Además, no se encontró correlación entre el genotipo y la virulencia. Los aislados de *B. cinerea* presentaron una

susceptibilidad frente a los fungicidas evaluados de 36.59% ante Benomilo, 9.76 % a Captan, 21.25 % a Cyprodinil+Fludioxonil, 12.2 % a Oxiclورو de Cobre, 43.9% a Pyraclostrobin+Boscalid y 43.9% a Iprodiona. Los aislados de *B. cinerea* analizados en este estudio fueron altamente resistentes frente los productos evaluados.

70

SUSCEPTIBILIDAD *IN VITRO* DE CEPAS DE *Botrytis cinerea* DE UVA DE MESA PROVENIENTES DEL ESTADO DE SONORA, MÉXICO. [*In vitro* susceptibility of strains of *Botrytis cinerea* of table grape from the state of Sonora, Mexico]. Iliana Vásquez-Lara, Lourdes Soto-Muñoz, Ramón Alvar Martínez-Peniche, Jorge Artemio Zegbe-Domínguez. Universidad Autónoma de Querétaro. qfb.ili.lara@hotmail.com

La podredumbre gris (*Botrytis cinerea*), es una enfermedad fúngica responsable de importantes pérdidas económicas en regiones vitícolas de México, en el cultivo de uva de mesa afecta la calidad del fruto y disminuye su vida de anaquel. Los viticultores utilizan como principal método de control el uso de productos químicos de síntesis. Desafortunadamente, existe evidencia de que el abuso indiscriminado de estos productos provoca la aparición de cepas resistentes. El objetivo del trabajo fue evaluar la susceptibilidad de cepas de *B. cinerea in vitro* frente a fungicidas químicos de síntesis. Los aislados fueron recuperados de uvas de la variedad Thompson seedless y Globo Rojo mediante cultivo monospórico e identificados fenotípica y genotípicamente mediante técnicas de microscopía y reacciones de PCR. Se evaluó la susceptibilidad de las cepas recuperadas frente a seis fungicidas de manera *in vitro* bajo un diseño experimental completamente al azar con tres repeticiones. La información

de los experimentos se sometió a un análisis de varianza de Fisher y pruebas de Tukey ($p \leq 0.05$). Un total de 89 aislados fueron identificados como *B. cinerea*, de los cuales 48 correspondieron al genotipo Vacuma, 8 a Transposa, y 33 presentaron el transposon Boty. Presentaron una susceptibilidad del 12.3% ante Benomilo, 7.9% a Captan, 58.4% a Cyprodinil+Fludioxonil, 29.2% a Oxiclورو de Cobre, 11.2% a Pyraclostrobin+Boscalid y 87.6% a Iprodiona. Se concluyó que existen niveles elevados de resistencia en este hongo fitopatógeno ante los fungicidas químicos actualmente utilizados en esta zona productora.

71

BIOCONTROL *in vitro* DE *Rhizopus stolonifer* PATÓGENO POSTCOSECHA DE JÍCAMA. [*In vitro* biocontrol of *Rhizopus stolonifer* post-harvest pathogen of jicama]. José Francisco Díaz-Nájera¹, Sergio Ayvar-Serna¹, Mateo Vargas-Hernández², Hatzel Rinconi-Reyes¹, Antonio Mena-Bahena¹, Israel Velázquez Millán¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Autónoma Chapingo. Email: api-gro1988@hotmail.com

Rhizopus stolonifer es el agente causal de la pudrición blanda de productos agrícolas, ocasionando importantes pérdidas económicas en postcosecha. Este trabajo se desarrolló con el objetivo de evaluar en condiciones *in vitro* la capacidad antifúngica de *Trichoderma* spp., de distintos orígenes contra *Rhizopus stolonifer*. El estudio se llevó a cabo en condiciones de laboratorio con el objetivo de determinar el efecto de antibiosis de diferentes cepas de *Trichoderma* spp. Los tratamientos consistieron en dos cepas nativas, dos comerciales y un testigo, *T. asperellum* cepa nativa de Cocula, Gro. (T1), *Trichoderma* sp. cepa nativa de Chilapa, Gro. (T2),

T. virens PHC® RootMate® (T3), *Trichoderma* sp. FITHAN (T4) y Testigo absoluto (T5), se utilizó un diseño experimental completamente aleatorio con 4 repeticiones, como unidad experimental se utilizó una caja Petri con 15 mL de PDA+los metabolitos de *Trichoderma* spp. Para evaluar el efecto de los tratamientos se utilizó la prueba del papel celofán y se calculó el porcentaje de inhibición y crecimiento de las colonias del patógeno, los datos fueron analizados en SAS. Se registró diferencia estadística ($P = <.0001$), *Trichoderma* sp. cepa nativa de Chilapa, Gro., mostró efecto fungicida sobre el patógeno, el resto de las cepas utilizadas exhibieron efecto fungistático sobre *R. stolonifer*.

72

REACCIÓN DE TRIGOS CRISTALINOS A LA PUNTA NEGRA (*Alternaria* spp.) BAJO INFECCIÓN NATURAL EN EL CICLO 2017-18 (Reaction of durum wheats to black point, *Alternaria* spp., under natural infection during the season 2017-18). Guillermo Fuentes-Dávila, Ivón Alejandra Rosas-Jáuregui, Carlos Antonio Ayón-Ibarra, María Monserrat Torres-Cruz, Pedro Félix-Valencia, José Luis Félix-Fuentes, Alberto Borbón-Gracia y Gabriela Chávez-Villalba. INIFAP-CIRNO, Campo Experimental Norman E. Borlaug. fuentes.guillermo@inifap.gob.mx

Treinta y dos líneas avanzadas de trigo cristalino, así como las variedades CIRNO C2008, Baroyeca Oro C2013 y Quetchehueca Oro C2013 se evaluaron para resistencia a punta negra (*Alternaria* spp.) durante el 2017-18. Las fechas de siembra fueron Noviembre 14 y 24, 2017, usando 8 g de semilla para una cama de 0.7 m de largo con dos surcos. La infección se dio en forma natural, ya que la enfermedad es endémica en el Valle del Yaqui. La cosecha se hizo manualmente, y el conteo de

granos infectados y sanos mediante inspección visual. El rango de infección para la primera fecha de siembra fue de 0 a 51.3%, con promedio de 9.4 y para la segunda de 0 a 12.5%, con promedio de 2.8. El promedio de infección de CIRNO C2008 fue 14.4%, 2.4% para Baroyeca Oro C2013 y 5.9% para Quetchehueca Oro C2013. La línea que presentó el porcentaje más alto de infección fue SWAHEN_2/ KIRKI_8// PROZANA_1/4/ADAMAR_15//ALBIA_1/ALTAR84/3/SNITAN/9/ GUAYACAN INIA/GUANAY/8/GEDIZ/ FGO// GTA/3/SRN_1/4/TOTUS/5/ENTE/MEXI_2// HUI/4/YAV_1/3/LD357E/2*TC60//JO69/6/ SOMBRA_20/7/JUPARE C 2001/10/SILK_3/ DIPPER_6/3/ACO89/DUKEM_4//5*ACO89/4/ PLAT en la primera fecha con 51.3%, seguida de CNDO/VEE//PLATA_8/3/6*PLATA_11/6/ PLATA_8/4/GARZA/AFN//CRA/3/GTA/5/ RASCON/9/ USDA595/3/D67.3/RABI//CRA/4/ ALO/5/HUI/YAV_1/6/ARDENTE/7/HUI/ YAV79/8/POD_9/10/ALTAR 84/BINTEPE85/3/ STOT//ALTAR84/ALD/4/POD_11/YAZI_1/5/ VANRRIKSE_12/SNITAN/6/SOOTY_9/ RASCON_37 con 34.0% también en la primera fecha.

73

REACCIÓN DE LÍNEAS AVANZADAS Y VARIETADES DE TRIGO HARINERO AL CARBÓN PARCIAL (*Tilletia indica*) EN EL VALLE DEL YAQUI EN EL CICLO 2017-18. [Reaction of bread wheat advanced lines and cultivars to partial bunt (*Tilletia indica*) in the Yaqui Valley during the season 2017-18]. Guillermo Fuentes-Dávila, Ivón Alejandra Rosas-Jáuregui, Carlos Antonio Ayón-Ibarra, María Monserrat Torres-Cruz, Pedro Félix-Valencia, José Luis Félix-Fuentes, Alberto Borbón-Gracia y Gabriela Chávez-Villalba. INIFAP-CIRNO, Campo Experimental Norman E. Borlaug. fuentes.guillermo@inifap.gob.mx

Dieciséis líneas avanzadas de trigo harinero y las variedades Roelfs F2007, Onavas F2009, Norman F2008 y Borlaug 100, se evaluaron para resistencia a carbón parcial (*Tilletia indica*) durante el 2017-18. Las fechas de siembra fueron Noviembre 14 y 24, 2017, usando 8 g de semilla para una cama de 0.7 m de largo con dos surcos. Las inoculaciones se hicieron inyectando 1 mL de una suspensión de esporidios alantoides (10,000/mL) durante el embuche en 10 espigas por línea. La cosecha se hizo manualmente, y el conteo de granos infectados y sanos mediante inspección visual. El rango de infección para la primera fecha de siembra fue de 1.0 a 53.6%, con promedio de 24.4 y para la segunda de 0 a 65.3%, con promedio de 33.6. La media de los tres porcentajes más altos de infección del testigo susceptible fue de 98.3%. Las tres primeras variedades presentaron un promedio de infección en las dos fechas en la categoría 10-30%, pero Borlaug 100 estuvo en la categoría mayor a 30%. El promedio de infección más bajo de las dos fechas lo presentó la línea SOKOLL*2/3/BABAX/LR42//BABAX con 13.4%. La línea BORL14*2/MUNAL #1 presentó el porcentaje de infección más alto en la primera fecha con 53.6% y la línea KACHU/BECARD//WBLL1*2/BRAMBLING/3/FRNCLN*2/TECUE #1 el más alto en la segunda con 65.3.

74

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA DE LA CENICILLA DEL ALGODÓN. [Morphological characterization of the powdery mildew of cotton]. Missael Flores-Vargas¹, Leticia Bravo-Luna², Alma Rosa Solano-Báez³, Daniel Tapia Maruri², S. Gerardo Leyva Mir⁴, Guillermo Márquez-Licon². Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros,

Programa Educativo de Agrobiotecnología. ²Instituto Politécnico Nacional, CEPROBI. ³Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Facultad de Agronomía. ⁴Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Parasitología Agrícola. gmarquezl@ipn.mx

El algodón (*Gossypium hirsutum*) es el cultivo más importante en la producción de fibra, proteína vegetal y aceite comestible. Debido a su importancia económica es necesario estudiar las enfermedades que limitan su producción. El objetivo de la presente investigación fue determinar al agente causal de la cenicilla encontrada en plantas de algodón en Cuautla, Morelos, México. Los signos de la enfermedad incluyeron parches blanco-grisáceos constituidos de micelio y cuerpos fructíferos. En etapas avanzadas de la enfermedad, las plantas presentaron clorosis, necrosis y defoliación. La identificación del hongo se realizó con claves taxonómicas especializadas. Al microscopio compuesto, se observaron casmotecios subgregarios, generalmente de esféricos a subglobosos, blanquecinos, subhialinos, lisos, con peridio de una sola capa de células, 46–61 µm de diámetro, y pocos apéndices. Tres ascas por casmotecio, subesféricas, de 30–44 × 26–38 µm, con 4-6 ascosporas por asca. Ascosporas elipsoides a ovoides hialinas de 16–23 × 10–18 µm. La fase asexual no se observó. Las características antes descritas corresponden a *Brasilomyces malachrae*. Las pruebas de patogenicidad se realizaron inoculando plántulas sanas de algodón silvestre, de 30 días de edad, espolvoreando inóculo sobre ellas. Los síntomas se reprodujeron 15 días después de la inoculación. Lo anterior demostró que el agente causal de la cenicilla del algodón es *B. malachrae*. Los resultados indican que este es el primer reporte de *B. malachrae* en México.

CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE ROYA DEL CAFÉ (*Hemileia vastatrix*) PROVENIENTES DE REGIONES DE CHIAPAS, OAXACA, GUERRERO Y VERACRUZ. [Molecular characterization of coffee rust (*Hemileia vastatrix*) from regions of Chiapas, Oaxaca, Guerrero and Veracruz]. M. Fernanda Juárez-García^{1,2}, Evangelina Quiñones-Aguilar¹, David Contreras-Medina², Joaline Pardo-Nuñez², Ariel Vázquez-Elorza², Gabriel Rincón-Enríquez^{1*}, ¹Laboratorio de Fitopatología, ²Laboratorio de Prospección-CIATEJ, ³UPZ. *grincon@ciatej.mx.

El café es la semilla del árbol del cafeto (*Coffea arabica*), pertenece a la familia de la rubiáceas, su cultivo en México se extiende en 761 mil ha. En México los principales estados productores son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La roya del cafeto (*H. vastatrix*) es la enfermedad de mayor importancia, provoca la caída prematura de las hojas propiciando la reducción en la capacidad fotosintética, el debilitamiento de árboles y en infecciones severas ocasiona la muerte de árboles. El objetivo de este estudio fue caracterizar molecularmente cepas de roya (*H. vastatrix*) provenientes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Se colectaron 21 muestras de tejido vegetal con presencia de roya de las regiones cafetaleras de los estados mencionados anteriormente. Se realizó extracción de ADN mediante la técnica CTAB y posteriormente se realizó una reacción de PCR de la región intergénica ribosomal fúngica (ITS) con los iniciadores universales para hongos ITS1 e ITS4. Se codificó con 0/1 (ausencia/presencia) la amplificación de los fragmentos ITS de la roya; estos datos fueron procesados mediante un análisis de conglomerados empleando el método UPGMA. Los resultados indicaron que solo una muestra de roya proveniente

de Chiapas fue completamente distinta del resto. Este resultado sugiere que existe diversidad genética entre la roya presente en las distintas regiones productoras de café en México, esto puede considerarse en su manejo fitosanitario.

CARACTERIZACIÓN DE LA MANCHA FOLIAR EN *Casimiroa edulis*. [Characterization of leaf spot in *Casimiroa edulis*]. Sostenes Manuel Sánchez Sandre¹, Guillermo Márquez Licona², Luis Andrés Cabrera Mauleón¹, Alma Rosa Solano Baez¹. ¹Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Ingeniería en agronomía. ²Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) almarosa.solano@upaep.mx

Casimiroa edulis (Rutacea), comúnmente conocido como zapote blanco, es de importancia farmacéutica, y fuente de ingresos por la comercialización del fruto en fresco. Por lo que, se tuvo como objetivo determinar el patógeno asociado a la mancha foliar en *C. edulis*. Durante septiembre y octubre de 2018 en, Ixtacuixtla de Mariano de Matamoros, Tlaxcala se recolectaron muestras con manchas de color gris con borde café de forma irregular a angular en el haz de la hoja, y frutificaciones de oscuras a negras. Se realizaron siembras del tejido colectado en medio de cultivo papa-dextrosa-agar y malta-agar. Se elaboraron cultivos monohifales, simultáneamente se observaron cortes histológicos del tejido enfermo. Se utilizó microscopía de luz para la caracterización morfológica de las estructuras. El hongo produce esporulación abundante, algodonosa de blanca a gris, velocidad de crecimiento en medio papa-dextrosa-agar a 26 °C de 7 cm de diámetro a los 8 días después de la siembra y 5 cm en malta-agar. En el tejido se observaron estromas

oscuros subglobulares, densamente fasciculados, conidióforos café oscuro, curvados con la punta obtusa, conidios (46-150 x 3-6µm) ligeramente oscuros, cilíndricos medianamente curvados de 3-14 septos, con la base truncada y obcónica, punta obtusa. De acuerdo con la morfometría analizada, se determinó que *Cercospora coleroides* es el hongo asociado a la mancha foliar en *C. edulis*, se continuará con mas estudios, de lo cual se considera primer reporte para el estado de Tlaxcala.

77

CARACTERIZACIÓN DE LA ROYA EN *Mentha spicata* L. [Characterization of the rust on *Mentha spicata* L.]. María Concepción de la Luz-Lopez¹, Guillermo Márquez-Licon², Luis Andrés Cabrera-Mauleón¹, Gerardo Leyva-Mir, Alma Rosa Solano-Báez¹, ¹Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Ingeniería en Agronomía, ²Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ³Universidad Autónoma Chapingo. Departamento de Parasitología Agrícola. almarosa.solano@uapep.mx

Mentha spicata (Lamiaceae) es una planta herbácea, perenne, que posee propiedades medicinales y gastronómicas. En México se producen 755 t anuales, con un incremento continuo en las exportaciones a Estados Unidos, Japón y Alemania. Debido a la importancia económica de esta aromática, se tuvo como objetivo determinar al agente causal de la roya en hierbabuena. Durante septiembre y octubre de 2018 en San Martín Texmelucan, Puebla y Comitán, Chiapas se detectaron, manchas amarillentas y uredinios con polvo color amarillo a naranja en el envés de las hojas. La caracterización morfológica de las estructuras se realizó mediante microscopia de luz, observándose un anamorfo uredinial 17-27 x 11-25µm y 0.6-0.7 µm de espesor

de pared y parafisos cilíndricos, hialinos. La patogenicidad del hongo se probó inoculando plantas sanas, dejando un grupo de plantas sin inocular como testigo. Las plantas se mantuvieron en condiciones de humedad y oscuridad por 48 horas a 28 °C, posteriormente en condiciones de luz y oscuridad (12:12h) a 25 °C. Los primeros uredinios se observaron 22 días después de la inoculación. De acuerdo con la morfometría analizada y los Postulados de Koch, se determinó que *Puccinia menthae* es el agente causal de la roya en *M. spicata*. Se continuará con estudios de biología molecular para corroborar el resultado, el cual se considera el primer reporte de este patógeno en México.

78

FERTILIZACIÓN EN TRIGO ORGÁNICO E INCIDENCIA DE ROYA DE LA HOJA (*Puccinia triticina*), EN EL VALLE DEL YAQUI, SONORA. [Fertilization of organic wheat and incidence of leaf rust (*Puccinia triticina*), in the Yaqui Valley, Sonora]. Juan Manuel Cortés-Jiménez, Alma Angélica Ortiz-Avalos y Guillermo Fuentes-Dávila. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. cortes.juanmanuel@inifap.gob.mx

En las instalaciones del INIFAP en el Valle del Yaqui, en un terreno con certificación orgánica, se evaluó el efecto de 7.5 y 10 t ha⁻¹ de composta de gallinaza, sobre la incidencia de roya de la hoja en la variedad de trigo cristalino CIRNO C2008. Se sembró el 14 de diciembre de 2018, en camas con doble hilera de 100 metros de largo y 80 centímetros de separación. Se aplicaron tres riegos de auxilio. El cultivo se manejó de acuerdo al programa aprobado por la certificadora. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cinco repeticiones. A los 98 días después de la siembra (dds), se observó

la presencia de roya con un grado 5 de severidad en la escala modificada de Cobb en el tratamiento con 10 t ha⁻¹ de composta. Se aplicó un fungicida orgánico elaborado con extractos vegetales (*Larrea tridentata*, *Pinus pinaster*, *Citrus limonum* y *Citrus aurantium*), en dosis de 1.0 L ha⁻¹ en 200 litros de agua. La aplicación se repitió después del último riego a los 110 y 115 días dds con un grado de infección de 10 y 20, respectivamente. Con 7.5 t ha⁻¹ de composta no fue necesario aplicar fungicida, el cultivo llegó a madurez fisiológica con infección de roya en grado 5, sin embargo, se observó una reducción no significativa en el rendimiento de 0.745 t ha⁻¹. El fungicida orgánico mostró buen potencial para controlar la enfermedad.

79

INCIDENCIA DE PUNTA NEGRA (*Alternaria* spp.) EN DOS VARIEDADES DE TRIGO HARINERO (*Triticum aestivum*) EN EL VALLE DEL YAQUI, SONORA. [Incidence of black point (*Alternaria* spp.) in two varieties of bread wheat (*Triticum aestivum*), in the Yaqui Valley, Sonora]. Juan Manuel Cortés-Jiménez, Alma Angélica Ortiz-Avalos y Guillermo Fuentes-Dávila. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. cortes.juanmanuel@inifap.gob.mx

En las instalaciones del INIFAP en el Valle del Yaqui, en un terreno con certificación orgánica, se evaluó la incidencia de punta negra en las variedades RSI-NORMAN F2008 y BORLAUG 100. La infección se dio en forma natural, ya que la enfermedad afecta habitualmente al trigo en la región. Se sembró el 14 de diciembre de 2018, en camas con doble hilera de 100 metros de largo y 80 centímetros de separación. Se aplicaron cuatro riegos de auxilio en la variedad Norman y tres en Borlaug debido a que su madurez fisiológica se alcanza a los

128 y 120 días después de la siembra, respectivamente. El cultivo se manejó de acuerdo al paquete tecnológico generado por INIFAP y aprobado por la certificadora. Se utilizó un diseño de bloques al azar con cinco repeticiones. La cosecha se realizó de manera manual, tomando como parcela útil una cama con dos hileras de un metro de longitud, las muestras se desgranaron en trilladora para espiga individual, se seleccionaron al azar 100 granos y el conteo de los granos infectados y sanos se realizó de manera visual. Se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas entre variedades: RSI-Norman F-2008 presentó un rango de infección de 0 a 5% con un promedio de 2% y Borlaug 100 de 4 a 11 con un promedio de 7.8. La punta negra sólo afectó el pericarpio del grano, síntoma asociado con *Alternaria* spp.

80

RENDIMIENTO DE NUEVA VARIEDAD DE TRIGO CRISTALINO RESISTENTE A ROYA DE LA HOJA (*Puccinia triticina*), BAJO MANEJO ORGÁNICO. [Grain yield of a new durum wheat variety resistant to leaf rust (*Puccinia triticina*), under organic management]. Juan Manuel Cortés-Jiménez, Alma Angélica Ortiz-Avalos, Guillermo Fuentes-Dávila. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. cortes.juanmanuel@inifap.gob.mx

En las instalaciones del INIFAP en el Valle del Yaqui, en un terreno con certificación orgánica, se evaluó el rendimiento de grano y la incidencia de roya de la hoja de la nueva variedad CENEB ORO C2017, y del testigo regional CIRNO C2008, susceptible a roya, en suelos de fertilidad media y alta. La siembra se realizó el 14 de diciembre de 2018, en camas con doble hilera de 100 metros de largo y 80 centímetros de separación. Se aplicaron tres

riegos de auxilio. El cultivo se manejó de acuerdo al paquete tecnológico generado por INIFAP y aprobado por la certificadora. Se utilizó un diseño de bloques al azar con arreglo en parcelas divididas y cinco repeticiones. La cosecha se realizó de forma manual. La parcela útil fue una cama con dos hileras de un metro de longitud. Se encontraron diferencias estadísticas significativas de 807 kg ha⁻¹ entre el nivel de baja y alta fertilidad del suelo. La nueva variedad incrementó significativamente el rendimiento en 801 kg ha⁻¹ en suelo de baja fertilidad, donde no se observó incidencia de roya en CIRNO C2008, mientras que en suelo de alta fertilidad, el incremento fue de 1420 kg ha⁻¹ con relación al testigo, el cual presentó niveles de infección de roya de hasta 20 grados de severidad en la escala de Cobb. CENEB ORO C2017 produjo 8.395 ton ha⁻¹ en suelo de alta fertilidad y mostró resistencia a *Puccinia triticina*.

81

DETECTION OF *Pyricularia oryzae* RESISTANCE GENES IN MEXICAN VARIETIES OF RICE.

[Detección de genes de resistencia contra *Pyricularia oryzae* en variedades mexicanas de arroz]. Eridani García-Vázquez¹, Guadalupe Valdovinos-Ponce¹, Emma Zavaleta-Mejía¹, Mario Orozco-Santos², Leonardo Hernández-Aragón³. ¹Posgrado en Fitosanidad, Colegio de Postgraduados. ²INIFAP, Tecomán. ³INIFAP Zacatepec. Correo electrónico: gvapon@colpos.mx.

Pyricularia oryzae (*Po*) is a devastating pathogen of rice. Use of resistant varieties is an effective and economical control strategy for this pathogen. Identification of new resistance genes (RG) plays an important role in genetic improvement programs. The INIFAP in Zacatepec, Mexico released commercial rice varieties resistant and moderately

resistant to *Po*; however, farmers keep cultivating Milagro Filipino, susceptible to *Po*. *Japonica*, *indica* and other rice genotypes have *Po* RG against, but there is no scientific information about RG that are in Mexican varieties. The objective of this research was to detect RG in Mexican rice varieties. Four *Po* resistant rice varieties (Aztecas: A, Morelos A-98: MA98, INIFLAR RT: INIRT and INIFLAR R: INIR); one moderately resistant (El Silverio: S); and one susceptible (Milagro Filipino: MF) were evaluated. Seeds germinated in Petri dishes in a growth chamber. Five days later, seedlings were transplanted into plastic pots and maintained in a growth chamber. Genomic DNA was isolated from seedling leaves by using the Wizard® SV Genomic DNA Purification System Protocol. PCR-based SNP marker sequences of tightly *Pib*, *Pita*, *Pita2*, *Pik*, *Pikm-1* and *Pikm-2* RG were amplified in a thermocycler; and were repeated from DNA isolated from five independent plants per rice variety. INIRT, INIR, MA98 and A rice varieties have *Pib* and *Pik* genes. These varieties, except INIRT and INIR showed *Pita*, and only in INIRT, the markers did not amplify *Pita2*. In S, markers amplified *Pib*, *Pik*, *Pikm-1* and *Pikm-2*. MF have *Pib*, *Pik* and *Pikm-1*.

82

EFEECTO DEL MÉTODO DE SIEMBRA EN LA INCIDENCIA DE PUNTA NEGRA Y CARBÓN PARCIAL EN LA VARIEDAD DE TRIGO BORLAUG 100.

[Effect of the sowing method in the incidence of black point and partial bunt on the wheat variety Borlaug 100]. Alma Angélica Ortiz-Avalos, Juan Manuel Cortés-Jiménez, Guillermo Fuentes-Dávila. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. ortiz.alma@inifap.gob.mx

Se evaluó la reacción de la variedad de trigo harinero BORLAUG 100 a la punta negra (*Alternaria* spp.) y al carbón parcial (*Tilletia indica*), estableciéndola a 17, 34 y 51 cm de separación entre hileras, con una densidad de siembra de 150, 75 y 50 kg ha⁻¹, respectivamente. La siembra se realizó en terrenos del CENEB-INIFAP en el ciclo 2018-19, en seco y en siembra directa el 15 de noviembre de 2018, en terreno plano, en melgas de 960 m². Se aplicaron 3 riegos de auxilio y el manejo agronómico fue el recomendado por INIFAP para la región. La cosecha se realizó de manera manual, tomando como parcela útil una hilera de un metro de longitud; las muestras se desgranaron en trilladora para espiga individual, se seleccionaron al azar 100 granos y el conteo de los granos infectados y sanos se realizó de manera visual. Con respecto a la punta negra, el análisis estadístico indicó diferencias altamente significativas entre los tres métodos de siembra: las hileras a 17 cm presentaron un rango de infección de 22 a 32%, con promedio de 26%; para las hileras a 34 cm fue de 8 a 32% con un promedio de 15.5% y para las hileras a 51 fue de 2 a 11% con un promedio de 3.7%. En ninguno de los métodos evaluados se observó la presencia de granos afectados por carbón parcial.

83

EVALUACIÓN DE DOS VARIEDADES DE CÁRTAMO (*Carthamus tinctorius*) EN UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL SUR DE SONORA. [Evaluation of two safflower (*Carthamus tinctorius*) varieties in an organic production system in southern of Sonora]. Alma Angélica Ortiz-Avalos, Juan Manuel Cortés-Jiménez, Guillermo Fuentes-Dávila. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. ortiz.alma@inifap.gob.mx

La falsa cenicilla (*Ramularia carthami*) es una enfermedad que afecta al cultivo del cártamo y puede reducir hasta en 90% su producción. Se ha observado que existen diferencias genéticas en la susceptibilidad a la enfermedad, siendo el mejoramiento genético el mejor método para combatirla, por lo que el objetivo del trabajo fue evaluar en el CENEB-INIFAP, en un lote con certificación orgánica, las variedades comerciales CIANO OL susceptible a falsa cenicilla y SEMAY OL, de reciente liberación y tolerante a la enfermedad. La siembra se realizó el 13 de diciembre del 2018, en 12 surcos de 80 cm de separación y 100 metros de largo. Se fertilizó con 5 t ha⁻¹ de composta a base de gallinaza, la cual cuenta con registro OMRI y COFEPRIS. Se aplicaron tres riegos de auxilio y para el manejo fitosanitario no se aplicó ningún producto, solo un cultivo mecánico y un deshierbe manual. Después de cada riego de auxilio se realizaron observaciones en 10 plantas al azar en la parte alta, media y baja del terreno y en ninguna variedad se detectó la presencia de *Ramularia carthami*. La cosecha se realizó de manera manual, tomando como parcela útil 10 muestras de un metro de longitud. Los rendimientos fueron de 3.665 y 3.850 t ha⁻¹ para CIANO OL y SEMAY OL, respectivamente

84

EFEECTO DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS EN LA INCIDENCIA DE PUNTA NEGRA (*Alternaria* spp.) Y CARBÓN PARCIAL (*Tilletia indica*) EN LA VARIEDAD BORLAUG 100. [Effect of the crop rotation in the incidence of black point (*Alternaria* spp.) and partial bunt (*Tilletia indica*) on the variety Borlaug 100]. Alma Angélica Ortiz-Avalos, Juan Manuel Cortés-Jiménez y Guillermo Fuentes-Dávila. Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. ortiz.alma@inifap.gob.mx

Se evaluó la reacción de la variedad de trigo harinero BORLAUG 100 a la punta negra y al carbón parcial, en rotación trigo-trigo y maíz-trigo. El cultivo se estableció en un suelo de textura arcillosa el 15 de noviembre de 2018 en el CENEB-INIFAP, en el Valle del Yaqui, Sonora. La siembra se realizó en seco, en plano, en melgas de 960 m² y en el sistema de siembra directa. Se sembraron dos hileras separadas a 17 cm y se dejaron dos hileras sin sembrar, se dejó un espacio de 51 cm entre cada par de hileras sembradas. Se aplicaron 3 riegos de auxilio, y el manejo agronómico fue el recomendado por INIFAP para la región. La cosecha se realizó de manera manual, tomando como parcela útil dos hileras de un metro de longitud; las muestras se desgranaron en trilladora para espiga individual, se seleccionaron al azar 100 granos y el conteo de los granos infectados y sanos se realizó de manera visual. Con respecto a la punta negra, no se observaron diferencias estadísticas entre rotación de cultivos: la rotación trigo-trigo presentó un rango de infección de 18 a 36%, con promedio de 28.8% y para la rotación maíz-trigo fue de 13 a 31% con un promedio de 21.7%. En ninguna de las rotaciones se observó la presencia de granos afectados por carbón parcial.

85

CARACTERIZACIÓN FÍSICA, SANITARIA Y QUÍMICA DEL MAÍZ PALOMERO DE VARIEDADES COMERCIALES Y CULTIVADAS EN MÉXICO. [Physical, sanitary and chemical characterization of popcorn maize of commercial and cultivated varieties in Mexico]. Anaid García-Trejo¹, María Cristina Julia Pérez-Reyes², Gabriela Sánchez-Hernández², Enrique Martínez-Manrique². ¹Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional. ²Unidad de Investigación en Granos y Semillas,

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. crisp28@yahoo.com.mx

El maíz palomero, además de ser el principal tentempié consumido, es empleado como edulcorante en alimentos procesados. EUA es el productor líder con 95% del consumo mundial, pese a esta tendencia México aún conserva el germoplasma nativo restringido a la región del Valle de Toluca, en el Estado de México. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la calidad física, sanitaria y química de maíces palomeros nativos procedentes del municipio San Bartolo Morelos, Estado de México, dos cultivados en condiciones locales, otro en condiciones experimentales y una variedad comercial en dos ciclos agrícolas. Para la calidad física se determinó el peso hectolítrico, contenido de humedad, índice de flotación y tamaño de grano. La calidad sanitaria se realizó por el método de placa agar, mientras que la calidad química se determinó mediante un análisis químico proximal (AQP). Todas las pruebas se realizaron por triplicado para cada muestra. Los resultados mostraron una diferencia significativa ($P \leq 0.05$) para todas las variables de la calidad física. En la muestra de maíz palomero comercial se determinaron los géneros *Fusarium*, *Aspergillus*, *Eurotium*, *Penicillium*, *Paecilomyces* y *Rhizopus*, mientras que en el grano nativo solo se identificó *Fusarium oxysporum* con una incidencia menor al 1%. El AQP presentó diferencias significativas en todas las muestras para ambos ciclos; siendo el maíz nativo de color el que mostró mayor contenido proteico.

86

PRIMER REPORTE DE *Erysiphe quercicola* EN *Quercus castanea*. [First report of *Erysiphe quercicola* on *Quercus castanea*]. María Rosario

Gregorio-Cipriano¹, María Dolores Uribe-Salas¹, Susumu Takamatsu², Uwe Braun³, Gerardo Rodríguez-Alvarado¹, Sylvia Patricia Fernández-Pavía¹. ¹Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; ²Mie University, Tsu, Japón; ³Martin Luther University Halle-Wittenberg, Alemania. fpavia@umich.mx

Quercus castanea es una especie de encino exclusiva de América, su ámbito de distribución abarca México, Guatemala y El Salvador. Se ha reportado a *Erysiphe quercicola* infectando a *Q. crispula*, *Q. phillyraeoides*, *Q. robur*, *Q. serrata* y *Quercus* spp. en Asia y Australia, sin embargo, no existen reportes en *Q. castanea*. En México se ha detectado a *E. quercicola* en *Citrus x limon* en el Estado de México, Morelos y Puebla, y sobre *Mangifera indica* en Jalisco, Michoacán, Morelos, Sinaloa y Veracruz. El objetivo del presente estudio fue determinar el agente causal de la cenicilla en hojas de *Q. castanea*. Se realizó la caracterización morfológica y molecular de esta cenicilla colectada en Michoacán. Los caracteres morfológicos coinciden con los descritos para el anamorfo de *E. quercicola*: micelio en hojas, en manchas blancas densas; hifas de 3-6 µm de ancho; apresorios ligeramente lobulados a coraloides, solitarios; células del pie rectas, rara vez ligeramente sinuosas en la base, de 13-28 (38) x 4-6 µm, seguidos de 1-2 células más cortas, formando conidios solitarios; conidios ovoides a doliformes, de 24-38 (44) x 11-17 µm. El análisis filogenético basado en las secuencias de ADN_r de ITS y 28s mostró que el hongo corresponde a *E. quercicola*. Este es el primer registro de *E. quercicola* atacando *Q. castanea*, por lo tanto, corresponde a un nuevo hospedero para este patógeno.

PATOGENICIDAD DE *Biscogniauxia atropunctata* EN *Quercus castanea* y *Q. obtusata*. [Pathogenicity of *Biscogniauxia atropunctata* on *Quercus castanea* and *Q. obtusata*]. María Dolores Uribe-Salas¹, María Rosario Gregorio-Cipriano¹, Víctor Rocha-Ramírez², Gerardo Rodríguez-Alvarado¹, Sylvia Patricia Fernández-Pavía¹. ¹Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ²Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM-Campus Morelia. fpavia@umich.mx

Los encinos son susceptibles a patógenos oportunistas bajo condiciones de estrés hídrico, entre los que se encuentra el hongo *Biscogniauxia atropunctata*. El bosque mixto de *Quercus* de la sierra de Santa Rosa, Guanajuato durante el 2011 estuvo sometido a estrés hídrico observándose síntomas de cancro carbonoso. A partir de árboles de *Q. rugosa* con cancro se aisló a *B. atropunctata*. El objetivo del presente estudio fue probar la patogenicidad de *B. atropunctata* en *Quercus castanea* y *Q. obtusata*, especies presentes en la sierra de Santa Rosa. Plántulas de *Q. castanea* y *Q. obtusata* de un año de edad crecidas en invernadero, previamente sometidas a estrés hídrico por dos semanas, fueron inoculadas. Se realizó una incisión en la parte central del tallo, donde se colocó un disco de medio (avena-agar) con micelio y se envolvieron con parafilm. Las plántulas control fueron inoculadas con disco de medio estéril. Posterior a la inoculación el riego se realizó dos veces por semana. El 75-80% de las plántulas inoculadas presentaron síntomas, 25 días después de la inoculación. El experimento se monitoreó durante tres meses. Únicamente las

plántulas inoculadas mostraron un deterioro progresivo en vigor hasta morir. El hongo se aisló de *Q. castanea* y *Q. obtusata* confirmándose su patogenicidad. Esto sugiere que ambas especies de *Quercus* pueden ser infectadas por *B. atropunctata* en la sierra de Santa Rosa, Guanajuato, bajo condiciones de estrés hídrico.

88

DETERMINACIÓN DEL AGENTE CAUSAL DE LA NECROSIS DEL TALLO EN EL ÁRBOL DE HULE (*Hevea brasiliensis*). [Determination of the causal agent of the necrosis in the hule tree (*Hevea brasiliensis*)]. Adriana Rosalía Gijón-Hernández, Iris Marley Pérez-Gálvez, Brenda Torres-Huerta, Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Conservación y Mejoramiento de Ecosistemas Forestales (CENID-COMEF), INIFAP adgih@hotmail.com.

El hule (*Hevea brasiliensis*) es un producto estratégico, considerado como una alternativa determinante para el desarrollo de las regiones del trópico húmedo en México. En 2016 en el municipio de San Juan Bautista, Oaxaca, se detectaron árboles que mostraron síntomas en el panel de pica como rajaduras o grietas verticales y finalmente se observó el desprendimiento de la corteza. Esta enfermedad presentó una incidencia del 28%. Por lo antes mencionado el objetivo de este trabajo fue determinar el agente causal de la necrosis del panel de pica en hule. El material fue desinfectado y sembrado en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA). Para la identificación se utilizaron claves taxonómicas específicas para género y especie. Para la determinación molecular se utilizó la PCR con los iniciadores ITS1 e ITS4. De las muestras obtenidas se logró identificar morfológicamente a *Fusarium*, el cual presentó micelio, aéreo, abundante, algodonoso

y coloración variable de blanco a rosado. Presencia de macroconidios de pared delgada, fusiformes, largos, moderadamente curvos en forma de hoz, con varias células y septos transversales. Al realizar el BLAST en la base de datos del Genbank, se alineó con *Fusarium solani* con una identidad del 99%. Estos resultados son el primer reporte de *F. solani* patógeno del cultivo de hule en México.

89

HONGOS CAUSANTES DE MANCHAS FOLIARES Y ASOCIADOS AL AMARILLAMIENTO DEL ARÁNDANO AZUL (*Vaccinium corymbosum* L.) EN MICHOACÁN Y JALISCO. [Fungi causing foliar diseases and yellowing of blueberry (*Vaccinium corymbosum* L.) in Michoacán and Jalisco]. Alina Yuriria De la Rosa-Zarriñana, Ángel Rebollar-Alviter, Hilda Silva-Rojas, Santos Gerardo Leyva-Mir, Moisés Camacho-Tapia y Leticia Robles-Yerena. Universidad Autónoma Chapingo, Centro Regional Universitario Centro Occidente rebollaralviter@gmail.com

Las enfermedades que limitan la producción del arándano azul (*Vaccinium corymbosum*) son manchas foliares que en su avance provocan defoliación y enfermedades de raíz que ocasionan amarillamientos y marchitamientos. El objetivo de este estudio fue determinar la etiología de manchas foliares y amarillamientos del blueberry en los estados de Michoacán y Jalisco. Se realizaron colectas de plantas sintomáticas en plantaciones que mostraban manchas foliares, amarillamientos y marchitamientos generales de plantas. Se realizó el aislamiento de hongos y oomicetes en cajas Petri con medio de cultivo PDA, V8-PBNC y V8-PARP(H). La identificación de los hongos aislados se hizo mediante la observación de su morfología y mediante la amplificación por PCR y secuenciación

del Espacio Transcrito Interno del rDNA y del Factor de Elongación TEF 1- α . Las pruebas de patogenicidad se condujeron en plantas de arándano azul cv. Biloxi de 6 meses de edad. La inoculación de hongos asociados a manchas foliares se realizó por aspersión de 1×10^6 conidios mL⁻¹; los hongos del suelo se inocularon por inmersión de raíces a la misma concentración. Los resultados indicaron que las manchas foliares fueron causadas por los hongos *Alternaria tenuissima*, *Neopestalotiopsis clavispora*, *Phyllosticta elongata* y *Epicoccum nigrum*. El amarillamiento y marchitez se asoció principalmente con *Fusarium oxysporum*.

90

EVALUACIÓN DE FUNGICIDAS PARA EL CONTROL DEL TIZÓN FOLIAR EN CALABAZA

[Evaluation of fungicides for the control of foliar blight on squash] José Francisco Díaz-Nájera¹, Sergio Ayvar-Serna¹, Mateo Vargas-Hernández², Hatzel Rinconi-Reyes¹, Antonio Mena-Bahena¹, Maricela Apáez-Barrios³. ²Universidad Autónoma Chapingo, ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, ³Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ayvarsernas@hotmail.com

En cultivos de calabacita (*Cucurbita pepo* L.) una de las enfermedades que se presenta es el tizón foliar, ocasionado por especies de *Alternaria*, un patógeno muy destructivo en diversos cultivos de importancia económica en todo el mundo. Por lo anterior, es importante evaluar la efectividad biológica de productos comerciales recomendados para el control del patógeno y generar información que contribuya a disminuir las pérdidas económicas en campo. El objetivo de este estudio fue evaluar en condiciones de campo diferentes fungicidas contra *Alternaria* sp. en el cultivo de calabaza. Se utiliza-

ron los siguientes tratamientos: T1= Cercobin®-M (tiofanato metílico), T2= Luna experience® 400 SC (fluopiram+tebuconazole), T3= Oxicon® 85 (oxicloruro de cobre) y T4=Testigo. El genotipo utilizado fue Grey Zucchini. Se realizaron tres aplicaciones y el mismo número de evaluaciones, utilizando la dosis recomendadas por el fabricante; los tratamientos se distribuyeron en un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones. Para determinar el efecto de los tratamientos se evaluó el porcentaje con respecto al control. Los resultados indicaron diferencias altamente significativas ($P < .0001$) entre los tratamientos. Los fungicidas evaluados redujeron la incidencia del tizón foliar en calabaza.

91

CONTROL *in vitro* CON EXTRACTOS VEGETALES Y FUNGICIDAS DE *Macrophomina phaseolina* AISLADA DE AJONJOLÍ

[Control *in vitro* with vegetable extracts and fungicides of *Macrophomina phaseolina* isolated from sesame] Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz Najera¹, Antonio Mena-Bahena¹, Arturo Mendoza-Bustamante¹, Omar Guadalupe Alvarado-Gómez², Maricela Apaez-Barrios³. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, ²Universidad Autónoma de Nuevo León, ³Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. apigro1988@hotmail.com

Macrophomina phaseolina es causante de la pata negra en el cultivo de ajonjolí. Es necesario generar información que permita manejar al patógeno mediante el uso de productos orgánicos y químicos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de diversos extractos vegetales y fungicidas sobre el crecimiento e inhibición del hongo *M. phaseolina* en condiciones *in vitro*. Se emplearon los productos: 1) PROGRANIC® NeemAcar, 2)

REGALIA MAXX, 3) ALLIUM Líquido, 4) PROGRANIC® OMEGA, 5) PROGRANIC® MEGA, 6) PHC NEEM, 7) SWITCH®, 8) HEADLINE, 9) LUNA EXPERIENCE, 10) SPORTAK, 11) OXICOB, 12) MANZATE 200 WP, 13) CAPTAN 50 PLUS, 14) TESTIGO, se distribuyeron mediante un diseño experimental completamente al azar, con cinco repeticiones. La unidad experimental fue una caja Petri. Se midieron las variables de respuesta: crecimiento micelial cada 24 h durante 5 días y el porcentaje de inhibición. A los datos obtenidos se les realizó un análisis de varianza y prueba de Tukey ($p < 0.05$) con el programa SAS. Se encontró que los tratamientos con ALLIUM LIQUIDO®, PROGRANIG OMEGA®, PROGRANIG MEGA®, MANZATE® 200 WP, presentaron 99.05, 99.25, 96.05, 97.05% de inhibición por tanto, registraron acción fungistática sobre el patógeno; el resto de los productos utilizados ejercieron acción fungicida sobre *M. phaseolina* al inhibir el 100% del crecimiento.

92

CONTROL *in vitro* CON EXTRACTOS VEGETALES DE *Rhizoctonia solani* PATÓGENO DE TOMATILLO [Control *in vitro* with vegetable extracts of *Rhizoctonia solani* tomatillo pathogen]. Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz Najera¹, Antonio Mena-Bahena¹, Arturo Mendoza-Bustamante¹, Maricela Apaez-Barrios², Omar Guadalupe Alvarado-Gómez³. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ³Universidad Autónoma de Nuevo León. apigro1988@hotmail.com

Rhizoctonia solani es considerado uno de los patógenos más agresivos que atacan a diversos cultivos. En plantaciones del tomate de cáscara o tomatillo, provoca severos daños y reduce

significativamente su producción. El objetivo del presente trabajo fue evaluar en condiciones *in vitro* el efecto de tres fitoextractos sobre el crecimiento de *Rhizoctonia solani*, patógeno del tomatillo. Se probaron los productos: PROGRANIC NEEMACAR, REGALÍA MAX, PROGRANIC MEGA y un Testigo, se distribuyeron mediante un diseño experimental completamente al azar, con cinco repeticiones. La unidad experimental fue una caja Petri. Se midieron las variables de respuesta: crecimiento micelial cada 24 h durante 6 días y el porcentaje de inhibición. Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y prueba de Tukey ($p < 0.05$) utilizando el programa SAS. Se determinó la patogenicidad de *R. solani*, se observaron síntomas en las plantas inoculadas. A los 15 días después de la inoculación, se encontró que el fitoextracto PROGRANIC MEGA ejerció actividad fungistática sobre *R. solani*, los productos PROGRANIC NEEMACAR y REGALÍA MAX tuvieron efecto fungicida al suprimir totalmente el crecimiento del patógeno.

93

ANTIBIOSIS *in vitro* DE *Trichoderma* spp., CONTRA *Helminthosporium maydis* AISLADO DE MAÍZ. [Antibiosis *in vitro* of *Trichoderma* spp., against *Helminthosporium maydis* isolated from maize]. Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera¹, Antonio Mena-Bahena¹, Arturo Mendoza Bustamante¹, Maricela Apáez-Barrios², Clemente Montoya-Palacios¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. apigro1988@hotmail.com

De hojas de maíz infectadas, se aisló e identificó a *Helminthosporium maydis*, se comprobó su patogenicidad en plantas sanas de maíz.

Se evaluaron *in vitro* metabolitos secundarios de cepas nativas y comerciales de *Trichoderma* spp., sobre el crecimiento del patógeno. Se establecieron los siguientes tratamientos: T1: *T. asperellum* (cepa nativa de Apipilulco, Gro.), T2: *Trichoderma* sp. (cepa nativa de Chilapa, Gro.), T3: *T. virens* (PHC® RootMate®), T4: *Trichoderma* sp. (FITHAN) y T5: Testigo absoluto, se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 4 repeticiones, la unidad experimental consistió en una caja Petri con 15 mL de medio de cultivo papa-dextrosa-agar y los metabolitos de *Trichoderma* spp., se empleó la prueba del papel celofán. El efecto de los tratamientos se evaluó calculando el porcentaje de inhibición y crecimiento de las colonias del patógeno en *in vitro*, los datos se analizaron con el programa SAS. A las 72 horas finalizó el ensayo y se determinó que existió diferencia estadística ($P=0.0072$), la cepa *T. virens* (PHC® RootMate®) registró el menor crecimiento del patógeno y el mayor porcentaje de inhibición de *Helminthosporium maydis* (87.28%) en contraparte, el resto de las cepas utilizadas tuvieron efecto fungistático sobre el patógeno y solo retardaron su crecimiento.

94

ANTIBIOSIS *in vitro* DE *Trichoderma* spp., CONTRA *Sclerotium rolfsii* PATÓGENO DE CALABACITA [Antibiosis *in vitro* of *Trichoderma* spp., against *Sclerotium rolfsii* pathogen of pumpkin]. José Francisco Díaz-Nájera¹, Sergio Ayvar-Serna¹, Antonio Mena-Bahena¹, Benjamín Reyna Guadarrama¹, Maricela Apáez Barrios², Clemente Montoya Palacios¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. apigro1988@hotmail.com

A partir de raíces de calabaza, se aisló e identificó a *Sclerotium rolfsii* y se comprobó su patogenicidad

en plantas sanas de calabaza. Se evaluaron *in vitro* metabolitos secundarios de cepas nativas y comerciales de *Trichoderma* spp., sobre el crecimiento del patógeno. Se utilizaron los siguientes tratamientos: T1: *T. asperellum* (cepa nativa de Cocula, Gro.), T2: *Trichoderma* sp. (cepa nativa de Chilapa, Gro.), T3: *T. virens* (PHC® RootMate®), T4: *Trichoderma* sp. (FITHAN) y T5: Testigo absoluto, se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 4 repeticiones, la unidad experimental consistió en una caja Petri con 15 mL del medio de cultivo papa-dextrosa-agar con los metabolitos de *Trichoderma* spp., se empleó la prueba del papel celofán. El efecto de los tratamientos se evaluó calculando el porcentaje de inhibición y crecimiento de las colonias del patógeno. Los datos obtenidos se analizaron con el programa SAS. A las 96 horas finalizó el ensayo y se determinó que existió diferencia estadística ($P=0.0072$), la cepa *T. virens* (PHC® RootMate®) registró el menor crecimiento y el mayor porcentaje de inhibición de *Sclerotium rolfsii* (87.28%). El resto de las cepas utilizadas tuvieron efecto fungistático sobre el patógeno y solo retardaron su crecimiento.

95

ETIOLOGÍA DE LA PUDRICIÓN DE RAÍZ EN PLANTA DE BRÓCOLI EN TLAXCALA MÉXICO. [Etiology of root rot of broccoli in Tlaxcala, Mexico]. Víctor Santiago-Santiago¹, Victoria Ayala-Escobar², José Hugo Castorena-García¹, Maribel Cano-Hernández¹ y Román Israel Pérez-López¹. ¹Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. ²Programa de Fitopatología Colegio de Posgraduados. santiagovictor@itat.edu.mx

La pudrición de raíz es un problema común en hortalizas, en el presente ciclo agrícola se observó este síntoma en el cultivo de brócoli en Santa Ana Nopalucan, al sur del estado de Tlaxcala, por

lo que se realizó un muestreo dirigido de plantas con síntomas de pudrición en raíz y proliferación de brotes para determinar el agente causal. El material se procesó en el laboratorio de Fitopatología del Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala. Las muestras se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 1.5% por 2 min, enseguida se lavaron dos veces con agua estéril y se secaron con papel estéril, posteriormente se sembraron en medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA). Una semana después se realizó la purificación de las colonias obtenidas mediante punta de hifa. Las pruebas de patogenicidad se realizaron en plántulas de brócoli de 2 meses de edad, la inoculación se realizó en la base del tallo de cada planta, se inocularon 1×10^4 propágulos/mL. Los síntomas de pudrición se observaron tres semanas después de la inoculación y posteriormente se procedió al reaislamiento del patógeno. En medio de cultivo crecieron colonias color blanco a amarillo claro, se observaron microesclerocios, micelio septado y ramificado en ángulo recto, características que han descrito para *Rhizoctonia solani* (Barnett y Hunter) la caracterización molecular está en proceso. Se considera este el primer reporte de *Rhizoctonia solani* ocasionando pudrición de raíz de brócoli en México.

96

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DEL COMPLEJO *Colletotrichum* EN VAINAS DE FRIJOL (*Phaseolus vulgaris*) EN CHIAPAS, MÉXICO.

[Identification of *Colletotrichum* species complex on common bean (*Phaseolus vulgaris*) at Chiapas, Mexico]. Eduardo R. Garrido-Ramírez¹, Francisco J. Cruz-Chavez¹, Oscar Hugo Tosquy-Valle², Bernardo Villar-Sanchez¹. ¹INIFAP CECECH, ²INIFAP CECotaxtla. garrido.eduardo@inifap.gob.mx

Chiapas es el principal productor de frijol en la región Sur-Sureste, ocupando 114,077 ha en 2017,

aunque con bajos rendimientos (<600 kg ha⁻¹). Entre los factores que limitan su producción están las enfermedades fúngicas. La antracnosis del frijol es una enfermedad que se ha considerado importante en áreas con clima templado, sin embargo en ocasiones puede causar pérdidas en áreas tropicales, principalmente cuando prevalecen condiciones de alta humedad y clima fresco; por otro lado, se han reportado especies de *Colletotrichum* que pueden infectar al frijol en áreas tropicales, sin que se tenga un conocimiento de su importancia y efecto en la producción de frijol. Con el objetivo de identificar las especies pertenecientes al complejo *Colletotrichum* que infectan al frijol en Chiapas, durante el ciclo primavera-verano 2018 se colectaron 19 muestras de vainas de frijol en las principales zonas productoras de frijol en Chiapas, se realizaron aislamientos en medios PDA y de Mathur; las colonias obtenidas se purificaron por el método de diluciones y se conservaron en refrigeración. Se identificaron morfológica y molecularmente mediante amplificación por PCR de las secuencias ITS. Las características morfológicas y el análisis de las secuencias permitieron la identificación de *Colletotrichum lindemuthianum* y *Colletotrichum truncatum* infectando vainas de frijol en Chiapas. La identificación correcta de los fitopatógenos es de gran importancia tanto por los daños directos que causan, como para trabajos de mejoramiento genético para la generación de genotipos resistentes a patógenos que prevalezcan en una zona.

97

IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE ORGANISMOS DE LA RIZOSFERA DE PLANTAS DE CAFETO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. [Molecular identification of rhizosphere organisms of coffee plants in Chiapas state]. Cindy Ariannis León-Marín, Alberto Uc-Varguez, Ana Ramos-Díaz*. Centro de Investigación y de Asis-

tencia Tecnológica del Estado de Jalisco A.C. aramos@ciatej.mx*

El café es uno de los productos más comercializados a nivel mundial, en México, el cultivo de cafeto es considerado una actividad estratégica para el desarrollo económico. Actualmente los productores de café enfrentan grandes pérdidas económicas debido a plagas y enfermedades, como la Roya causada por *Hemileia vastratix* y la Marchitez causada por *Fusarium oxysporum* las cuales afectan al desarrollo de la planta y los frutos. Para el control de dichas enfermedades, los agricultores emplean agroquímicos, cuyo uso continuo causa que dichos organismos desarrollen resistencia y por ende las plagas sean más persistentes y difíciles de controlar. Con la finalidad de encontrar nuevas estrategias de control, se ha propuesto el uso de microorganismos con capacidad de exudar compuestos que inhiban el crecimiento de hongos fitopatógenos. El objetivo de este trabajo es identificar molecularmente microorganismos de la rizosfera de plantas de cafeto provenientes del estado de Chiapas, como alternativas de control de estas enfermedades. Para la identificación molecular, a las cepas aisladas se les extrajo ADN siguiendo la metodología del kit Quick Fungal/Bacterial Miniprep, el ADN se utilizó para la amplificación de la región ITS empleando los oligonucleótidos ITS4 e ITS5. Los productos de PCR se secuenciaron y las secuencias obtenidas fueron comparadas en la base de datos del NCBI. Se identificaron 23 organismos, los géneros más predominantes son *Fusarium*, *Aspergillus* y *Sordaryomicetes*. La identificación de los microorganismos de la rizosfera, permite seleccionar a aquellos con potencial para ser utilizados como agentes de biocontrol.

***Lecanosticta acicola* EN *Pinus arizonica stromiae* EN NUEVO LEÓN, MÉXICO.** [*Lecanosticta acicola* on *Pinus arizonica stromiae* in Nuevo León, Mexico]. José G. Marmolejo-Moncivais¹. ¹Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ciencias Forestales. jmarmole@gmail.com

Lecanosticta acicola es un ascomiceto heterotálico causante del tizón café de las hojas de los pinos, una enfermedad importante que se presenta en numerosas especies de pinos en Norte y Centro América, y que fue introducido en Europa y Asia. En un estudio para determinar el origen de las poblaciones europeas de *L. acicola*, se analizaron numerosos ejemplares provenientes de los EUA, México y Centroamérica, incluidos dos que se encontraron en *Pinus arizonica stromiae* en Nuevo León, México. El material se estudió microscópicamente tomándose datos sobre la medida de los conidiomas, conidióforos y esporas. Se obtuvieron secuencias del gen TEF (translation elongation factor) y se realizó un análisis filogenético de máxima parsimonia y máxima verosimilitud. Los conidiomas midieron 400-600 µm de largo, 180 µm de ancho y 50 µm de alto; los conidióforos registrados fueron de simples a ramificados, hialinos, las esporas presentaron ornamentaciones y eran de color café y midieron de 29-40 (-50) x 3-4 µm, con 2 a 3 septos. Las esporas fueron más largas que las del aislado tipo (16-28 x 3-4 µm). El análisis filogenético mostró que los ejemplares de *L. acicola* en *P. arizonica* se separan del resto, procedentes de México y Centroamérica, lo cual indica que podría tratarse de una nueva especie.

INDUCCIÓN DE RESISTENCIA A LA INFECCIÓN DE *Sclerotium delphinii* EN PLÁNTULAS DE *Stevia rebaudiana* [Induction of resistance to infection of *Sclerotium delphinii* in seedlings of *Stevia rebaudiana*] Bibiana Tirado-Pérez, Antonia Gutiérrez-Mora, Joaquín Qui-Zapata. Biotecnología Vegetal, CIATEJ. jqui@ciatej.mx

La marchitez de la estevia (*Stevia rebaudiana*) es considerada como una de las principales enfermedades para el cultivo y ha sido asociado a *Sclerotium delphinii* Welch. En la búsqueda de alternativas para su control, se considera a los inductores de defensa vegetal, como el quitosano, con potencial para disminuir el efecto de la enfermedad sobre el cultivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del quitosano como inductor de los mecanismos de defensa vegetal en estevia contra la infección de *S. delphinii*. Se utilizaron plántulas de *S. rebaudiana* Morita II provenientes de esquejes con altura de 16 a 17 cm sembradas en sustrato estéril. Se trataron de manera foliar con quitosano al 0.05% y 10 días después se inocularon con 10 esclerocios de *S. delphinii* a la base de la planta. Se evaluó el daño de la enfermedad durante 18 días. Se realizaron muestreos de raíz y hojas de plántulas el día de aplicación del quitosano, día de inoculación del patógeno y los días 1, 3, 5 y 18 días después de la inoculación del patógeno. Se evaluó la actividad de proteínas PR (peroxidasas, β -1,3 glucanasas) y acumulación de fitoalexinas. Las plántulas tratadas con quitosano mostraron una protección importante a la infección de *S. delphinii*. El quitosano indujo una respuesta diferencial en la actividad de β -1,3 glucanasas y peroxidasas de las plántulas tratadas. Además, se observó un aumento en la acumulación de fitoalexinas en tiempos cercanos al tratamiento con quitosano.

METABOLITOS BIOACTIVOS PRODUCIDOS POR *Streptomyces* PARA EL CONTROL DE ANTRACNOSIS EN FRUTOS DE CHILE HABANERO. [Production of Bioactive Metabolites by *Streptomyces* to control anthracnose in Habanero pepper] Karen A. Vargas-Gómez*, Élica Gastélum-Martínez*, Alberto Uc-Varguez*, Gabriel Rincón-Enríquez+, Evangelina E. Quiñones-Aguilar+, Zahaed Evangelista-Martínez*. CIATEJ Subsede Sureste* - Zapopan+. zevangelista@ciatej.mx

Los estreptomicetos son un grupo de bacterias ampliamente distribuidas con un gran potencial para ser aprovechados a nivel industrial. En el presente estudio se evaluó la actividad antifúngica de los metabolitos extracelulares producidos por *Streptomyces* sp CACIS-1.16CA para inhibir el crecimiento de *Colletotrichum* spp que producen antracnosis en frutos de chile habanero. Para tal propósito, a partir de una Fermentación en Fase Sólida (FFS-soporte orgánico con hojas de maíz trituradas) de 14 días usando el medio ISP2 inoculado con la cepa CACIS-1.16CA, se obtuvo un extracto extracelular. Con el extracto obtenido se evaluó la capacidad para inhibir la germinación de los conidios de una cepa de *Colletotrichum* aislada de frutos de chile habanero y seleccionada a partir de seis cultivos monospóricos evaluados por su capacidad para causar antracnosis a chiles habaneros (Postulados de Koch). El extracto fue aplicado sobre frutos de chile inoculados con *Colletotrichum*. Los resultados mostraron un efecto antagonista de la cepa CACIS-1.16CA mayor al 40 % contra la cepa *Colletotrichum* de chile habanero y contra otros hongos fitopatógenos de los géneros *Bipolaris*, *Phomopsis*, *Corynespora*, *Fusarium*, *Phytophthora* y *Rhizoctonia*. Además, el extracto

inhibió la germinación de los conidios de *Colletotrichum*, incluso, 48 h posteriores a la interacción del extracto con los conidios. En chiles inoculados con el patógeno, el extracto inhibió el desarrollo de la infección en el 90 % de los chiles infectados. El extracto de *Streptomyces* sp CACIS-1.16CA es capaz de controlar la antracnosis en frutos de chile habanero.

101

INDUCCIÓN DE RESISTENCIA A LA ROYA DEL CAFÉ (*Hemileia vastatrix*) POR QUITOSANO. [Induction of resistance to coffee rust (*Hemileia vastatrix*) by chitosan]. Iván Leal-García^{1,2}, Joaquín Qui-Zapata¹, Mayra Montero-Cortés². ¹Unidad de Biotecnología vegetal, CIATEJ. ²Instituto Tecnológico de Tlajomulco. jqui@ciatej.mx

México es el décimo productor de café a nivel mundial. La producción del café disminuye por la infección de la roya amarilla (*Hemileia vastatrix*), haciendo necesaria la búsqueda de alternativas de control de la enfermedad. En este trabajo, se evaluó la efectividad biológica del quitosano para inducir una respuesta de resistencia ante la roya en café. Se hicieron aplicaciones foliares de quitosano al 0.01% y 0.05% (w/v) en plantas de *Coffea arabica* var. *Typica* y *Geisa* de un año de edad, como testigo se aplicó agua destilada estéril. Diez días después de la aplicación, se tomaron hojas de cada tratamiento, se cortaron 30 discos de 5mm de diámetro por tratamiento, con una previa desinfección y se inocularon con una solución de 1×10^6 uredinosporas/mL y agua destilada estéril al testigo. Los discos se colocaron en cámara húmeda, se incubaron a 22 °C durante 48h en oscuridad y posteriormente se transfirieron a fotoperiodo 8h luz /16h oscuridad. Transcurridos 30 días, se evaluó la severidad de la enfermedad en los discos. Se observó una disminución

de la incidencia y severidad de la enfermedad con los tratamientos con quitosano en contraste con los testigos. Estos resultados muestran el potencial de la aplicación del quitosano para el control de la roya.

102

BIOESTIMULACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PLÁNTULAS DE CAFÉ MEDIANTE CEPAS NATIVAS DE *Trichoderma* sp. [Bio-stimulation for the development of coffee seedlings through native strains of *Trichoderma* sp.]. Iván Leal-García^{1, 2}, Joaquín Qui-Zapata¹, Mayra Montero-Cortés². ¹Unidad de Biotecnología vegetal, CIATEJ. ²Instituto Tecnológico de Tlajomulco. jqui@ciatej.mx

El uso de cepas de *Trichoderma* sp. en el control biológico de enfermedades vegetales ha sido ampliamente estudiado; además, se ha reportado el efecto bioestimulante de algunas cepas sobre el crecimiento vegetal. La búsqueda de cepas que tengan ambas propiedades significa una alternativa para la disminución del uso de agroquímicos en el manejo de los cultivos, como se requiere en el control de la roya del café (*Hemileia vastatrix*). En este estudio, se realizaron aislamientos de *Trichoderma* sp. con medio selectivo a partir de muestras de rizósfera proveniente de cafetales de la región de Tila, Chiapas. Se seleccionaron ocho aislamientos para ser evaluados como posibles bioestimulantes en el desarrollo de plantas de *Coffea arabica* var. *Typica*. Se colocaron semillas para germinación *in vitro* y se confrontaron con los diferentes aislamientos de *Trichoderma* sp. para evaluar su efecto sobre la germinación de las semillas. Una vez germinadas, se transfirieron a sustrato estéril en cuarto de aclimatación, después a macetas con sustrato estéril y se re-inocularon con cada aislamiento (1×10^6 esporas/

mL). Transcurridos 30 días se evaluó el desarrollo de área foliar, número de hojas y peso fresco de las plántulas. Se observó una estimulación en la germinación y en el crecimiento de las plántulas de café en cuatro aislamientos de *Trichoderma* sp. A estos aislamientos se les determinará su potencial en la protección para la infección de la roya del café.

103

***Colletotrichum musicola* CAUSANDO ANTRACNOSIS EN HOJAS DE MALANGA (*Colocasia esculenta*) EN OAXACA, MÉXICO.**

[*Colletotrichum musicola* causing leaf anthracnose on taro (*Colocasia esculenta*) in Oaxaca, Mexico]. Alfonso Vásquez-López¹, Rogelio Enrique Palacios-Torres², Moisés Camacho-Tapia³, Carlos Granados-Echegoyen⁴, Nelson Bernardi Lima⁵, Ileana Vera-Reyes⁶, Santos Gerardo Leyva-Mir⁷, Juan Manuel Tovar-Pedraza⁸. ¹Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR-Unidad Oaxaca. ²Universidad del Papaloapan. ³UACH-LANISAF. ⁴CONACYT-Universidad Autónoma de Campeche. ⁵CONICET, Argentina. ⁶CONACYT-CIQA. ⁷UACH, Parasitología Agrícola. ⁸CIAD-Coordinación Culiacán. juan.tovar@ciad.mx

En septiembre de 2017, se observaron hojas de malanga (*Colocasia esculenta*) con síntomas de antracnosis en un campo comercial localizado en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, México. La incidencia de la enfermedad fue de aproximadamente 40%. Por lo que, el objetivo de este estudio fue identificar al agente causal de la antracnosis en hojas de malanga mediante la combinación de caracterización morfológica y análisis filogenético multilocus, así como pruebas de patogenicidad. La identificación preliminar de un aislado se realizó mediante caracterización cultural y morfológica. Mientras que, la identificación a nivel de especie,

se llevó a cabo mediante un análisis filogenético con el criterio de inferencia Bayesiana y usando secuencias concatenadas de la región ITS y parte de los genes B-tubulina, actina y gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. La patogenicidad del hongo se verificó mediante aspersión de conidios (10⁶ esporas/mL) sobre hojas de malanga sanas. Con base en las características de conidios, apresorios y setas, el hongo se identificó como perteneciente al género *Colletotrichum*. El análisis filogenético multilocus agrupó al aislado fúngico dentro del clado de *Colletotrichum musicola*. La prueba de patogenicidad mostró que el aislado de *C. musicola* causó antracnosis de hojas de malanga, mientras que las hojas control, permanecieron asintomáticas. Para nuestro conocimiento, este es el primer reporte de *C. musicola* causando antracnosis en malanga en México y a nivel mundial.

104

IDENTIFICACIÓN DE HONGOS ASOCIADOS A LA MARCHITEZ DEL AGUACATEIRO EN HUERTAS DEL NORTE DE NUEVO LEÓN, MÉXICO.

[Fungi associated with avocado wilt in orchards of north Nuevo Leon, Mexico]. ¹Karen Guadalupe Cantú-Treviño, ¹Adriana Gutiérrez-Díez, ²Salvador Ochoa-Ascencio, ¹Enrique Ignacio Sánchez-González, ¹Sugey Ramona Sinagawa-García. ¹Universidad Autónoma de Nuevo León, ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. karencantu194@gmail.com

La marchitez del aguacatero, se atribuye a factores bióticos y abióticos; puede ocasionar la muerte del árbol. Entre los hongos relacionados con la enfermedad se encuentran miembros de la familia *Botryosphaeriaceae*, causantes de muerte regresiva, canchros de las ramas y pudrición del fruto. El objetivo de este trabajo fue identificar hongos asociados a

la marchitez de árboles de aguacate var. *drymifolia* en huertas del norte de Nuevo León. Se colectaron ramas de siete árboles con síntomas de marchitez, presencia de escarabajos descortezadores y ambrosiales en tres huertas de Sabinas Hidalgo. Del tejido central de las ramas se realizaron cortes y se sembraron en medio PDA acidificado (PDAA); de las colonias desarrolladas se obtuvieron cultivos monospóricos. La patogenicidad de los aislados se determinó por inoculación de discos de micelio en cinco ramas jóvenes y sanas de árboles de aguacate. A los 7 y 15 días posteriores a la inoculación, se realizaron aislados en PDAA a partir de las ramas con síntomas de necrosis. De la colonia monospórica y de las colonias obtenidas de la inoculación de ramas, se generaron marcadores tipo ITS utilizando los iniciadores ITS5 e ITS4. Las secuencias de los marcadores fueron analizadas con el programa BLASTN. Los resultados obtenidos a la fecha permitieron identificar a *Lasidiopodia* sp., quedando demostrada su patogenicidad en aguacate. Se continúa con el trabajo de muestreo de árboles con síntomas de marchitez para la detección de éste hongo.

105

ACTIVIDAD DE *Trichoderma* CON QUITOSANO SOBRE AGENTES CAUSALES DE “MANCHADO DE CALIZ” EN JAMAICA.

[Activity of *Trichoderma* with chitosan against the pathogens causing the “Spotted leaves and calyces” of roselle]. Teolincacihuatl Romero-Rosales¹, Alejandro Michel-Aceves², Nadxieli Peto-Barrios¹, Jorge Peto-Calderon¹, Maricarmen Thalía Rencillas-Mota³, Mirna Vázquez Villamar¹. ¹Universidad Autónoma de Guerrero ² Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CEP-CSAEGRO ³ CIAD. teolinc@hotmail.com.

Se evaluaron cepas nativas de *Trichoderma spp.* en suelos cultivados con jamaica en la Costa Chica,

Guerrero con alta incidencia de *Corynespora cassiicola*, causante del “Manchado de cáliz”, utilizando dos genotipos de jamaica: Ayutla y Tecoaapa. La identidad de las cepas fueron Ta1, Tv2, de las especies *T. asperellum* y *T. viride*. Se determinó su capacidad antagonica como biocontroladores de *C. cassiicola in vivo e in vitro*. Con un diseño completamente al azar, ocho repeticiones ambos experimentos sometidos a un análisis de varianza y prueba de comparación múltiple de medias de Tukey ($\alpha=0.05$). Hubo diferencias estadísticas entre tratamientos, primeramente las dos cepas nativas de *Trichoderma* contra *C. cassiicola*, ambas especies sobrecrecieron al patógeno lo que resultó en un antagonismo 1 de acuerdo con Bell *et al.* (1982). En cuanto al control biológico en campo, el índice de severidad de la enfermedad en etapa vegetativa y de floración ($P \leq 0.05$) permaneció en clase 0, 1, 2 y 3 escala propuesta por Ortega *et al.* (2015). El tratamiento que respondió con un menor índice de severidad (0 a 1), fue la combinación *T. viride* con quitosano para ambos genotipos. *Trichoderma* como un agente antagonista, y quitosano, como un potenciador mostraron que el efecto protector fue mayor en el índice de severidad que en las variables agronómicas.

106

CONTROL BIOLÓGICO *IN VITRO* DE *Thielaviopsis paradoxa* AGENTE CAUSAL DEL SANGRADO DEL TALLO EN COCOTERO.

[In vitro biological control of *Thielaviopsis paradoxa* causal agent of stem bleeding in coconut palm]. ¹Alejandro C. Michel-Aceves, ¹Marco A. Otero-Sánchez, ²Rafael Ariza-Flores y ¹José Ángel Alcantara-Jiménez. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias - Guerrero (INIFAP-Guerrero). amichelaceves@yahoo.com.mx

Se evaluó la efectividad *in vitro* de *Trichoderma* spp., sobre *Thielaviopsis paradoxa*, causante del sangrado del tallo del cocotero y se comparó con los fungicidas sintéticos que se utilizan en su control. Se colectó suelo y tallo de palmeras enfermas de una huerta de la comunidad El atrancadero, Florencio Villarreal, Gro. De suelo se aislaron e identificaron seis cepas de *Trichoderma* spp. (2 *T. harzianum* y 4 *T. asperellum*); del tallo se aisló el fitopatógeno *T. paradoxa*. Se realizaron tres bioensayos: En la prueba de celofán se evaluaron las seis cepas nativas de *Trichoderma*; las variables: crecimiento y porcentaje de inhibición. En el cultivo dual, la competencia de *Trichoderma* vs *T. paradoxa*; las variables: días a primer contacto, crecimiento de *Trichoderma*, de *T. paradoxa*, zona de intersección y clasificación de antagonismo. En la prueba de Fungicidas, se utilizaron Benomilo, Carbendazin y un testigo absoluto en el control de *T. paradoxa*; las variables: crecimiento y porcentaje de inhibición. Para cada uno de los ensayos se tuvieron 10 repeticiones, se realizó análisis de varianza y prueba de Tukey. Dos de las cepas de *T. asperellum* lograron la mayor inhibición con 94.5 y 92.8 %. En la prueba dual, las cepas tuvieron antagonismo clase 1. Los fungicidas sintéticos inhibieron el 100% y 99%.

107

CONTROL QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL DAMPING-OFF EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULA DE TOMATE.

[Chemical and biological control of damping off in the tomato plant production]. ¹Alejandro C. Michel-Aceves, ¹Marco A. Otero-Sánchez, ²Rafael Ariza-Flores, y ¹José Ángel Alcántara-Jiménez. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias - Guerrero (INIFAP-Guerrero). amichelaceves@yahoo.com.mx

Se evaluó el control del “Damping-off” con mezclas de fungicidas químicos, cepas nativas y comerciales de agentes biológicos y comparó su eficiencia en los híbridos de tomate Ramsés y Toro. Con 19 niveles de mezclas de productos: fungicidas químicos, cepas nativas y productos comerciales de agentes de control biológico, y el testigo sin aplicación, generándose 40 tratamientos. Se utilizaron charolas de unicel de 200 cavidades. Los tratamientos se distribuyeron en un diseño experimental de bloques incompletos en arreglo de parcelas divididas. Los genotipos fueron las parcelas grandes y las mezclas de productos las parcelas chicas, con 8 repeticiones. Las charolas se inocularon con 180 mL del complejo de hongos constituido por esporas y micelio de *Fusarium-solani* (2×10^6), *Rhizoctonia-solani* (1×10^6), *Phytophthora-capsici* (1×10^5) y *Sclerotium-rolfsii* (micelio-esclerocios). Las variables fueron: altura de plántula, número de hojas, diámetro del cuello, peso fresco y seco de follaje y raíz, severidad de enfermedad y días a presencia del Damping-off. Se realizó análisis de varianza y prueba de Tukey al 5%. Las mezclas de BIOPAK-F®+PREVICUR®, BIOPAK-F®+RIDOMIL GOLD®, TRAZAK+PREVICUR® y la cepa nativa de *Trichoderma-asperellum*+PREVICUR® lograron mejor reducción del Damping-off, evitando su presencia y con características agronómicas sobresalientes. La mezcla de MANCOZEB+Q-2000+RIDOMIL-GOLD®+CERCOBIN® generó toxicidad en la planta. El híbrido Ramsés presentó los mejores parámetros agronómicos, excepto para las variables peso fresco y seco de raíz-follaje donde el híbrido Toro fue mejor. No se recomienda mezclar Biopak-F con fungicidas o bactericidas.

108

MANEJO DE *Botrytis cinerea*, MEDIANTE EL USO DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA, SILICIO, COBRE Y NÍQUEL EN FRESA (*Fragaria*

x ananassa Duch.). [Management of *Botrytis cinerea*, through the use of silver nanoparticles, silicon, copper and nickel in strawberry (*Fragaria x ananassa* Duch.)]. Eduardo Santiago-Elena, Disraeli Eron Moreno-Guerrero, Hugo Velasco-Montaño, Karla Giovana Elizalde-Gaytán, Julieta Martínez-Cruz, Edmundo Arturo Pérez-Godínez. Universidad Autónoma Chapingo. riquelme_124@hotmail.com

El uso de plata, níquel, silicio y cobre son útiles para las plantas como micronutrientes y pueden ser una alternativa para reducir la incidencia de hongos fitopatógenos en fresa. El objetivo fue evaluar la efectividad biológica de nanopartículas de plata (AgNPs) y cobre (CuNPs), la combinación de plata/cobre (AgNPs/CuNPs), NiSO_4 y Na_2SiO_3 para el manejo de *Botrytis cinerea*, aplicados vía foliar en plantas de fresa cv. Festival, bajo sistema hidropónico. Se utilizó un diseño en bloques completamente al azar, tres bloques con 10 tratamientos y tres repeticiones. Se evaluaron NiSO_4 2.5 y 7.5 mg/L, Na_2SiO_3 50 y 100 mg/L, AgNPs 15 y 25 mg/L y AgNPs/CuNPs 15 y 25 mg/L. Se midió la incidencia y eficacia biológica de los tratamientos. Los datos se analizaron mediante ANOVA y Tukey ($P \leq 0.05\%$). Las AgNPs/CuNPs presentaron un 27% de incidencia (bc) así como AgNPs 30% (bc) ambos en la dosis de 25 mg/L y NiSO_4 2.5 mg/L con un 20% (c) disminuyeron significativamente la incidencia en comparación con el testigo (71%) (a), y el Na_2SiO_3 100 mg/L con un 53% (ab) fue el tratamiento con mayor incidencia. En efectividad biológica ($\alpha=0.05$), Fludioxonil más Ciprodinil presentó 84% (a), AgNPs/CuNPs 15 mg/L 72% (a), AgNPs 15 mg/L mostró 68% (a) y NiSO_4 2.5 mg/L el 70% (a) mostrando significancia, por lo tanto, se considera que AgNPs y NiSO_4 tienen potencial en el manejo de *B. cinerea*.

SILICIO, NÍQUEL, AgNPs Y CuNPs EN EL MANEJO DE *Botrytis cinerea* (Pers.) IN VITRO. [Silicon, Nickel, AgNPs AND CuNPs in the management of *Botrytis cinerea* (Pers.) in vitro]. Eduardo Santiago-Elena, Disraeli Eron Moreno-Guerrero, Julieta Martínez-Cruz, Karla Giovana Elizalde-Gaytán, Santos Gerardo Leyva-Mir. Universidad Autónoma Chapingo. Email: riquelme_124@hotmail.com

Botrytis cinerea, patógeno vegetal necrotrófico, clasificado dentro de los diez principales patógenos de acuerdo con su importancia económica, científica y alta resistencia a fungicidas. El objetivo fue evaluar los efectos de Silicato Sódico (Na_2SiO_3), Sulfato de Níquel (NiSO_4), Nanopartículas de Plata (AgNPs) y Cobre (CuNPs) y la combinación de AgNPs/CuNPs en el manejo *B. cinerea*, in vitro. El inóculo se obtuvo de plantas sintomáticas de fresa, de Guadalupe Rivera, Irapuato, Guanajuato. El experimento se realizó en cajas Petri con medio de cultivo Papa Dextrosa Agar. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 17 tratamientos y seis repeticiones, NiSO_4 2.5, 7.5, y 10 mg.L⁻¹; Na_2SiO_3 50, 100 y 150 mg.L⁻¹; AgNPs 15, 25 y 35 mg.L⁻¹; Ag/CuNPs 4/8, 8/16, y 12/24 mg.L⁻¹; CuNPs 8, 16 y 24 mg.L⁻¹ y dos testigos, uno absoluto (agua destilada estéril) y un fungicida Fludioxonil+Ciprodinil 1000 mg.L⁻¹. Se realizó el análisis de varianza y comparación múltiple de medias (Tukey $\alpha=0.05$). La evaluación de sensibilidad se basó en el crecimiento micelial radial de la colonia (diámetro en cm²). En cuanto a la inhibición del crecimiento micelial, NiSO_4 2.5 mg L⁻¹ esta presentó el valor más alto a las 72 h de evaluación 85.54%, con AgNPs 35 mg.L⁻¹ de 63.46% y con Ag/CuNPs 12/24 mg.L⁻¹ de 30.72%. Para AgNPs

la dosis de 35 ml.L-1 presentó un 63.46% de inhibición, y para 100 ppm de AgNPs un 100% de control, las AgNPs y NiSO₄ podrían ser una alternativa para su evaluación en condiciones de campo.

110

DESARROLLO DE EXTRACTOS VEGETALES EN SINERGI A CON MICROORGANISMOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL CONTROL DE INSECTOS PLAGA. [Development of plant extracts in synergy with entomopathogenic microorganisms for the control of insect plague].

Erika Natalia Ríos-Herrera¹, Epifanio Castro-del Ángel², Yisa María Ochoa-Fuentes², Ernesto Cerna-Chávez², Alberto Margarito García-Munguía¹. ¹Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciencias Agropecuarias, Universidad Autónoma de Aguascalientes. ²Departamento de Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. ery1010@hotmail.com

El objetivo del estudio fue evaluar el potencial de biocontrol de extractos crudos y concentrados de *Maclura pomifera*, potenciando su efecto al combinar hongos entomopatógenos contra *Plutella xylostella* en condiciones *in vitro*. Los entomopatógenos fueron aislados de muestras de suelo de Saltillo, Coahuila. La caracterización de los microorganismos se realizó morfológicamente de acuerdo con claves dicotómicas. Los extractos se obtuvieron mediante agitación constante en ausencia de luz y mediante destilación en un evaporador rotativo. El extracto se evaluó mediante la técnica de película residual sobre *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* en medio Papa-Dextrosa-Agar con extracto de levadura al 1%, la variable medida fue el porcentaje de inhibición. Se realizó un análisis de varianza y prueba de separación de medias de Tukey. Los resultados obtenidos mostraron

que los extractos no presentaron efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los entomopatógenos, sin embargo, el extracto de metanol evaluado en el bioensayo con *P. xylostella* fue el tratamiento más efectivo ya que el total de las larvas murieron dentro de las primeras 48 h. Es importante mencionar que no existen reportes previos del uso de *Maclura pomifera*, planta utilizada en este estudio.

111

EFFECTIVIDAD BIOLÓGICA DE ACEITES ESENCIALES PARA EL CONTROL DE *Fusarium oxysporum* y *F. meridionale* ASOCIADOS AL CULTIVO DE AGUACATE. [Biological effectiveness of essential oils for the control of *Fusarium oxysporum* and *F. meridionale* associated with the avocado crop].

Brenda Razo-Morales¹, Citlalli Colín-Chávez², Fabiola Esquivel-Chávez^{2*}. ¹Instituto Tecnológico de Morelia, ²Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. *fesquivel@cidam.org

En este estudio se presentan evidencias sobre la efectividad biológica de los aceites esenciales de tomillo y orégano para el control de *Fusarium oxysporum* y *F. meridionale*, hongos fitopatógenos aislados del cultivo de aguacate. El objetivo fue evaluar la actividad antifúngica de los aceites de tomillo y orégano sobre *F. oxysporum* y *F. meridionale* en condiciones *in vitro*. Se realizó mediante el método de difusión por discos de papel filtro, en el medio de cultivo Papa-Dextrosa-Agar. Se evaluaron tres concentraciones de cada aceite 5, 10 y 15 µL y dos controles (absoluto y agua), con cinco repeticiones por tratamiento. Se obtuvo el 100% de inhibición sobre el crecimiento micelial de *F. meridionale* aplicando aceite de orégano. En la aplicación de aceite de tomillo se presentó crecimiento mínimo en la dosis de 5 µL a partir del noveno día

de incubación. Con respecto a *F. oxysporum* con aceite de tomillo a partir del décimo día se observó crecimiento micelial en la dosis de 5 µL, mientras que en la aplicación del aceite de orégano el crecimiento se presentó en las dosis de 5, 10 y 15 µL, a partir de los días 9, 11 y 12 respectivamente. Se concluye que los aceites de tomillo y orégano tienen alta efectividad para el control in vitro de especies de *Fusarium* ya que se observó de un 98.33% a un 100% de inhibición.

112

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE METABOLITOS PRODUCIDOS POR CEPAS BACTERIANAS PROVENIENTES DE LA RIZÓSFERA DEL AGUACATERO (*Persea americana*).

[Antimicrobial activity of metabolites produced by bacterial strains from the rhizosphere of avocado (*Persea americana*)]. Elvis M. Cortazar-Murillo¹, Juan L. Monribot-Villanueva¹, Ana L. Kiel-Martínez¹, Edith Garay-Serrano¹, Alfonso Méndez-Bravo², José A. Guerrero-Analco^{1*}, Frédérique Reverchon^{1*}. ¹Instituto de Ecología A.C., CONACyT, ²ENES Morelia, UNAM.*joseantonio.guerrero@inecol.mx; frederique.reverchon@inecol.mx

Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal pueden reducir la presencia de fitopatógenos mediante la secreción de compuestos bioactivos. Por ello, en este trabajo se evaluó la actividad de los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y difusibles (CD) de dos cepas bacterianas (A8a y HA) pertenecientes al género *Bacillus*, contra los hongos fitopatógenos *Fusarium solani* y *Fusarium* sp. asociados al escarabajo barrenador Kuroshio, y el oomiceto *Phytophthora cinnamomi*. El método de caja Petri sellada se utilizó para la evaluación de los COVs de ambas cepas, mostrando que éstos inhiben el crecimiento micelial de los tres patógenos.

Los COVs fueron identificados tentativamente mediante CG-EM, predominando los compuestos de tipo cetona, pirazinas, alcoholes y compuestos azufrados, que han sido reportados por inhibir el crecimiento de algunos hongos fitopatógenos. Los CD se evaluaron mediante la técnica de cultivo dual, donde sólo la cepa A8a logró disminuir el crecimiento de *P. cinnamomi*. Finalmente, se evaluó la actividad de extractos orgánicos obtenidos de ambas cepas empleando el método de dilución en pozo, donde se observó que los extractos obtenidos con acetato de etilo a una concentración de 2 mg/ml de la cepa A8a inhibieron al 100% el crecimiento de ambas especies de *Fusarium*. La identificación tentativa de los compuestos presentes en los extractos crudos se realizará mediante UPLC-MS-QTOF. La actividad promotora del crecimiento vegetal de ambas cepas y de sus metabolitos será evaluada para detectar una posible inducción de resistencia en la planta.

113

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE BACTERIAS ASOCIADAS A LA CORTEZA DE AGUACATEROS CONTRA HONGOS DEL GÉNERO *Fusarium*.

[Antifungal activity of bacteria associated to the avocado bark against fungi of the *Fusarium* genus]. Monserrat Marín Guiot, Frédérique Reverchon*. Instituto de Ecología A.C. * frederique.reverchon@inecol.mx

La búsqueda de agentes bacterianos de control biológico es una estrategia prometedora para mitigar el impacto de enfermedades fúngicas en plantas. En este trabajo, evaluamos el potencial de bacterias aisladas a partir de la corteza de árboles de aguacate (*Persea americana* Mill.) para inhibir el crecimiento de tres hongos fitopatógenos del género *Fusarium*: *F. solani*, *F. oxysporum*, y *Fusarium*

sp. asociados al escarabajo ambrosial Kuroshio y responsable de la marchitez por *Fusarium* en más de 200 especies de plantas. Los aislados bacterianos fueron obtenidos de la corteza de 10 aguacateros en una huerta de Huatusco, Veracruz. Su actividad antifúngica fue evaluada mediante cultivo dual *in vitro* contra *F. solani* y *F. oxysporum*; aquellos aislados que inhibieron el crecimiento micelial de al menos un hongo fueron evaluados en ensayos de antagonismo indirecto, mediante el método de doble caja sellada, para determinar la actividad antifúngica de sus compuestos volátiles. Los aislados bacterianos con actividad antifúngica significativa fueron identificados mediante secuenciación del gen 16S rRNA como *Bacillus* spp. Posteriormente, dichos aislados fueron evaluados contra *Fusarium* sp. en el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de SENASICA. Seis aislados lograron inhibir el crecimiento de *Fusarium* sp. de manera significativa en ensayos de antagonismo directo, mientras que un aislado inhibió el crecimiento del hongo a través de la emisión de compuestos volátiles. Los daños causados en las hifas de los tres hongos por los aislados que presentaron actividad antifúngica significativa fueron documentados mediante imágenes de microscopía confocal y electrónica de barrido para corroborar la presencia de alteraciones morfológicas.

114

ACTINOMICETOS COMO AGENTES DE BIOCONTROL *in vitro* DE *Fusarium euwallaceae*. [Actinomycetes as agents of biocontrol *in vitro* of *Fusarium euwallaceae*]. Evangelina Quiñones-Aguilar^{1*}, Clemente García-Ávila², Jesús Trinidad-Cruz¹, Gabriel Rincón-Enríquez¹. ¹Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ; ²CNRF-DGSV-SENASICA. *equinones@ciatej.mx.

La marchitez por *Fusarium* en plantas de aguacate (*Persea americana*) es provocada por *Fusarium euwallaceae* (*Fe*) y mantiene una relación simbiótica con el escarabajo ambrosial *Euwallacea* sp. El insecto hembra transporta en sus micangios a las esporas del hongo y las inocula en las galerías frescas que realiza en la planta, donde el hongo se alimenta y prospera. A cambio de esto, *Fe* le proporciona alimento al insecto para crecer y reproducirse en el interior de estas galerías. Bajo este contexto, la búsqueda de soluciones de control tanto *Fe* como del insecto o de la simbiosis insecto-hongo simbiote es el empleo de estrategias de biocontrol. El objetivo de este trabajo fue evaluar actinobacterias como agentes de control biológico (ACB) de ambos miembros de la simbiosis. Se realizó un experimento *in vitro* completamente al azar con 96 actinobacterias y un tratamiento con solo *Fe* y cuatro repeticiones. En placa Petri con medio PDA, se colocó en el centro un explante de 7 mm de diámetro por cepa antagonista y se incubó dos días. Posteriormente se colocó en cada extremo a 0.5 cm del borde de la placa un explante de 7 mm de diámetro de *Fe*. A los 12 días, se midió el diámetro de inhibición del crecimiento del hongo. Se encontró que 10 cepas de actinobacterias inhibieron a *Fe* con diámetros mayores a 25 mm (Tukey, $P \leq 0.05$). Estas cepas pueden evaluarse en experimentos como potenciales ACB tanto de *Fe* como del escarabajo ambrosial.

115

COMBINACIÓN DE INDUCTORES DE RESISTENCIA CON FUNGICIDAS PARA EL MANEJO DE LA PUDRICIÓN CAFÉ (*Monilinia fructicola*). [Combination of resistance inducers with fungicides for the management of brown rot (*Monilinia fructicola*)]. Isabel Nativitas-Lima¹,

Guillermo Calderón-Zavala¹, Santos Gerardo Leyva-Mir², María Teresa Colinas-León², José Isabel Cortes-Flores¹ y Crescenciano Saucedo-Veloz¹.
¹Colegio de Postgraduados. ²Universidad Autónoma Chapingo. nativitas.isabel@colpos.mx.

La pudrición café (*Monilinia fructicola*) causa pérdidas anuales a nivel mundial de 1700 millones de euros. Existen estrategias de manejo integrado de la enfermedad mediante el uso de inductores de resistencia. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de inductores de resistencia en combinación con fungicidas y determinar su efecto en parámetros descriptivos del desarrollo de la enfermedad, fenoles totales y catalasa. El experimento se realizó durante dos ciclos productivos. Se aplicaron tratamientos con un diseño en bloques completos al azar, unidad experimental de seis árboles cv. F70 de 8 años de edad, se estudiaron dos factores: 1) inductores de resistencia (silicato de potasio, acibenzolar-S-Methyl, fosfito de potasio y sin inductor) aplicados por separado y 2) dosis de fungicidas (dosis recomendada y 25 % menos a la recomendada de captan, clorotalonil y tiofanato metílico). Se cosecharon frutos en madurez fisiológica para inocularlos con *Monilinia fructicola* (1×10^6 conidios mL⁻¹), se colocaron en cámara húmeda a 26 ± 2 °C, se evaluó severidad, tasa de incremento, intensidad inicial de la enfermedad, área bajo la curva del progreso de la enfermedad (ABCPE), fenoles y catalasa. Se encontró que el fosfito de potasio en combinación con los fungicidas a la dosis recomendada redujo el ABCPE 70 y 23 % en el primer y segundo año de evaluación respectivamente. La catalasa se incrementó con la aplicación de los inductores, lo cual está relacionado con una disminución del ataque de patógenos.

CARACTERIZACIÓN DE AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO PARA ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EN CULTIVOS DE CACAO EN CHIAPAS. [Characterization of biological control agents for diseases of importance in cacao crops in Chiapas]. Nadia Denisse Rodríguez-Velázquez, Belén Chávez-Ramírez, Carlos Hugo Avendaño-Arrazate, Paulina Estrada-de los Santos. IPN, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. plus_nadia@hotmail

Las enfermedades causadas por hongos y oomycetes constituyen las más importantes del cacao en el estado de Chiapas, destacan la moniliasis (*Moniliophthora roreri*), la antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*) y la pudrición negra (*Phytophthora* spp.). El objetivo fue caracterizar agentes de biocontrol para las enfermedades señaladas en cacao cultivado en Chiapas, como antecedente para la elaboración de un producto que se utilice en campo. Como estos patógenos afectan las partes aéreas, se tomaron muestras de la superficie de mazorcas, hojas y flores de plantas de cacao aparentemente sanas, de un cultivo con plantas enfermas, para seleccionar a aquellos microorganismos que pudieran estar ejerciendo un control biológico en el cacao. Como resultados se obtuvieron 40 bacterias antagonicas de *M. roreri*, *C. gloeosporioides* y *Phytophthora* sp. De estos, se seleccionó un aislado antagonico que presentó un porcentaje de inhibición mayor del 70% para los tres hongos fitopatogenos. Este valor podría sugerir su uso como agente de biocontrol. El antagonista fue identificado por 16S rRNA como *Fructobacillus*, un miembro de la familia Leuconostocaceae, Gram positivo con pocas

especies en el género. Además, la patogenicidad de los hongos se corroboró en la fruta de pera con el objetivo de establecer un modelo de estudio para analizar el agente de control biológico *in vivo*. Actualmente, el experimento *in vivo* se lleva a cabo, utilizando un ensayo por triplicado con bacterias antagónicas de los hongos en estudio en el modelo de pera.

117

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL QUÍMICO *in vitro* DEL AGENTE CAUSAL DEL TIZÓN GOMOSO DE LAS CUCURBITÁCEAS EN EL ORIENTE DE MORELOS. [Identification and chemical control *in vitro* of the causal agent of the gummy blight of cucurbitacea in the east of Morelos].

Jesús Alberto Bonilla-Pérez^{1*}, Dagoberto Guillen-Sánchez¹, Daniel Bárcenas-Santana¹. ¹UAEM Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc. jesus95alberto.95@gmail.com

El tizón gomoso es una de las enfermedades más importantes de las cucurbitáceas en regiones templadas tanto en invernadero como en campo abierto, afecta desde plántula hasta postcosecha y reduce hasta 90% del rendimiento y calidad de los frutos. Se planteó la investigación con el objetivo de identificar y dar una alternativa de control al agente causal del tizón gomoso (TG) en Morelos. Se colectaron muestras de pepino de parcelas comerciales con síntomas de TG. Se realizaron cámaras húmedas y siembra directa de tejido enfermo de tallos, de los cuales se obtuvo una cepa de color blanco con crecimiento ondular y micelio aéreo, a los 5 días se observaron picnidiosporas hialinas, de forma cilíndrica, redondeadas en los extremos, y con un septo truncado en su centro, lo cual indica que se trata de *Didymella bryoniae*. Se realizaron pruebas de patogenicidad en plántulas y frutos de

calabaza, sandía y pepino en donde fueron positivos. Bajo un diseño experimental completamente alzar con cinco repeticiones se evaluaron de forma *in vitro* en la dosis baja, media y alta de acuerdo con su etiqueta los fungicidas Clorotalonil, Tebuconazole, Fosetil-Al + Propamocarb, Procloraz, Boscalid + Pyraclostrobin, Carbendazín, Fluxapyroxad + Pyraclostrobin y un testigo. Se determinó la eficacia con la fórmula de Abbott. Se obtuvo un control del 100% con Tebuconazole y Procloraz y menos del 70% con Boscalid + Pyraclostrobin y Fluxapyroxad + Pyraclostrobin.

118

ETIOLOGÍA DE LA CENICILLA EN SALVIA (*Salvia officinalis*) EN MÉXICO. [Etiology of powdery mildew on common sage (*Salvia officinalis*) in Mexico].

Marlene Díaz-Celaya¹, Y. Leticia Fernández-Pavía², Nuria Gómez-Dorantes¹, Gerardo Rodríguez-Alvarado¹. ¹Laboratorio de Patología Vegetal, IIAF, UMSNH. ²PREGEP-Fruticultura, COLPOS. yletif@yahoo.com.mx

Salvia (*Salvia officinalis*) es una planta herbácea y perenne de la familia Lamiaceae, originaria de la zona mediterránea y naturalizada en varios países. En México se le conoce como “planta sagrada”, es utilizada como planta medicinal por sus propiedades curativas, en gastronomía, como bioinsecticida, en la industria de perfumes (por sus aceites esenciales) y como planta de ornato. Se observaron plantas con síntomas de cenicilla en viveros de la Ciudad de México (Xochimilco) y en huertos familiares en Michoacán, durante el mes de mayo de 2019. El objetivo de este estudio fue determinar el agente causal de la cenicilla en *S. officinalis*. Se llevó a cabo la caracterización morfológica mediante preparaciones con cinta adhesiva. Se observó micelio poco abundante en tallo, las hojas

presentaban inicialmente áreas de color blanco que posteriormente coalescieron y cubrieron completamente el haz de las hojas. Las hifas eran hialinas de 10 µm de ancho; el estado anamorfo presentó conidióforos erectos; células del pie casi cilíndricas, 50-67.5 x 7.5-20 µm, seguidas por 3 células más cortas, formando conidios en cadena; conidios hialinos, doliformes, 32.5-45 x 17.5-25 µm, no se observaron casmotecios. Las estructuras observadas concuerdan con las descritas para *Golovinomyces* sp. Este es el primer reporte de *Golovinomyces* en *S. officinalis* en México. La identificación molecular de la especie está en proceso.

119

MANCHAS NECRÓTICAS CAUSADAS (*Colletotrichum* sp.) EN PLANTAS DE MANGO (*Mangifera indica*) EN SAN ANTONIO JICALTEPEC, PUTLA, OAX. [Necrotic spots caused by (*Colletotrichum* sp.) in mango (*Mangifera indica*) plants at San Antonio Jicaltepec, Putla, Oaxaca]. Sergio Cruz-Cruz¹, Javier Castillo-Cabrera¹, Jesús Castillo-Cabrera¹, Noé Bautista-Hernández¹, Javier Ezequiel Fuentes-García¹, Laura Hernández-Sánchez¹, Adrián Martínez-Vargas¹, Teresa Hernández-Morales², Yesenia González-Guzmán², Alfonso Vásquez-López³. Instituto Tecnológico del Valle de Etna, Nudo San Sebastián Nopalera¹. Instituto Tecnológico de Tlaxiaco². Instituto Politécnico Nacional. CIIDIR-OAXACA³. sinha.scc@gmail.com

En la comunidad de San Antonio Jicaltepec, Putla, Oax., la producción de mango (*Mangifera indica*) dinamiza la economía local; sin embargo las enfermedades de origen fúngico causan pérdidas cuantitativas en la producción. El objetivo del siguiente estudio fue identificar a los hongos

asociados a manchas necróticas en hojas y frutos de mango. Las pruebas de laboratorio se realizaron en el Instituto Tecnológico del Valle de Etna, Nudo San Sebastián Nopalera. Secciones de 0.5 cm² de tejido enfermo, previamente desinfectados y lavado en hipoclorito de sodio al 2%, posteriormente se sembraron en medio de cultivo papa-dextrosa-agar y se incubaron a temperatura ambiente 22-25°C y luz natural. Los hongos encontrados se identificaron a nivel de género siguiendo las claves taxonómicas generales. De las diez muestras en estudio, se aisló a *Colletotrichum* sp. en 80% y en 20% a otros hongos, en proceso de identificación. En la comunidad de San Antonio Jicaltepec no se tienen reportes de *Colletotrichum* sp. por lo que son los primeros estudios. Las condiciones climáticas que se presentan en el área de estudio favorecen el desarrollo de *Colletotrichum* sp. El siguiente paso de este estudio es verificar la patogenicidad de cada uno de los hongos asociados a la enfermedad para establecer un programa fitosanitario y reducir la pérdida de frutos de calidad comercial.

120

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE COMPUESTOS BIOACTIVOS DE EXTRACTOS DE PARTES POCO VALORADAS DE CULTIVOS CONTRA *Fusarium oxysporum*. [Antifungal activity of bioactive compounds from extracts from low-value parts of cultures against *Fusarium oxysporum*]. Saira Rocío Martínez-Alemán¹, Francisco Daniel Hernández-Castillo¹, Cristóbal Noé Aguilar-González², Raúl Rodríguez-Herrera². ¹Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. ²Universidad Autónoma de Coahuila. saira.mtz.aleman@hotmail.com

Fusarium oxysporum ocasiona pérdidas principalmente económicas y de producción en el cultivo

del tomate. Para contener el daño por este patógeno, usualmente se utiliza el control químico, pero genera resistencia, problemas medioambientales y daño a la salud. Actualmente se busca el uso de compuestos naturales a través de la elaboración de extractos vegetales, y mediante técnicas alternativas. En este trabajo se evaluaron compuestos bioactivos purificados de extractos de partes poco valoradas de cultivos contra *F. oxysporum*. Los extractos acuosos y etanólicos de hojas de guanábana, hoja de moringa, pulpa de café y sorgo con alto contenido de taninos se elaboraron empleando la técnica de extracción asistida por ultrasonido y microondas; posteriormente se purificaron los compuestos bioactivos de cada extracto por cromatografía en columna. Para la evaluación antifúngica se usaron microplacas de 96 pozos con tres repeticiones; usando concentraciones desde 1000 ppm hasta 3.9 ppm. La absorbancia se midió a 490 nm, se calculó el porcentaje de inhibición, se determinó la CI_{50} con análisis Probit; y se analizaron con pruebas de Tukey a significancia de 0.05. El mayor porcentaje de inhibición se obtuvo con las hojas de moringa (94.3 %) a 1000 ppm; mientras que la CI_{50} más baja fue de 269,79 ppm para los compuestos bioactivos de sorgo. Los compuestos bioactivos purificados de extractos etanólicos de hoja de moringa, pulpa de café y sorgo son buenos inhibiendo el desarrollo de hongos fitopatógenos como *F. oxysporum*.

121

DIAGNÓSTICO DE ANTRACNOSIS (*Colletotrichum* sp.) EN PLANTAS DE GUANÁBANA (*Annona muricata*) EN PEÑA NEGRA, SAN SEBASTIÁN NOPALERA, OAX. [Diagnostic of anthracnose (*Colletotrichum* sp) in guanabana (*Annona muricata*) plants in Peña Negra, San Sebastián Nopalera, Oax]. Noé Bautista-Hernández¹,

Sergio Cruz-Cruz¹, Javier Castillo-Cabrera¹, Jesús Castillo-Cabrera¹, a López-Melchor¹, Laura Hernández-Sánchez¹, Teresa Hernández-Morales², Alfonso Vásquez-López³, ¹Instituto Tecnológico del Valle de Etla Nodo San Sebastián Nopalera. Oaxaca. ²Instituto Tecnológico de Tlaxiaco. Oaxaca. ³Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR)-OAXACA snak-7@hotmail.com

En la ranchería de Peña Negra, San Sebastián Nopalera, Oaxaca, existen plantaciones de guanábana (*Annona muricata*). Este cultivo genera ingresos económicos a la comunidad, sin embargo, su producción se merma por ataques de enfermedades fúngicas. El objetivo del siguiente estudio fue identificar los agentes fitopatógenos que causan daño y merman la producción del cultivo de guanábana. Para la identificación de antracnosis, se recolectaron en campo hojas de la guanábana, se hizo el corte por secciones (0.5 cm²) de tejido enfermo, el material vegetal se desinfectó con hipoclorito de sodio al 2% posteriormente fue lavado con agua destilada, se sembraron en medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA) y se incubaron a temperatura ambiente (22-25°C) y luz natural. Los hongos encontrados se identificaron a nivel de género siguiendo las claves taxonómicas generales. Se logró la identificación de *Colletotrichum* sp. En la ranchería de Peña Negra, San Sebastián Nopalera no se había realizado el diagnóstico de la enfermedad antes mencionada. Las condiciones climáticas que se presentan en Peña Negra, San Sebastián Nopalera favorecen el desarrollo de *Colletotrichum* sp. Este trabajo proporciona información básica para establecer programas fitosanitarios para el cultivo de guanábana en la región Mixteca de Oaxaca.

122

EL PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS ENDÓFITOS EN LA SALUD DEL MAÍZ. [The role of microbial endophytes on maize health].

Rebeca Vallejo-González^{1,2}, Sylvia P. Fernández-Pavía¹, John Larsen², Héctor J. Anselmo-Moreno¹, Gerardo Rodríguez-Alvarado¹, Sabine Ravnskov³. UMSNH¹, UNAM², AU³. Email: rebecavallejogonzalez@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue evaluar el papel de las comunidades de bacterias endófitas (B), y el hongo micorrízico arbuscular (HMA) *Rhizophagus irregularis* en la salud del maíz. En la primera fase, los tratamientos consistieron en diez genotipos de maíz (NB9, DK2061, PUMA, CRM52, H-318, Dulce, Elotes occidentales, Ancho, Azul y Rojo espada) infectados con el patógeno *Pythium arrhenomanes* (+P) o no (-P), con cuatro repeticiones, en un diseño factorial completo. Los resultados del análisis lineal generalizado y la comparación de medias con la prueba de Tukey, mostraron que E. Occidentales, NB9 y PUMA fueron resistentes al patógeno, mientras que DK2061, CRM52, Dulce, Ancho y Azul fueron medianamente susceptibles; y que R. espada y H318 fueron altamente susceptibles. En la segunda fase, los tratamientos consistieron en plantas del genotipo susceptible H-318 y del genotipo parcialmente resistente NB9, inoculadas con HMA (+HMA), o no (-HMA), con B (BNB9, BEocci y BH318), o no (- B), e infectadas (+P), o no (-P), con cuatro repeticiones, en un diseño factorial completo. BNB9 y BEocci fueron aisladas de los genotipos resistentes (NB9 y E. occidentales) y BH318 de un genotipo susceptible (H318). Los resultados mostraron que BNB9, BEocci, y +HMA no contrarrestaron los efectos negativos en plantas +P, y que las BH318 no incrementaron el daño. Sin embargo, en tratamientos -P, aumentaron la

biomasa de las plantas y modificaron la raíz, efecto dependiente del genotipo de maíz. En conclusión, los microorganismos endófitos no influyeron en la salud del maíz, aunque sus efectos los determinó el genotipo.

123

EFFECTO ANTIFÚNGICO DE EXTRACTO ETANÓLICO Y HEXÁNICO DE ROMERO (*Rosmarinus officinalis*). SOBRE LA INHIBICIÓN *IN VITRO* DE HONGOS FITOPATÓGENOS. [Antifungal effect of ethanolic and hexanic extract of romero (*Rosmarinus officinalis*). *in vitro* of phytopathogen fungi].

Adolfo Padilla-Mendiola, Carolina del Rocío Gamiz-Fuentes, Valeria Romo-Vargas, Elva Marcela Coria-Quñones, Sandra Iliana Torres-Herrera, Diana Barraza-Jiménez. Facultad de Ciencias Químicas Durango Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). ingpadilla@hotmail.com

En Durango existen una gran variedad de hortalizas dentro de ellas el chile poblano (*Capsicum annuum*), uno de los principales cultivos, el cual es atacado por una serie de hongos fitopatógenos. En este trabajo se evaluó la acción antifúngica del aceite esencial del romero con el extracto etanólico y hexánico, contra los hongos *Sclerotium* sp y *Phytophthora* sp. Se cree que es por los efectos tóxicos que tienen los componentes de este aceite esencial como el ácido rosmarínico, el ácido carnósico que se caracteriza por ser inestable, su degradación se da por incremento de la temperatura y exposición a la luz; en presencia de oxígeno puede oxidarse para formar carnosol, el 1,8-cineol entre otros más, pero hay mayor investigación sobre estos componentes en acción antifúngica. El método utilizado fue por extracción etanólica y hexánica, las concentraciones fueron 1000, 1500

y 2000 ppm, se analizó un testigo absoluto y un control para verificar que no interfieran con la inhibición. Nuestro resultado fue nulo ya que no hubo inhibición contra los hongos, a pesar de ello se cifraron estadísticas para el presente trabajo, creemos que si se incrementara la concentración del extracto se pudiera llegar a tener resultados positivos en la inhibición. Se pretende eliminar fungicidas químicos sintéticos. Sin embargo, se sentaron bases para continuar evaluando una serie de plantas en contra de hongos fitopatógenos de mayor incidencia en el estado.

124

DIAGNÓSTICO DEL AGENTE CAUSAL DE LA MARCHITEZ VASCULAR DEL TOMATE EN GUERRERO

[Diagnosis of the causative agent of tomato vascular wilt in Guerrero]. José Alfredo Flores-Yáñez¹, Sergio Ayvar-Serna², Marcelo Acosta-Ramos¹, Clemente de Jesús García-Ávila³, Mateo Vargas-Hernández¹, Israel Morales-Gonzales³, José Abel López-Buenfil³. ¹Posgrado en Protección Vegetal UACH, ²CEP-CSAEGro, ³Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, SENASICA. alfredo.flores.y@gmail.com

La producción de tomate en Guerrero se concentra en los municipios Eduardo Neri, Chilpancingo, Buena Vista y Chilapa. Este último, en 2017 produjo >1500 t generando más de \$10'000,000 de ingresos. En este municipio se han observado problemas graves por enfermedades de origen edáfico. Lo anterior motivó a realizar esta investigación para identificar al agente causal de la marchitez vascular del tomate, y con base en ello determinar las acciones de control más adecuadas. Se colectaron raíces de plantas de tomate Palermo con clorosis, marchitez y necrosis vascular, se obtuvieron 11 aislamientos fúngicos monospóricos, los cuales se

identificaron mediante sus características morfológicas; se realizaron postulados de Koch inoculando 6×10^6 macroconidios planta⁻¹ en las variedades diferenciales Bonny Best, Manapal, Walter e I3R3, usando 3 plantas de cada variedad por aislamiento. Para corroborar la identidad del hongo se realizó un PCR con los primers específicos UNI, SP13 y SP23. La morfología de los 11 aislamientos coincidió con *Fusarium oxysporum*; sin embargo, solo un aislamiento infectó los genotipos Bonny Best y Walter, susceptibles a *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici* (Fol) raza 3; lo anterior se confirmó por las ampliificaciones de 672(UNI), 445(SP13) y 518(SP23) pb, concordando con los fragmentos reportados por Hirano y Arie (2006) para *Fol* raza 3. El manejo de este patógeno debe iniciar desde la selección del genotipo, por lo cual deberían usarse híbridos de tomate que contengan los genes de resistencia a este microorganismo.

125

CARACTERIZACIÓN PATOGENICA DE AISLAMIENTOS MEXICANOS DE *Fusarium oxysporum* f. sp. *mori* EN ZARZAMORA. USO EN ESTUDIOS DE SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL Y ALTERNATIVAS DE CONTROL *IN VITRO*.

[Pathogenic characterization of Mexican isolations of *Fusarium oxysporum* f. sp. *mori* in zucchini. use in varietal susceptibility studies and in vitro control alternatives]. Araceli Nieto-Cortez, Douglas Rodríguez-Martínez, María L. Rojas-Sánchez. Investigación Aplicada, Driscoll's-México. araceli.nieto@driscolls.com

En los últimos años el cultivo de la zarzamora (*Rubus* L. subgénero *Rubus*) ha sido afectado por *F. oxysporum* f. sp. *mori* en regiones de México y California. La enfermedad conduce a la muerte de plantas ocasionando pérdidas económicas

importantes. Se seleccionaron aislados patogénicos (AP) de *F. oxysporum* mediante amplificación y secuenciación de regiones de los genes factor de elongación y β -tubulina, seguido de pruebas de patogenicidad en plántulas de la variedad 'Tupi' y cuatro variedades Driscoll's®, que permitieron seleccionar AP para realizar estudios de susceptibilidad de variedades (SV) en los Programas de mejoramiento genético (PMG) de zarzamora, así como evaluar la inhibición *in vitro* de cuatro aislamientos de este patógeno con productos biorracionales. Los resultados indicaron que cuatro aislados fueron patogénicos en todas las variedades (de ellos se seleccionaron dos para estudios de SV), mientras que otros dos mostraron patogenicidad variable entre variedades, y los restantes fueron no patogénicos. Respecto al estudio de SV, de nueve variedades evaluadas, dos fueron susceptibles a ambos aislados, cuatro mostraron variabilidad en cuanto a severidad de síntomas entre los AP y tres fueron tolerantes. Sanosil® inhibió 100% del crecimiento micelial de los cuatro aislados; 383 y A5030 (a base de *Streptomyces* spp.) inhibieron aproximadamente el 72%; mientras que Th-L6®, Rhizobac combi®, Bioderma®, Tk-Root® y Progranic Mega®, mostraron porcentajes de inhibición entre 50% y 63% en los cuatro aislados. Estos resultados son de alto impacto tanto para el PMG como para el manejo integrado del cultivo en México.

126

EFFECTIVIDAD DE EXTRACTOS BACTERIANOS PARA EL CONTROL DE *Botrytis cinerea* EN TOMATE. [Effectiveness of bacterial extracts for the control of *Botrytis cinerea* in tomato]. ¹Marco Antonio López-Hernández, Zahaed Evangelista-Martínez y Alberto Uc-Vázquez. ¹Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. auc@ciatej.mx.

México es uno de los productores más importantes de tomate (*Solanum lycopersicum*), produciendo 3.3 millones de toneladas. El principal problema poscosecha del tomate es el moho gris (*Botrytis cinerea*), provocando pérdidas del 20-50%. El patógeno se controla aplicando ceras y fungicidas, éstos son tóxicos y representan un riesgo para el consumidor. El objetivo del trabajo fue evaluar, la efectividad de siete extractos bacterianos (*Streptomyces* spp) para el control de *Botrytis cinerea*. Un ensayo con tres repeticiones fue realizado en portaobjetos cóncavos, conteniendo PDA + extracto bacteriano y solución de 2.3×10^5 conidios/mL del hongo. Se determinó el porcentaje de germinación de conidios en los tratamientos, testigo positivo y negativo a intervalos de 2 h durante 4 días después del tratamiento (ddt). Una prueba en microplacas, se utilizó para determinar la concentración efectiva de los tres mejores extractos. La concentración resultante fue evaluada en tres ocasiones para determinar el efecto protector sobre tomate infectado experimentalmente y comparado con un fungicida comercial. Cada tratamiento consistió de 10 tomates, registrándose cada 6 h/ 7 ddt el tiempo de aparición de síntomas, presencia de micelio, número de lesiones, tamaño de la pudrición. Los resultados indican que el extracto con clave 8, inhibió 80% la germinación de los conidios 7 ddt, mientras el agroquímico inhibió hasta el 40% de conidios 3 ddt. Una concentración del 12.5% del extracto 8, es suficiente para inhibir la germinación de conidios de *B. cinerea*, además ofreció mejor protección al tomate infectado comparado con el agroquímico.

127

ETIOLOGÍA Y CONTROL QUÍMICO *in vitro* DE LA MANCHA CAFÉ EN RAMBUTÁN (*Nephelium lappaceum* L.) EN CHIAPAS, MÉXICO. [Etiology and *in vitro* chemical control of

brown spot in rambutan (*Nephelium lappaceum* L.) in Chiapas, Mexico]. Oscar Enrique Galindo Eugenio¹, Santos Gerardo Leyva-Mir¹, Patricia Rivas-Valencia², Moisés Camacho Tapia¹, Leticia Robles-Yerena³. ¹Universidad Autónoma Chapingo. ²INIFAP-CEVAMEX, ³CNRF-SENASICA. pagin03@yahoo.com.mx

En México no se tienen registros que especifiquen las enfermedades presentes en el cultivo de rambután. Por su creciente relevancia y potencial como cultivo de exportación, y de consumo nacional para la zona sureste de nuestro país, este trabajo tuvo como objetivo determinar al agente causal de la mancha oscura del fruto de manera morfológica, molecular y patogénica y proponer un control químico y biológico para el patógeno. El aislamiento se realizó a partir de frutos con manchas oscuras, y la observación de las características morfológicas, se realizó en aislados monospóricos en PDA. La extracción de ADN se realizó mediante el protocolo Dellaporta. La amplificación del ADN se realizó mediante una PCR para el oligo TEF F-R. La inoculación de los frutos se realizó *in vivo* mediante herida y disco de PDA. Los fungicidas se evaluaron con el método de alimento envenenado considerando cinco repeticiones por tratamiento. Los resultados confirman morfológica y molecularmente a *Pestalotiopsis microspora* como el agente causal de la mancha café. La prueba patogénica confirmó los síntomas iniciales. Los productos Serenade (*Bacillus subtilis* cepa QST 713), Tecto, Benlate y Tilt inhibieron el 100 % de crecimiento micelial en las concentraciones 0.01, 0.75, 2.5 y 5 ppm respectivamente. Por lo que se recomienda a Serenade y Tecto (0.01 y 0.75 ppm) como control biológico y químico, para *P. microspora* en rambután.

128

ETIOLOGÍA Y CONTROL DE LA MARCHITEZ VASCULAR DE *Euphorbia milii* Des Moul.

[Etiology and control of damping-off in *Euphorbia milii* Des Moul.]. Leticia Robles-Yerena¹, Patricia Rivas-Valencia², María Guadalupe Chávez Sánchez³, Santos Gerardo Leyva-Mir³, Moisés Camacho Tapia³, Mariana Guadalupe Sánchez-Alonso², ¹CNRF-SENASICA. ²INIFAP-CEVAMEX, ³Universidad Autónoma Chapingo. pagin03@yahoo.com.mx

En junio de 2018, en un vivero comercial de plantas ornamentales, en el municipio de Cuautla, Morelos se observaron en plantas ornamentales llamadas corona de cristo (*Euphorbia milii* Des Moul.) con síntomas de marchitez, coloración café oscura y/o rojiza en haces vasculares. Se recolectaron muestras y a partir del tejido infectado se obtuvo un aislado puro de *Fusarium* sp. el cual fue inoculado para confirmar los postulados de Koch. Este aislado fue caracterizado de acuerdo con la morfología de sus estructuras reproductivas y molecularmente fue identificado con el uso de los iniciadores ITS 4/5 en laboratorio. Se evaluaron *in vitro* tres fungicidas, Clorotalonil, Benomil y Procloraz en diferentes concentraciones para determinar su actividad inhibitoria contra el patógeno a través de la inhibición del crecimiento micelial con una concentración media efectiva (CE₅₀). Los síntomas observados, fueron reproducidos exactamente con los postulados de Koch. Se confirmó morfológicamente y molecularmente a *Fusarium oxysporum* como el agente causal de la marchitez. La prueba de control mostró que Procloraz fue el fungicida más efectivo para inhibir el crecimiento micelial de

F. oxysporum con una máxima inhibición de 100% en concentraciones de 1 y 0.5 ppm, seguido por Clorotalonil y Benomil.

129

AISLAMIENTO DE HONGOS ENDÓFITOS ASOCIADOS A *Solanum hinsianum* PARA PROMOCIÓN DE CRECIMIENTO VEGETAL Y CONTROL BIOLÓGICO. [Isolation of endophytic fungi associated to *Solanum hinsianum* for growth promotion of plants and biological control]. Eduardo Hernández-Navarro, Rufina Hernández-Martínez. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. ruhernan@cicese.mx

Solanum hinsianum es una planta nativa de zonas áridas y semiáridas de Baja California y una potencial fuente de hongos endófitos que pueden actuar como promotores de crecimiento y/o defensa contra patógenos. El objetivo del trabajo fue buscar aislados fúngicos endófitos y evaluar su capacidad de producir factores con potencial como promotores de crecimiento y para el control biológico (BCA) contra hongos fitopatógenos. Para ello, se muestrearon 47 plantas en 14 sitios en Baja California. De tejido desinfectado y sembrado en agar con antibiótico, se obtuvieron 243 aislados: 33 de hojas, 75 de tallos, 25 de pecíolos y 104 de raíces. Descartando los contaminantes comunes, 143 aislados fueron evaluados *in vitro* para la producción de ácido indolacético, quitinasas, sideróforos y para la solubilización de fósforo y potasio. Todos resultaron positivos al menos a uno de los cinco ensayos y 13 lo fueron a todos. La producción de quitinasas fue positiva en 82 aislados y alta en ocho. La solubilización de fósforo fue positiva en 138 aislados y alta en 65. La solubilización de potasio fue positiva en 67 aislados y mayor en 16. La

producción de más de un tipo de sideróforos se observó en 79 aislados y fue alta en 14. La producción de AIA fue positiva en 69 aislados y mayor en 13. En conclusión, las plantas nativas de zonas áridas y semiáridas son fuente promisoría de aislados fúngicos para el desarrollo de agricultura sustentable.

130

EFECTO DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS DE MAÍZ EN LA INCIDENCIA DE HONGOS OCRATOXIGÉNICOS EN DOS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MICHOACÁN. [Effect of the corn grain storage system on the incidence of ocratoxigenic fungi in two localities of the State of Michoacán]. Wilmer Castillo-Najar, Gerardo Vázquez-Marrufo, Virginia A. Robinson-Fuentes, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ironwil_16@hotmail.com

Aspergillus y *Penicillium* se asocian a diversos daños en el maíz, durante el almacenamiento. Por lo que el almacenamiento juega un papel importante en el control de hongos y la posible producción de micotoxinas, como la Ocratoxina A. Se compararon los sistemas de almacenamiento en dos localidades del estado de Michoacán con clima contrastante “El Zapotillo”, Municipio de Tzitzio (tropical) y Umécuaro, Municipio de Morelia (templado); en ambos, se practica la agricultura familiar. Se les proporcionó un silo metálico certificado por la FAO a cada comunidad y se comparó con la incidencia de hongos de los géneros mencionados en sus almacenes habituales. Se tomaron muestras mensuales durante los meses de febrero a junio del 2018, cuantificando la incidencia de hongos pertenecientes a los géneros *Aspergillus* y *Penicillium*. Se aislaron un total de setenta géneros fúngicos diferentes, 32 en Zapotillo (17, almacén; 15, silo) y

38 en Umécuaro (19, almacén; 19 silo); la incidencia de *Aspergillus* en Umécuaro y Zapotillo fue del 24% en los almacenes locales al inicio y disminuyó a 20% en Umécuaro y 16% en Zapotillo al final del estudio. La incidencia de especies *Penicillium* en almacenes locales fue de 14% y 16% para Umécuaro y Zapotillo, respectivamente; mientras que en silos metálicos se presentó una incidencia del 12% en Umécuaro, y en Zapotillo el promedio de incidencia se mantuvo en 16%. Los silos metálicos permiten disminuir el porcentaje de incidencia de hongos ocratoxigénicos en los granos de maíz

131

EFFECTO FUNGISTÁTICO DE BOLDO (*Peumus boldus*) EN MAÍZ ALMACENADO EN SISTEMAS ABIERTO Y HERMÉTICO. [Fungistatic effect of boldo (*Peumus boldus*) on storage systems open and hermetic].

[Fungistatic effect of boldo (*Peumus boldus*) on storage systems open and hermetic]. María Cristina Julia Pérez-Reyes, Sergio Jiménez-Ambriz, Josefina Moreno-Lara, Martha Yolanda Quezada-Viay, Gabriela Sánchez-Hernández, María del Carmen Valderrama-Bravo, Ernesto Moreno-Martínez, David Torres-Flores, Rosa Navarrete-Maya. Unidad de Investigación en Granos y Semillas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. rosa_navarrete@hotmail.com

En México las pérdidas poscosecha de maíz por hongos se han estimado de 5 a 25%, cuando las condiciones del almacenamiento son inadecuadas. Debido a esta problemática, se plantea el uso de polvo de boldo en almacenamiento hermético y abierto, dirigido a reducir el deterioro causado por los hongos y conservar la calidad sanitaria de maíz. El maíz (350g) fue almacenado 32 días en frascos abiertos y herméticos a 25 °C y 15.5% de contenido de humedad, con 1% (p/p) de polvo de boldo en un

sobre de poliéster aislado por una malla metálica en el fondo del recipiente. Se aplicó un diseño factorial 2² con cuatro repeticiones y un testigo sin boldo, y una comparación de medias Tukey (p<0.05). Se determinaron la micobiota, así como las concentraciones de O₂ y CO₂. Los resultados no mostraron diferencia significativa para *Penicillium* y *Fusarium* en los dos sistemas de almacenamiento y entre el tratamiento con Boldo y sin planta. Sin embargo, si hubo diferencia significativa para *Eurotium* en los sistemas de almacenamiento abierto y hermético, logrando disminuir el crecimiento en un 50% en el sistema abierto entre el control y el de boldo. En el almacenamiento hermético la disminución de crecimiento de *Eurotium* fue de 80-85%, comparado con el sistema abierto. El efecto fungistático tuvo mayor influencia en el sistema de almacenamiento abierto.

132

MONITOREO DE EXTRACTOS VEGETALES DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN CONTRA FITOPATÓGENOS DEL GÉNERO *Fusarium* AISLADO DE CHILE HABANERO.

Patricia Cruz-Cerino¹, Marcela Gamboa-Angulo^{1*}, Irma Leticia Medina-Baizabal¹, Jairo Cristóbal-Alejo², Germán Carnevali¹, José L. Tapia¹. ¹Unidad de Biotecnología, Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), Calle 43x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán 97205, México, ²Laboratorio de Fitopatología, Instituto Tecnológico de Conkal, Conkal (ITC), Mérida, Yucatán, 97345, México. *Autor de Correspondencia: patricia.cruz@cicy.mx

El chile habanero (*Capsicum chinense*) es atacado por patógenos que reducen su producción, entre los que se encuentran especies del género *Fusarium*. Para su control son utilizados agroquímicos con sus

concernientes efectos colaterales. Otra alternativa viable es el uso de productos naturales de plantas. En la unidad de Biotecnología del CICY, se han realizado exploraciones preliminares con extractos vegetales acuosos (EA) y etanólicos (EE) para detectar especies con potencial contra *Fusarium equiseti* y *Fusarium oxysporum* aislados de chile habanero. Inicialmente se evaluó la microdilución a $2,000 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$. Se detectó actividad antifúngica con los EE de *Mosannonna depressa* (corteza y raíz), *Parathesis cubana* (raíz), *Piper neesianum* (hoja), mientras que el EA de *Calea jamaicensis* sólo afectó a *F. equiseti* al 3%. De los EE se obtuvo tres fracciones con disolventes de polaridad ascendente (A, B y C) para obtener la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). Las fracciones B de *M. depressa* y A de *P. cubana* presentaron una CMI de $1,000 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ y una CI_{50} de $472.4 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ y $451.1 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ contra *F. oxysporum* respectivamente. Las fracciones B de *M. depressa* y *P. neesianum* mostraron una CI_{50} de $462.1 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ contra *F. equiseti*. El estándar comercial α -asarona mostró una CMI de $500 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$. El EE de la corteza de *M. depressa* tiene potencial como fungicida contra fitopatógenos de chile habanero.

133

EFFECTO INHIBITORIO DE *Aureobasidium* sp. SOBRE FITOPATÓGENOS DE IMPORTANCIA AGRÍCOLA. [Inhibitory effect of *Aureobasidium* sp. on phytopathogens of agricultural importance]. Samira Cuadros-Alavez, Nuria Gómez-Dorantes*, Sylvia P. Fernández-Pavía y Gerardo Rodríguez-Alvarado. Laboratorio de Patología Vegetal-IIAF. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. *Autor de Correspondencia: ngomez@umich.mx

El género *Aureobasidium* es un hongo dimórfico, ubicuo y se encuentra en casi cualquier ambiente

como saprobio. Tiene gran importancia biotecnológica por su capacidad de producir enzimas, sideróforos y pululano. También sintetiza compuestos volátiles con actividad antifúngica, probada con éxito sobre importantes hongos patógenos postcosecha como *Botrytis cinerea*: *Colletotrichum acutatum*, y *Penicillium* spp. El objetivo de este trabajo fue evaluar *in vitro* el efecto inhibitorio de *Aureobasidium* sp., en el crecimiento de dos hongos y un oomicete fitopatógenos. El aislado de *Aureobasidium* sp., se obtuvo en Papa-Dextrosa-Agar (PDA) a partir de restos de concreto de paredes colonizadas con micelio y esporas. Se utilizaron los fitopatógenos *Colletotrichum gloeosporioides*, *Phytophthora capsici* y *Aspergillus* sp. Se realizaron pruebas de confrontación dual en cajas Petri con el medio de cultivo PDA a 25°C durante diez días, cada tratamiento incluyó cinco réplicas y un control en donde solo se inóculo el patógeno. Cada 24 h se midieron los ejes centrales y laterales de la colonia para determinar el porcentaje de inhibición del crecimiento radial, el cual se obtuvo considerando el crecimiento del control como 100%. El porcentaje de inhibición para *Colletotrichum gloeosporioides* fue del 52-55 %, para *Phytophthora capsici* del 25-45%. y para *Aspergillus* sp. fue del 23 % al 52.5 %. Los resultados preliminares obtenidos sugieren que *Aureobasidium* sp. puede ser utilizado como agente de control biológico en enfermedades ocasionadas por hongos y oomicetes, sin embargo, es necesario realizar más estudios al respecto.

134

ETIOLOGÍA DEL TIZÓN EN HOJAS Y TALLOS EN PLANTAS DE LAVANDA EN MICHOACÁN [Etiology of leaf and stem blight on lavender plants in Michoacan]. Leydi Miguel Ferrer, Nuria Gómez-Dorantes*, Sylvia P. Fernández-Pavía y Gerardo Rodríguez-Alvarado. Laboratorio de Patología Vegetal-IIAF. Universidad Michoacana

de San Nicolás de Hidalgo. *Autor de Correspondencia: ngomez@umich.mx

La lavanda (*Lavandula officinalis*) es una planta originaria del mediterráneo que se distribuye por todo el mundo por sus propiedades terapéuticas y medicinales. Durante el 2017 y 2018 se observaron síntomas de manchas necróticas en los ápices de las hojas y tallos en plantas de lavanda en viveros y jardines en los municipios de Morelia y Tarímbaro, Michoacán. El objetivo de este trabajo fue determinar los agentes causales de los síntomas observados. Se realizaron aislamientos de las hojas y tallos con manchas, empleando medios de cultivo selectivos. Los patógenos se caracterizaron morfológicamente mediante técnicas de microscopía. Para la identificación molecular se utilizó la técnica de PCR y se amplificó la región ITS del ADNr. Las pruebas de patogenicidad se llevaron a cabo en plantas sanas en condiciones de invernadero. De las muestras con manchas necróticas se aislaron colonias de hongos con micelio septado, picnidios de color café oscuro de 62.5-130 µm x 50-87.5 µm con ostiolo muy alargado; esporas hialinas alargadas con las puntas redondeadas de 7.5-12.5 14-18 µm x 5-10 µm. Los síntomas de la enfermedad se observaron 21 días posteriores a la inoculación del patógeno. Se determinó a *Phoma* sp. como el agente causal del tizón en hojas y tallos. Este es el primer reporte de este patógeno en *Lavandula officinalis* para México.

135

EFFECTO DE LOS MEDIOS DE CULTIVO EN LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y ERGOSTEROL EN *Rhizopus stolonifer*. [Effect of the culture media in the production of biomass and ergosterol in *Rhizopus stolonifer*]. Mónica Hernández-López¹, Silvia Bautista-Baños¹, Rosa Isela

Ventura-Aguilar², Ana Guadalupe Abarca-Franco³. ¹Instituto Politécnico Nacional. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ²CONACYT-Instituto Politécnico Nacional. Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ³Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Email: mohernandezl@ipn.mx.

La utilidad del medio de cultivo es proporcionar una mezcla de nutrientes requeridos por los microorganismos para que optimicen su crecimiento. *Rhizopus stolonifer*, es causante de la enfermedad llamada pudrición blanda. Se evaluó *in vitro* la producción de biomasa (mg) y ergosterol (%) de dos cepas de *R. stolonifer* incubadas en seis medios de cultivo con diferente composición de C/N, durante 25 días a 28 °C. Previamente, se caracterizaron los medios evaluados (contenido de carbohidratos, proteínas y C/N). Los datos se analizaron a través de un diseño experimental completamente al azar y una prueba de comparación de medias de Tukey ($p \leq 0.05$). Los resultados mostraron que los extractos de Malta y Sabouraud (SAB), presentaron de 3 a 50 % más carbohidratos que los demás medios de cultivo. El medio SAB presentó de 50 a 100% mayor cantidad de proteínas, mientras que, en la relación C/N el medio mineralizado (MN) fue en el que se cuantificó el mayor valor (100.5). Respecto a la producción de biomasa, con el extracto de jugo V8, ambas cepas de *R. stolonifer* tuvieron la mayor producción (c.a 40 mg). La mayor cuantificación de ergosterol (0.00012 %) fue con el medio MN.

136

IDENTIFICACIÓN DE VOLÁTILES EN FRE-SA INOCULADA CON *Colletotrichum fragariae*. [Identification of volatiles in strawberry inoculated with *Colletotrichum fragariae*]. Rosa Isela Ventura-Aguilar¹, Jazmín Salazar-Santamaria²,

Mónica Hernández-López³, Silvia Bautista-Baños³.
¹CONACYT, ²CEPROB-IPN, ³BUAP, ³CEPROBI-
 Instituto Politécnico Nacional. riventuraag@conacyt.mx

Colletotrichum fragariae causa antracnosis en fresa y provoca hasta el 75% de pérdidas durante su comercialización. El objetivo fue identificar el perfil volátil y evaluar la severidad de la antracnosis en fresa, en dos estados de madurez. Se utilizaron fresas ‘Camino Real’, que se lavaron, desinfectaron, inocularon y almacenaron por 3 d a 21 °C. Los dos estados de madurez fueron: 100% (madurez total) y ¾ de color rojo (no maduras) en la superficie del fruto. Se evaluaron fresas sin inocular e inoculadas con *C. fragariae* (10⁵), con 3 repeticiones por cada tratamiento. Los compuestos volátiles (VOCs) se analizaron por microextracción en fase sólida (SPME, 50/30 mm DVB / CAR / PDMS) y GC-MS; mientras que, la severidad de la enfermedad a través de una escala de 5 puntos. Los resultados indicaron que la fresa madura liberó más VOCs que la de ¾ de madurez. A partir del segundo día, el número de VOCs fue mayor en la fruta inoculada que en el grupo testigo. Los VOCs identificados fueron el 1,3,5-Cicloheptatrieno y dimetil éter en el grupo testigo en madurez total y no maduras, respectivamente. En las muestras inoculadas, se identificó al ácido propanoico (fresa madura) y derivados del ácido dihidroxibenzoico (fresa no madura). La severidad de la enfermedad fue 25% mayor en fresa madura y se presentó al segundo día, mientras que, en las no maduras se observó al tercer día. Mediante la identificación de los VOCs se podría inferir sobre la presencia de *C. fragariae* en fresa.

137

ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE EXTRACTOS DE RESIDUOS AGRÍCOLAS DEL CAFÉ

CONTRA *Rhizopus stolonifer* y *Penicillium oxallicum*. [Antifungal activity of agricultural waste extracts of coffee against *Rhizopus stolonifer* and *Penicillium oxallicum*]. Mariana Pérez-García, Laura Leticia Barrera-Necha, Mónica Hernández-López. CEPROBI, Instituto Politécnico Nacional. mohernandezl@ipn.mx

Del proceso de transformación del café, 60% de la materia prima se convierte en residuos. La composición química de estos residuos incluye diversos compuestos fenólicos. En este trabajo se evaluó la capacidad antifúngica de extractos acuosos, etanólicos e hidroalcohólicos de residuos de pulpa y mucílago de café sobre el crecimiento micelial y germinación de esporas de *Rhizopus stolonifer* y *Penicillium oxallicum*. Mediante la técnica de dilución en placa se probaron los extractos a diferentes concentraciones (2.5, 5.0, 7.5 y 10 %) y un testigo (PDA). Para el crecimiento micelial se realizó un ANOVA y para la germinación se aplicó un Kruskal Wallis, en ambos casos se aplicó una comparación múltiple de Tukey (p<0.05). Los extractos con mayor efectividad fueron los etanólicos de mucílago y pulpa los cuales inhibieron hasta 100% el crecimiento micelial a concentraciones de 5 a 10% para *R. stolonifer* y de 7.5 a 10% para *P. oxallicum*. Todos los extractos disminuyeron la germinación de las esporas de *P. oxallicum* (8 h) y *R. stolonifer* (6 h), sin embargo ambos hongos germinaron al 100% a concentraciones de 2.5 %, a las 12 y 8 horas respectivamente. Los extractos etanólicos de mucílago y pulpa inhibieron la germinación en 100% en ambos hongos desde las 8 y 4 horas a concentraciones de 5 a 10%. *R. stolonifer* presentó mayor sensibilidad ante los extractos evaluados. La efectividad de los extractos etanólicos puede atribuirse a la capacidad de este disolvente para extraer mayor cantidad de compuestos fenólicos.

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL *in vitro* DE LA PUDRICIÓN ROSADA DE LA MAZORCA EN AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO.

[Identification and control *in vitro* of pink rot of the corn cob in Amecameca, State of Mexico]. Santos Gerardo Leyva-Mir¹, Moisés Camacho-Tapia², Arumi Yaravi Carretero-Montiel¹, Adolfo Flores-Rodarte¹, Leticia Robles-Yerena¹.¹Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. ²Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, Universidad Autónoma Chapingo. moises.camachotapia@gmail.com

En el cultivo de maíz se reportan fuertes daños por *Fusarium graminearum* y *Fusarium verticillioides*. Debido a ello el objetivo de esta investigación fue identificar a las especies presentes en Amecameca, así como su control *in vitro*. Los aislados se obtuvieron a partir del método de papel secante y fueron purificados por el método de cultivos monospóricos. Las pruebas de patogenicidad se realizaron con 10 aislados inoculados en elotes frescos. Se realizó la caracterización morfológica y se evaluó la sensibilidad *in vitro* con cuatro productos químicos y un agente de biocontrol. En total, se emplearon cinco fungicidas a diferentes concentraciones (Benomil a 0.1, 0.5, 1, 5 y 10 ppm), (Tia-bendazol a 0.1, 0.5, 1, 5 y 10 ppm), (Clorotalonil a 1, 5, 10 y 100 ppm), (Tiofanato de metilo a 0.1, 1, 5, 10 y 100 ppm) y (*Bacillus subtilis* QST 713 a 0.005, 0.010, 0.050 y 0.100 ppm). Como resultado, la caracterización morfológica y patogénica confirmaron que *Fusarium graminearum*, es el agente causal de la pudrición rosada en maíz. En la prueba de los fungicidas, se observó que los productos pertenecientes al grupo químico de los Benzimidazoles presentaron más del 90% de inhibición del crecimiento micelial a concentraciones de 5 ppm y

10 ppm en comparación a *Bacillus subtilis*, Clorotalonil y Tiofanato de metilo.

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DEL AGENTE CAUSAL DE LA MARCHITEZ DE JITOMATE EN MORELOS, MÉXICO. [Identification and control of the causal agent of the wilt on tomato in Morelos, Mexico]. Luis Antonio Hernández- Pedraza¹, Moisés Camacho-Tapia², Santos Gerardo Leyva-Mir¹, Leticia Robles-Yerena¹.¹Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo (UACH). ² Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, UACH. moises.camachotapia@gmail.com.

El cultivo de jitomate (*Solanum lycopersicum* L.) es uno de los más importantes a nivel mundial. Sin embargo, este es atacado por varias enfermedades que pueden causar pérdidas hasta de 100 % de la cosecha. La marchitez causada por *Fusarium oxysporum* es una de las más importantes en este aspecto. Durante el presente estudio se realizaron colectas de material con síntomas por *Fusarium* sp. en el estado de Morelos para identificar el agente causal de la marchitez en jitomate. Los aislados obtenidos de las muestras se identificaron morfológicamente y molecularmente con la región 5.8 S y Factor de elongación 1-alfa. Se realizaron pruebas *in vitro* de sensibilidad a cinco fungicidas (Benomil, Tecto, Sportak, Serenade y Fungifree) para determinar la concentración efectiva (CE 50) de cada uno de éstos. La pruebas moleculares confirmaron la presencia de *F. oxysporum* f. sp. *pisi* y *F. oxysporum* f. sp. *lycopersici*. Los fungicidas químicos Benomil y Sportak mostraron mayor control de *F. oxysporum* en jitomate, ya que a partir de 1 ppm inhibió el 100 % de crecimiento micelial. Los fungicidas biológicos Serenade y Fungifree,

inhibiben el desarrollo micelial de *F. oxysporum* a partir de 0.1 ppm, sin embargo Serenade (61.22 %) tuvo mayor porcentaje de inhibición que Fun-gifree (40 %). Benomil, Tecto y Sportak tuvieron una CE50 de 1, 10 y 1 ppm respectivamente. Los mejores fungicidas fueron Benomil y Sportak.

140

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE *Fusarium* CAUSANTES DEL TIZÓN DE LA ESPIGA EN TRIGO (*Triticum aestivum* L.), EN LA REGIÓN VALLES ALTOS DE MÉXICO.

[Identification of *Fusarium* species causals of spikels bligh of wheat (*Triticum aestivum* L.), in the Valles Altos region of Mexico]. Landy Agustín-Martínez¹, Santos Gerardo Leyva-Mir¹, Moisés Camacho-Tapia², Elizabeth García-León³, Leticia Robles-Yerena¹.¹Parasitología Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo. ²Laboratorio Nacional de Investigación y Servicio Agroalimentario y Forestal, Universidad Autónoma Chapingo. ³UIEPA, Universidad Interserrana del Estado de Puebla Ahuacatlán. moises.camachotapia@gmail.com.

La producción de trigo es de gran importancia en México; este cultivo se ve afectado por el tizón o roña de la espiga, causado principalmente por *Fusarium graminearum*. Sin embargo, se han reportado otras especies causando la misma enfermedad, es por ello que en la presente investigación se realizó un muestreo en localidades de los Valles Altos de México, con el objetivo de identificar a los aislados morfológica, patogénica y molecularmente. Para su identificación morfológica, se sembraron los aislados en medios selectivos CLA, SNA y PDA. La identificación molecular se realizó amplifican-do los genes *TEF1*, *ITS* y *RPB2*. Las pruebas de patogenicidad se realizaron en la variedad de trigo harinero de temporal Nana F2007, las evaluaciones

se llevaron a cabo con base en la escala visual para la severidad de la fusariosis de la espiga en trigo de McMullen y Stack establecida en el año 2011. Con los resultados obtenidos, se identificó morfológica y molecularmente a *Fusarium avenaceum*, *F. equiseti*, *F. sambocinum* y *F. camptoceras*. La especie de *F. camptoceras* mostró mayor porcentaje de se-veridad en la variedad Nana F2007, alcanzando el 100 % de severidad a los 14 días posteriores a la inoculación en la prueba de patogenicidad.

141

INFLUENCIA DEL ALMACENAMIENTO EN FRÍO SOBRE LA CALIDAD DE LA FRUTA DE AGUACATE VAR. HASS.

[Influence of cold storage on the quality of fruit de aguacate var. Hass]. Maribel Gutiérrez-Contreras, Carlos Velázquez-Piña, Teresita del Carmen Ávila-Val, Margarita Vargas-Sandoval, Salvador Aguirre-Paleo, Pedro Antonio García-Saucedo. Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). gutierrezcon.maribel@gmail.com

Aunque Michoacán es el mayor productor y exportador de aguacate del mundo, el estado de Morelos que ocupa el quinto lugar en superficie (1.8%), con importancia debido al beneficio social por el número de productores (1,580) beneficiados, lo cual ha impulsando la mejora de su producción e incursionar en negociaciones comerciales colectivas con perspectivas de exportación. El objetivo del trabajo fue determinar la sensibilidad al almacenamiento en frío de la fruta de aguacate proveniente Morelos y Michoacán. Se emplearon 9 tratamientos bajo un diseño completamente al azar: tiempo de refrigeración a 4.5 °C y maduración a 21°C ± 1 °C excepto dos tratamientos con maduración controlada (19 °C con 100 ppm de etileno y 90% HR); se

hizo comparación de medias Tukey ($P \geq 0.05$). Se evaluó tamaño de la fruta, incidencia y severidad de antracnosis y pudrición peduncular, así como daños físicos provocados por las bajas temperaturas. La fruta procedente del estado de Morelos en general presentó daños significativamente mayores que la de Michoacán, tanto para el caso de enfermedades como para el daño físico por frío, con excepción de la severidad de la pudrición peduncular. Tiempo mayor a 14 días, provocó mayor sensibilidad de la fruta de aguacate tanto a los daños por patógenos como daños por frío, las condiciones controladas durante la maduración (temperatura + etileno + HR), solo presentaron reducción significativa en la pudrición peduncular.

142

CONSERVACIÓN DE AGUACATE ‘HASS’ CON ATMÓSFERA MODIFICADA EN POS-COSECHA. [Conservation of avocado ‘Hass’ with modified atmosphere at postharvest]. Maribel Gutiérrez-Contreras, Emilio León Chávez-Ramírez, Ivón Rodríguez-Casillas, Teresita del Carmen Ávila Val, Margarita Vargas-Sandoval, Salvador Aguirre-Paleo, Pedro Antonio García-Saucedo. Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez”, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). gutierrezcon.maribel@gmail.com

Grandes pérdidas económicas se manifiestan por abatimiento de calidad del fruto de aguacate durante la poscosecha, cuando éste es transportado a países distantes. Principalmente por la antracnosis y *stem end rot* (SER) ocasionadas por *Colletotrichum* spp., así como la deshidratación de los frutos y daño por frío. El objetivo fue evaluar envases activos de atmósfera modificada Pac Life®, en la conservación de aguacate variedad Hass, en diferentes periodos de almacenamiento. Se utilizaron cuatro

tratamientos, bajo un diseño bifactorial condición de almacenamiento (con y sin atmósfera modificada (AM)) y tres periodos de refrigeración (20, 35 y 45 días) a 4.5 °C. Dos testigos T1 (sin bolsa) y T4 (sin bolsa y frutos inoculados con *Colletotrichum gloeosporioides*), T2 tratamiento con bolsa Pac life® y T3 con bolsa Pac life® con nano partículas de Cu (frutos inoculados). Para cada tratamiento se utilizaron 96 frutos (24 por repetición). La comparación de medias se hizo con la prueba de Tukey ($P \geq 0.05$). Las variables evaluadas fueron pérdida de peso, daño por frío e incidencia y severidad de antracnosis y SER. Se determinó que la utilización de AM, aumenta la vida de anaquel de la fruta de aguacate al disminuir significativamente (47 %) la pérdida de peso por deshidratación, los daños por frío externa (4 %) e internamente (48 %); así como la manifestación de antracnosis por *C. gloeosporioides* y pudrición del pedúnculo en su incidencia (27%) y severidad (47%).

143

IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO *Fusarium* ASOCIADAS A LAS BERRIES. [Identification of species of the genus *Fusarium* associated to berries]. Cindy Zacarias-Conejo¹, Fabiola Esquivel-Chávez², Citlali Colín-Chávez². ¹Instituto Tecnológico de Morelia. ²Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán. Email: fesquivel@cidam.org

El género *Fusarium* tiene distribución mundial, varias de sus especies son fitopatógenas e infectan una amplia gama de cultivos, incluyendo las berries: zarzamora (*Rubus fruticosus*) y arándano (*Vaccinium* spp). *Fusarium* sp. representa un problema agrícola que afecta la calidad y el rendimiento del cultivo. El objetivo fue identificar morfológica y molecularmente especies de *Fusarium* aisladas de

plantas de arándano y zarzamora provenientes de cuatro municipios de Michoacán. Los aislados se sembraron en medio de cultivo papa-dextrosa-agar e incubaron a temperatura ambiente con luz continua. Se realizaron cultivos monoconidiales (CM) a partir de cada aislado, los CM de 8-10 días de crecimiento se utilizaron para la descripción morfológica, la cual consistió en cinéticas de crecimiento, descripción de la cepa y la observación/medición de estructuras características de cada especie. Posteriormente, se realizó la identificación molecular de las cepas, se inició con la extracción de ADN por el método CTAB (bromuro de cetil trimetil amonio), para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se utilizaron los oligonucleótidos IGS e ITS4/ 5, los productos de PCR se mandaron secuenciar a MacroGen/Corea y se alinearon para construir las relaciones filogenéticas con el programa Mega X con el coeficiente de máxima verosimilitud. Los resultados de secuenciación para los marcadores mostraron que de las 25 cepas, 15 de los aislados correspondieron a *F. oxysporum*, los 10 aislados restantes correspondieron a *F. subglutinans*, *F. incarnatum* y *F. pseudograminearum*. Es importante realizar las pruebas de patogenicidad para identificar la capacidad patogénica de los aislamientos de *Fusarium* en los cultivos asociados.

144

ENVASES ACTIVOS DE ACEITE DE ORÉGANO PARA EL CONTROL *IN VITRO* DE *Colletotrichum gloesporoides* y *Colletotrichum acutatum*. [Antifungal active packaging from oregano oil to control *Colletotrichum gloesporoides* and *Colletotrichum acutatum*]. Citlali Colín Chávez, Fabiola Esquivel Chávez, Miguel Ángel Martínez-Téllez, María de los Ángeles Saavedra González. Centro de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Michoacán, A.C. & Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., ccolin@cidam.org

México es el principal productor mundial de aguacate, su producción representa más del 30% de la cosecha. El Estado de Michoacán es quien más aguacates produce principalmente para exportación. Sin embargo, el aguacate en poscosecha es susceptible al deterioro causado por hongos fitopatógenos como *C. gloesporoides* y *C. acutatum*, los cuales merman sus características organolépticas y reducen su vida en anaquel. En este proyecto se desarrolló un envase activo antifúngico en forma de almohadillas rellenas de microcápsulas de aceite de orégano-almidón-fructanos de agave y su efecto se comprobó en contra de *C. gloesporoides* y *C. acutatum* aislados de frutos de aguacate. Las microcápsulas contenían 46.60 ± 0.44 mg/g de carvacrol. El tamaño de las cápsulas fue de 180-213 nm. El efecto antifúngico del envase se evaluó mediante la medición del halo de inhibición del crecimiento de los fitopatógenos. Los tratamientos de microcápsulas evaluados fueron T0 (control absoluto), T1 (0.10 g), T2 (0.15 g), T3 (0.20 g), T4 (0.25 g) y T5 (0.50 g). El efecto de los tratamientos se evaluó a 24 °C durante 13 días en iluminación constante. Para *C. gloesporoides* todos los tratamientos con microcápsulas lograron el 100% de inhibición del crecimiento micelial. Sin embargo, para *C. acutatum*, el 100 % de inhibición se logró a partir del T2 (0.15 g).

145

FILOGENIA Y PATOGENICIDAD DE ESPECIES DE *Colletotrichum* ASOCIADAS A TIZÓN DE FLORES EN CÍTRICOS EN EL NORTE DE SINALOA. [Phylogeny and pathogenicity of *Colletotrichum* species associated with blossom blight on citrus in northern Sinaloa]. Juan

Luis Pérez-Mora¹, Arlene Mora-Romero¹, Elizabeth García-León², Nelson Bernardi Lima³, Moisés Camacho-Tapia⁴, Juan Manuel Tovar-Pedraza⁵.
¹Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Los Mochis. ²INIFAP–Valle del Fuerte³. CONICET–INTA, Argentina. ⁴Universidad Autónoma Chapingo, LANISAF. ⁵CIAD–Coordinación Culiacán. juan.tovar@ciad.mx

El tizón de flores, causado por *Colletotrichum* spp. es una enfermedad importante que afecta la producción de cítricos en México. Sin embargo, se tiene poco conocimiento sobre las especies de *Colletotrichum* que están asociadas a la enfermedad en Sinaloa. Durante febrero y marzo de 2019, se recolectaron flores de limón mexicano (*Citrus aurantifolia*), naranja (*Citrus sinensis*) y toronja (*Citrus paradisi*) con síntomas de tizón en huertos comerciales en el Norte de Sinaloa. Se obtuvieron y purificaron un total de 45 aislados de *Colletotrichum*. Se seleccionaron cinco aislados al azar para la identificación molecular usando secuencias de la región ITS y parte de los genes gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), actina (ACT) y beta-túbulina (BT). Con base en un análisis filogenético de inferencia Bayesiana de secuencias concatenadas, se identificó a *C. gloeosporioides* (3 aislados) y *C. siamense* (2 aislados). La patogenicidad de los cinco aislados se verificó mediante una inoculación de discos miceliales en frutos del hospedante de donde se obtuvo cada aislado. Todos los aislados de *Colletotrichum* spp. causaron síntomas de antracnosis 7 días después de la inoculación, y los hongos se reaislaron a partir de los frutos sintomáticos. En conclusión, *Colletotrichum gloeosporioides* se asoció con tizón de flores en toronja y naranja, mientras que *C. siamense* se asoció con tizón de flores en limón en el norte de Sinaloa.

EFFECTO DE BIOACEITES ESENCIALES EN EL CRECIMIENTO DE *Moniliophthora roreri*, CAUSANTE DE LA MONILIASIS EN EL CULTIVO DE CACAO. [Effect of essential oils on *Moniliophthora roreri* growth, plant pathogen causing of moniliasis of cocoa crop]. Feliciano López-Altamirano¹; Luciano Martínez-Bolaños¹; María Cristina Arcos-Méndez¹; Gonzalo Ortiz-Gil¹. ¹Universidad Autónoma Chapingo. URUSSE. CIAEZT. Misael Martínez-Bolaños²; Carlos Hugo Avendaño-Arrazate² ³INIFAP- México. Email: lucianomtzb@yahoo.com.mx

El cacao (*Theobroma cacao* L.) es un cultivo de importancia económica, social y cultural para México, y es la base para la elaboración del chocolate en el mundo; sin embargo, la producción del cultivo es afectada de manera significativa por la moniliasis, enfermedad causada por el hongo *Moniliophthora roreri*. El objetivo del estudio fue evaluar el efecto *in vitro* de bioaceites esenciales (AEs) de *Eucalyptus urograndis*, *Pimenta dioica*, *Origanum vulgare*, *Cinnamomum verum*, *Psidium guajava* y *Laurus nobilis* sobre *Moniliophthora roreri*. Los AEs se obtuvieron por arrastre de vapor en el equipo de Clevenger. La actividad antifúngica de los AEs se determinó por el método de difusión en agar, en donde se evaluó el crecimiento micelial del hongo. Se realizó un análisis de varianza y comparaciones de medias Tukey ($p \leq 0.05\%$). Después de 18 días de la inoculación, los AEs inhibieron el crecimiento total (100%) de *M. roreri* a dosis de 5000 $\mu\text{L}\cdot\text{L}^{-1}$, excepto *P. guajava* que inhibió el 71%; mientras que los AEs de *P. dioica*, *O. vulgare* y *C. verum* inhibieron el crecimiento total del hongo a 500 $\mu\text{L}\cdot\text{L}^{-1}$. Los resultados del presente estudio,

pueden sentar las bases para el desarrollo de un programa integral para el manejo sostenible de la moniliasis del cacao; sin embargo, son necesarios más estudios para determinar la actividad en campo de AEs y sus principales componentes.

147

SUSCEPTIBILIDAD DE *Fusarium oxysporum* f.sp. *cubense* CAUSANTE DEL MAL DE PANAMÁ EN PLÁTANO MANZANO (*Musa SP., ABB*) A ACEITES ESENCIALES. [Susceptibility of *Fusarium oxysporum* f.sp. *cubense*, causing of the Panama disease in plantain (*Musa SP., ABB*) to essentials oils]. Marisol Oltehua Vazquez¹; Luciano Martínez-Bolaños¹; Gonzalo Ortiz-Gil²; ¹Universidad Autónoma Chapingo. URUSSE. CIAEZT. Academia: Recursos Fitogenéticos. Fitosanidad Tropical. O.T. Ornamentales Tropicales. Teapa, Tabasco, México. Misael Martínez-Bolaños²; Mario Orozco-Santos²; ²INIFAP- México. Gilberto Manzo-Sánchez³. ⁴Universidad de Colima. Email: lucianomtz@yaho.com.mx

El Mal del Panamá causado por *Fusarium oxysporum* f.sp. *cubense* (FOC) es una de las enfermedades más destructivas que afectan a los plátanos y bananos en el mundo. El patógeno infecta el sistema radicular de las plantas, y posteriormente, coloniza el sistema vascular del rizoma y del pseudotallo. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de susceptibilidad de FOC a metabolitos secundarios de plantas de región sursureste de México; en ese sentido, se evaluó el efecto *in vitro* de bioaceites esenciales en el crecimiento micelial de FOC, mediante el método de difusión en agar. Se realizó análisis de varianza de los resultados y comparaciones de medias de los tratamientos (Tukey, $p \leq 0.05\%$). Después de 10 días de evaluación, el aceite esencial de *P. dioica* y *O. vulgare* inhibieron el crecimiento

total del hongo desde $500 \mu\text{L L}^{-1}$; mientras que el aceite esencial de *Eucalyptus urograndis*, *Piper auritum* y *Foeniculum vulgare* inhibieron parcialmente el crecimiento de FOC. Los resultados del presente estudio abren una perspectiva para el desarrollo de un programa de manejo integral sostenible de *Fusarium* en musáceas.

148

PRIMER REPORTE DE LA MANCHA MARRÓN DE LA HOJA DE LA MANDIOCA EN PARAGUAY [First report of brown leaf spot in cassava in Paraguay]. Marco Maidana-Ojeda¹; Marta Alicia Fernández-Gamarra¹; Guillermo Andrés Enciso-Maldonado¹; Magali Pereira-Benítez². 1 Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica de Itapúa, Paraguay; 2 Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Paraguay. gui77enciso@hotmail.com

La mancha marrón de la mandioca es una enfermedad que puede causar defoliación intensa en variedades susceptibles y hasta 30% de pérdidas de cosecha. El objetivo del trabajo fue identificar el agente causal de la mancha marrón de la mandioca en Paraguay. El patógeno fue aislado de plantaciones de mandioca de María Auxiliadora (Paraguay), a partir de hojas con síntomas de la enfermedad, posteriormente fue sembrado en medio de cultivo PDA, incubado y purificado. La superficie de la colonia era gris claro y villiforme con micelio compacto. Los conidióforos se desarrollaron por fasciculación en los estromas, que eran rectos o ligeramente curvados de coloración gris-parda, sin ramificación, cónico en el ápice donde se formaban los conidios. Los macroconidios eran de coloración marrón-grisácea, cilíndricos, rectos o ligeramente curvados, redondeado en el ápice, redondo romo u obónico en la base, con dos a nueve septos y

los microconidios eran cilíndricos y sin septos. La prueba de patogenicidad se determinó siguiendo los postulados de Koch. Los síntomas se observaron como manchas angulares y circulares de color marrón uniforme de bordes definidos y oscuros localizados en ambos lados de la hoja. En el envés, las lesiones mostraban fondo gris por la presencia de los cuerpos fructíferos del hongo. Los síntomas y observaciones de las estructuras reproductivas corresponden a *Passalora henningsii* (Allesch.).

149

PATOGENICIDAD DE *Biscogniauxia atropunctata* EN *Quercus castanea* y *Q. obtusata*. [Pathogenicity of *Biscogniauxia atropunctata* on *Quercus castanea* and *Q. obtusata*]. María Dolores Uribe-Salas¹, María Rosario Gregorio-Cipriano¹, Víctor Rocha-Ramírez², Gerardo Rodríguez-Alvarado¹, Sylvia Patricia Fernández-Pavía¹. ¹Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. ²Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM-Campus Morelia. fpavia@umich.mx

Los encinos son susceptibles a patógenos oportunistas bajo condiciones de estrés hídrico, entre los que se encuentra el hongo *Biscogniauxia atropunctata*. El bosque mixto de *Quercus* de la sierra de Santa Rosa, Guanajuato durante el 2011 estuvo sometido a estrés hídrico observándose síntomas de cancro carbonoso. A partir de árboles de *Q. rugosa* con cancro se aisló a *B. atropunctata*. El objetivo del presente estudio fue probar la patogenicidad de *B. atropunctata* en *Quercus castanea* y *Q. obtusata*, especies presentes en la sierra de Santa Rosa. Plántulas de *Q. castanea* y *Q. obtusata* de un año de edad crecidas en invernadero, previamente sometidas a estrés hídrico por dos semanas, fueron

inoculadas. Se realizó una incisión en la parte central del tallo, donde se colocó un disco de medio (avena-agar) con micelio y se envolvieron con parafilm. Las plántulas control fueron inoculadas con disco de medio estéril. Posterior a la inoculación el riego se realizó dos veces por semana. El 75-80% de las plántulas inoculadas presentaron síntomas, 25 días después de la inoculación. El experimento se monitoreó durante tres meses. Únicamente las plántulas inoculadas mostraron un deterioro progresivo en vigor hasta morir. El hongo se reisoló de *Q. castanea* y *Q. obtusata* confirmándose su patogenicidad. Esto sugiere que ambas especies de *Quercus* pueden ser infectadas por *B. atropunctata* en la sierra de Santa Rosa, Guanajuato, bajo condiciones de estrés hídrico.

150

EVALUACIÓN *in vitro* DE QUITOSANOS COMERCIALES EN EL DESARROLLO DE *Colletotrichum* sp. [In vitro evaluation of commercial chitosans in the development of *Colletotrichum* sp.] María Luisa Corona-Rangel¹, Guadalupe Patlan-Juárez², Silvia Bautista-Baños¹. ¹Instituto Politécnico Nacional-Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ²Universidad Politécnica del Estado de Morelos. mcorona@ipn.mx.

Colletotrichum es un género fúngico que incluye diversas especies, que afectan a varios cultivos agrícolas causando pérdidas económicas durante su manejo postcosecha. Una alternativa biodegradable y no tóxica para el control de esta enfermedad es el quitosano. La actividad antifúngica de este producto ha sido probada principalmente con la marca Sigma; no obstante, en México existen otras marcas que pueden constituir una opción. Se planteó entonces, evaluar la actividad antifúngica de quitosanos de las marcas Sigma, América Alimentos

y DRC, en tres aislamientos de *Colletotrichum* (papaya, aguacate y guanábana). Para evaluar la inhibición del crecimiento micelial, en una caja Petri conteniendo PDA-quitosano (0.05, 0.1, 0.5 y 1.0 %) se colocó un disco de PDA de cada cepa y se midió diariamente el crecimiento radial. En la germinación de conidios con los tratamientos previamente mencionados, se agregó agua destilada a las cajas Petri y se raspó la superficie. De la suspensión resultante se colocaron 50 µl sobre discos de PDA incubándolos durante 8 h. para observarlos al microscopio. Se observó que, los porcentajes obtenidos en la inhibición del crecimiento micelial de cada aislamiento no fueron significativamente diferentes entre los tratamientos. Sin embargo, el mayor porcentaje de inhibición lo obtuvo el aislamiento de aguacate (10.4%) con la marca Sigma al 0.1%. En la germinación conidial, solo hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos con los aislamientos de papaya y aguacate, siendo este último el más susceptible con únicamente el 2 % de germinación con Sigma al 1.0%.

151

AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE CEPAS NATIVAS DE *Trichoderma* spp. PARA EL CONTROL DEL SECAMIENTO DE LA ZARZAMORA CAUSADO POR *Fusarium oxysporum*.

[Isolation and selection of native *Trichoderma* spp. strains for the control of blackberry wilt caused by *Fusarium oxysporum*]. Erik Pérez-Ayala, Rodrigo Izquierdo-Gutiérrez, Ángel Rebollar-Alvíter, Uriel Acosta-González Universidad Autónoma Chapingo, CRUCO Morelia-Michoacán. acostagonzalezuri@gmail.com

El secamiento de la zarzamora es causado por el hongo *Fusarium oxysporum*. El objetivo de este estudio fue aislar cepas de *Trichoderma* spp. asociadas a

la rizósfera de zarzamora silvestre (*Rubus* sp.), con potencial antagonístico contra *F. oxysporum* patogénico en zarzamora. Se aislaron 35 cepas nativas de *Trichoderma* sp. de distintos sitios de Michoacán y se determinó su efecto antagonístico *in vitro*. Se seleccionaron 10 cepas en base al mayor porcentaje de inhibición, tipo de inhibición, para ser posteriormente evaluadas en invernadero mediante dos ensayos: 1) se inocularon plantas de zarzamora con cepas de *Trichoderma* spp. sin presencia del patógeno, 2) aplicaciones a la raíz antes de la inoculación con *F. oxysporum* y 2 después de la inoculación. La cepa CZ-149 (*T. ovalisporum*) *in vitro*, causó mayor porcentaje de inhibición (47%) y un antagonismo tipo 2. En el invernadero, con la cepa ESLU-ZLR (*T. harzianum*) se observó mayor altura y peso seco total de las plantas en contraste con CH-ZLR (*T. virens*). En el experimento con la inoculación del patógeno hubo diferencias significativas en severidad, mortalidad final, peso seco de parte aérea y longitud de raíz. Las cepas RCH-169 (*T. koningiopsis*), BSFP-ZLR (*T. gamspii*) y LCU-ZLR (*T. gamspii*), fueron eficaces al reducir la severidad y mortalidad de las plantas en un 50% y 60% respectivamente. En general las cepas evaluadas presentaron potencial como alternativa para el manejo de la enfermedad en campo.

152

VARIABLES DE INOCULACIÓN SOBRE LA PATOGENICIDAD DE *Aspergillus flavus* EN FRUTOS DE HIGO FRESCO.

[Inoculation variables on the pathogenicity of *Aspergillus flavus* in fresh fig fruits]. Margarita de Lorena Ramos-García*, Pablo Fernando Aparicio-García, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Nutrición; Silvia Bautista-Baños, Mónica Hernández-López, Instituto Politécnico Nacional. CEPROBI. margarita.ramosg@uaem.edu.mx

Aspergillus flavus es un hongo de importancia fitopatológica que puede infectar diversos alimentos, entre los que se encuentra el higo. Se han utilizado diferentes medios de cultivo para su aislamiento y crecimiento. El objetivo de esta investigación fue evaluar la patogenicidad de *A. flavus* proveniente de diferentes medios de cultivo sobre frutos de higo, la cepa inicial, fue donada por el CEPROBI-IPN. Se incubó *A. flavus* en cinco medios de cultivo (Czapek, Agar V8, PDA, Dextrosa Sabouraud y Agar de malta), de los cuales se realizaron dos soluciones de esporas (10^4 y 10^5). 45 frutos de higo fueron inoculados y evaluados (% infección y severidad) durante cuatro días a temperatura ambiente a 27 ± 2 ° C. Se realizó un análisis de varianza y un método de comparación de medias de Tukey, utilizando el programa estadístico INFOSTAT (v.2017). La cepa desarrollada en el medio de cultivo Czapek (10^4) fue la que generó el mayor porcentaje de infección (64%), mientras que, la cepa del medio PDA (10^4) mostró la mayor severidad (2.4). Los frutos inoculados con la cepa incubada en el medio agar V8 (10^4) tuvieron el menor porcentaje de infección (24%) y severidad (1.64). Las cepas de *A. flavus* incubadas en medios de cultivo Czapek y PDA presentan mayor patogenicidad en los frutos de higo.

153

AGENTE CAUSAL DE LA CENICILLA EN *Casimiroa edulis* (Ll & L) [Causal agent of the powdery mildew on *Casimiroa edulis* Ll & L] Roberto Carlos Contreras-Montúfar¹, Guillermo Márquez-Licon², José Juan Zamorano-Mendoza¹, Alma Rosa Solano-Báez¹. ¹Universidad Autónoma del Estado de Puebla, Decanato de Ciencias Biológicas, Ingeniería en Agronomía. ²Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. almarosa.solano@upaep.mx

El zapote blanco (*Casimiroa edulis*) pertenece a la Familia Rutaceae, es un árbol utilizado en la medicina tradicional por sus múltiples propiedades medicinales y el consumo de su fruto fresco. México tiene una producción de 8 t anuales. El objetivo de este trabajo fue caracterizar morfológicamente a la cenicilla del zapote blanco. Se realizaron colectas de tejido vegetal con signos característicos de cenicilla, en San Martín Texmelucan, Puebla, en septiembre y octubre de 2018. Se analizó el estado asexual (conidióforos, conidios, conidios germinados) y sexual (casmotecios, ascas, ascosporas y apéndices) del hongo. El micelio únicamente se observó en el haz de la hoja, con apresorios lobulados o solitarios. Los conidióforos fueron cortos con la célula basal curvada, seguida de una célula en formación y conidios primarios cilíndricos o elipsoides, cuerpos fibrosin presentes y conidios con tubos germinativos con ápice lobulado. Casmotecios dispersos de 94 µm de diámetro, con 6-7 ascas (64 x 33 µm) y 4-6 ascosporas ovoides o elipsoides por asca. En la mitad inferior del casmotecio se encontraron de 8-12 apéndices (138 x 7 µm) hialinos, aceptados, micelioides y ocasionalmente con circinas. Los análisis microscópicos de las estructuras reproductivas sugieren que se trata de *Erysiphe* sp., para corroborar el resultado se continuará con la caracterización molecular y pruebas de patogenicidad. Para nuestro conocimiento, es el primer reporte de este patógeno en zapote blanco México.

154

DIAGNÓSTICO Y CONTROL QUÍMICO *in vitro* DE *Aspergillus niger* AISLADO DEL CULTIVO DE FRESA. [Diagnosis and *in vitro* chemical control of *Aspergillus niger* isolated from strawberry crop]. Sergio Ayvar-Serna¹, Arturo Peláez-Arroyo², José Francisco Díaz-Nájera¹, Mateo Vargas-Hernández³, Antonio Mena-Bahena¹

y Adrián Juvencio-Lagunas¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 316. ³Universidad Autónoma Chapingo. pelaezarroyo_24@hotmail.com

Para los productores y comercializadores de fresa, los problemas fitosanitarios siguen después de la cosecha, causando daños al fruto en un periodo de tiempo relativamente corto y provocan importantes gastos durante la comercialización. Los objetivos de la presente investigación fueron: a) aislar e identificar la especie del hongo asociado a la pudrición de frutos de fresa en poscosecha y b) conocer la efectividad biológica *in vitro* de 10 fungicidas sobre el crecimiento micelial de *Aspergillus niger*. Se recolectaron muestras de frutos dañados, se aisló, purificó e identificó al agente causal con base en las características morfológicas y reproductivas del hongo. El efecto de los fungicidas se evaluó considerando el crecimiento micelial del hongo. El estudio se realizó bajo un diseño experimental completamente al azar con 3 repeticiones; la unidad experimental fue una caja Petri con 20 mL de PDA + fungicida + hongo. Se midió el diámetro de las colonias y se determinó el porcentaje de inhibición micelial respecto al testigo. Estas variables se sometieron al ANOVA y a la comparación de medias de Tukey (P=0.05). Se identificó al hongo *Aspergillus niger* como agente causal de la pudrición de frutos en poscosecha. Los ingredientes activos Carbendazim, Oxicloruro de cobre, Iprodiona, Tiofanato metílico, Fosetil Aluminio, Mancozeb, Benomilo, y Tiabendazol, inhibieron el crecimiento de *A. niger* a dosis baja en un 100%.

155

IDENTIFICACIÓN Y PATOGENICIDAD DEL AGENTE CAUSAL DE LA MUERTE

DESCENDENTE DE RAMAS EN ÁRBOLES FRUTALES EN CUAUTLA MORELOS, MÉXICO. [Identification and pathogenicity of the causal agent of death descending order of branches in fruit trees in Cuautla Morelos, México]. Araceli Escobar-Niño^{1*}, Dagoberto Guillen-Sánchez¹, Daniel Bárcenas-Santana¹. ¹UAEM -Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc. escobararaceli@outlook.com

La presente investigación realizó durante los ciclos primavera-verano 2018, se colectó tejido del tallo de ramas de mango Tommy con síntomas de muerte descendente en una plantación de la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc, misma donde se realizó la investigación. El objetivo de este estudio fue determinar al agente causal y la patogenicidad de la muerte descendente de los frutales en Cuautla, Morelos. Se realizó siembra directa de tejido del avance de la enfermedad en medio PDA. A los tres días se observó crecimiento micelial color grisáceo a negro que se identificó morfológicamente como *Neofusicocum* spp. Para las pruebas de patogenicidad se realizó un corte a la corteza de los frutales: limón persa, mango variedad Tommy, papaya var. Maradol, higo, aguacate Hass y la planta ornamental *Ficus benjamina*, provenientes de un vivero certificado, se les colocó un disco de PDA+ la cepa del hongo de ocho días de crecimiento se cubrió con algodón y Parafilm M PM 996, se humedeció cada ocho días con agua destilada esterilizada. A los 28 días se evaluó tomando en cuenta presencia o ausencia y el avance de la infección con un vernier digital a partir de la zona de inoculación. La identificación molecular se llevó a cabo con los marcadores ITS, EF 1- α y β -tubulina. La secuencia obtenida se comparó con la base de datos del NCBI, se alineó con la cepa de *N. batangarum* de EE. UU., Italia y Brasil.

ACTIVIDAD ANTAGÓNICA *IN VITRO* DE AISLADOS DE *Trichoderma harzianum* Y *T. viride* CONTRA PATÓGENOS EN EL CULTIVO DE TRIGO. [*In vitro* antagonistic activity of *Trichoderma harzianum* and *T. viride* isolates against pathogens in wheat culture]. Nelly Y. Almanza-Sánchez, Zayra Licea-González y María Elena Márquez-Gutiérrez. Tecnologías Naturales Internacional S.A de C.V. licea@bactiva.com

Trichoderma es un hongo de gran importancia agrícola, debido a la capacidad de controlar microorganismos fitopatógenos, promover el crecimiento vegetal e inducir los mecanismos de defensa en las plantas. En el presente trabajo se demostró la actividad biológica de *Trichoderma viride* y *T. harzianum* contra *Fusarium* spp., *Alternaria* spp., *Acremonium* spp. procedentes de suelo y raíz del cultivo de trigo en la localidad de Jaral del Progreso, Estado de Guanajuato. El antagonismo se evaluó por el método de cultivo dual considerando la competencia por el sustrato, micoparasitismo y la antibiosis. Se calculó el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR) a las 240 horas. De acuerdo a la escala de Bell, se ubicaron en grado 1 y 2 por competencia de sustrato, lo que indicó una alta velocidad de crecimiento en las placas con medio papa dextrosa agar (PDA). Ambos aislados mostraron acción antagónica con valores por encima del 50% de inhibición del crecimiento; sin embargo, hubo mayor sensibilidad frente al aislado de *T. viride*. Las observaciones microscópicas de los fragmentos de micelios de la zona de contacto hifal, entre los aislados de *Trichoderma* y los patógenos, mostraron diferentes tipos de interacción como + enrollamiento y penetración. Por tanto, se demostró la presencia de estos mecanismos de acción involucrados en el efecto de biocontrol. Estos

resultados son la base para la inoculación de cepas *Trichoderma* como alternativa amigable con el ambiente en el cultivo de trigo.

ÁCAROS MICÓFAGOS EN EL CONTROL DE *Colletotrichum gloeosporioides* EN EL CULTIVO DE PAPAYA (*Carica papaya* L.). [Mycophagous mites in the control of *Colletotrichum gloeosporioides* in the papaya crop (*Carica papaya* L.)]. Víctor Jesús Albores-Flores*; Felipe de Jesús Jiménez-Leaño; María de Lourdes Adriano-Anaya, Gamaliel Velázquez-Ovalle y Miguel Salvador-Figueroa. Instituto de Biociencias, Universidad Autónoma de Chiapas. alboresflores@gmail.com

Actualmente el uso de ácaros micófagos presenta potencial en evaluaciones a nivel de laboratorio. El objetivo del presente trabajo fue determinar la eficiencia de ácaros micófagos en el control de *C. gloeosporioides* en el cultivo de papaya (*Carica papaya* L.). La producción de los ácaros se realizó inoculando 5 hembras y 5 machos en una colonia de hongo (cepario del IBC) previamente crecida en PDA a pH 6.5 a 32 °C en el laboratorio de agricultura sustentable del Instituto de Biociencias (IBC) de la UNACH, para que comieran y se reprodujeran por un lapso de 14 días a temperatura ambiente. Se establecieron tres parcelas de 15 plantas cada una, separadas por una parcela de banano. Los tratamientos fueron, 1) Testigo (con clorotalonil), 2) densidad de 100 ácaros por planta y 3) 200 ácaros por planta, cada parcela con su repetición y la inoculación de los ácaros fue semanal a cada planta. En los primeros dos meses, se encontró una pérdida de la densidad poblacional de ácaros de un 54% en el tratamiento 2 y de 38% en el tratamiento 3. La incidencia de la enfermedad en frutos de forma

natural en los primeros dos meses fue del 80% en los tratamientos con ácaros, se redujo en el tercer mes a un 60% y se mantuvo así hasta el término del estudio. En el testigo la incidencia fue de 50% de forma natural.

158

AISLAMIENTO Y SELECCIÓN DE CEPAS NATIVAS DE *Trichoderma* spp. PARA EL CONTROL DEL SECAMIENTO DE LA ZARZAMORA CAUSADO POR *Fusarium oxysporum*. [Isolation and selección of native *Trichoderma* spp. strains for the control of *Fusarium* wilt of blackberry caused by *Fusarium oxysporum*] Erik Pérez-Ayala, Rodrigo Izquierdo-Gutiérrez, Ángel Rebollar-Alvíter, Uriel Acosta-González Universidad Autónoma Chapingo, CRUCO Morelia-Michoacán. acostagonzalezuri@gmail.com

El secamiento de la zarzamora es causado por el hongo *Fusarium oxysporum*. El objetivo de este estudio fue aislar cepas de *Trichoderma* spp. asociadas a la rizósfera de zarzamora silvestre (*Rubus* sp.), con potencial antagonico contra *F. oxysporum* patogénico en zarzamora. Se aislaron 35 cepas nativas de *Trichoderma* sp. de distintos sitios de Michoacán y se determinó su efecto antagonico *in vitro*. Se seleccionaron 10 cepas en base al mayor % de inhibición, tipo de inhibición, para ser posteriormente evaluadas en invernadero mediante dos ensayos: 1) se inocularon plantas de zarzamora con cepas de *Trichoderma* spp. sin presencia del patógeno, 2) aplicaciones a la raíz antes de la inoculación con *F. oxysporum* y 2 después de la inoculación. *In vitro* la cepa CZ-149 (*T. ovalisporum*) resultó en mayor porcentaje de inhibición (47%) y un antagonismo tipo 2. En el invernadero, la cepa ESLU-ZLR (*T. harzianum*) resultó en mayor altura y peso seco total de las plantas en contraste con

CH-ZLR (*T. virens*). En el experimento con la inoculación del patógeno hubo diferencias significativas en severidad, mortalidad final, peso seco de parte aérea y longitud de raíz. Las cepas RCH-169 (*T. koningiopsis*), BSFP-ZLR (*T. gamspii*) y LCU-ZLR (*T. gamspii*), fueron eficaces al reducir la severidad y mortalidad de las plantas en un 50% y 60% respectivamente. En general las cepas evaluadas presentaron potencial aceptable como alternativa para el manejo de la enfermedad en campo.

159

ORGANISMOS FUNGOSOS ASOCIADOS A LA COSTRA NEGRA EN CLADODIOS DE *Opuntia* sp. [Fungal organisms associated with the black scab in cladodes of *Opuntia* sp.]. Bruno Laureano-Ahuelicán², Magnolia Moreno-Velázquez^{*1}, Andrés Quezada-Salinas¹, Lervin Hernández-Ramos¹, José Abel López-Buenfil¹, Dionicio Alvarado Rosales², Esther Martínez-Domínguez³, Luz de Lourdes Saavedra Romero². ¹ Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria del SENASICA, ² Instituto de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, ³ Integración de Servicios y Negocios Globalizados S.C.

Cladodios de nopal, provenientes de la localidad de Santa Cecilia Clavijero, en el Municipio de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, presentaron sintomatología consistente en pequeñas lesiones inicialmente de color café claro que coalescen con el tiempo y adquieren apariencia hundida y posteriormente costrosa de color negro la cual finalmente se desprende del tejido vegetal. El objetivo del trabajo fue determinar los organismos asociados a la sintomatología observada. Se obtuvieron fragmentos de tejido vegetal de aproximadamente 1 cm², de la zona límite entre el tejido sano y el enfermo, mismos que fueron desinfectados con hipoclorito de sodio al 1%

durante 1 minuto, enjuagados en dos ocasiones con agua destilada estéril y secados previo a su siembra sobre papel secante (cámara húmeda) y en medio de cultivo PDA, para incubarse a $25 \pm 3^\circ\text{C}$ durante cinco días. Del crecimiento fungoso desarrollado a partir del cultivo vegetal se obtuvo el aislamiento,

identificación morfométrica y corroboración molecular de *Cladosporium cladosporioides*, *Aplosporella hesperidica* y *Didymella glomerata*, cuyas pruebas de patogenicidad se encuentran en proceso a fin de determinar su carácter patogénico.

6.2. Bacterias

160

EFFECTO DE LA RIZOBACTERIA *Azospirillum brasilense* SP245 SOBRE LA RESPUESTA DE DEFENSA EN PLÁNTULAS DE TRIGO.

[Effect of the rhizobacteria *Azospirillum brasilense* Sp245 on the plant defense response in wheat seedlings]. Ernesto García Pineda, Elda Castro Mercado, Juan Pablo González Medina. Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). egpineda@umich.mx

Azospirillum brasilense es una rizobacteria benéfica que estimula el crecimiento de las plantas. El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de esta rizobacteria sobre la estimulación de la respuesta de defensa en plántulas de trigo. 10 semillas de trigo de la variedad NANA, donadas por el INIFAP-Celaya, se germinaron durante 4 días y se inocularon *in vitro* con dos concentraciones de *A. brasilense* (1×10^6 y 3×10^6 unidades formadoras de colonias/ml). Los experimentos se realizaron por triplicado, con al menos dos repeticiones. Los resultados se reportaron como media \pm desviación estándar. Como control se utilizaron semillas germinadas sin inocular. Después de 24 h de la inoculación se analizaron extractos de hoja y de raíz por Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). En los extractos se identificó al compuesto 6-metoxi-2-benzoxazolinona (MBOA; 6-Methoxy-2-benzoxazolinone), un metabolito con propiedades antimicrobianas. Cuando se analizó la acumulación de este compuesto, por cromatografía en placa fina (TLC), se observó que se acumuló en mayor cantidad en la hoja 24 h después de la inoculación. El análisis por TLC también demostró que cualitativamente su acumulación en los dos

tejidos, raíz y hoja, fue dependiente de la concentración del inoculo. El compuesto puro no mostró una inhibición significativa sobre el crecimiento *in vitro* de *A. brasilense*. Estos resultados preliminares sugieren que la rizobacteria estimula la producción de compuestos de defensa en la raíz y en la hoja de plántulas de trigo.

161

VARIABILIDAD MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE DIFERENTES CEPAS DE *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, AISLADAS DE CULTIVOS DE TOMATE (*Solanum lycopersicum* L.) EN SINALOA.

[Morphological and molecular variability of different strains of *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* isolated of tomato crops (*Solanum lycopersicum* L.) in Sinaloa]. Isidro Márquez-Zequera^{1,2}, Raymundo S. García-Estrada¹, Idalia Verdugo-Enríquez², José A. Garzón-Tiznado², Isabel Cruz-Lachica¹ y Luis Osuna-García¹. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C.¹. Universidad Autónoma de Sinaloa². zequera@ciad.mx.

México es el décimo productor de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) a nivel mundial; Sinaloa es el principal estado productor. Dentro de las principales limitantes del cultivo, se encuentra el cáncer bacteriano ocasionado por *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (Cmm). El objetivo del estudio fue determinar la variabilidad fenotípica y genotípica de cepas de Cmm aisladas de tomate en Sinaloa, con la finalidad de generar información que permita llevar a cabo un mejor manejo de la enfermedad. Se realizó el aislamiento e identificación rápida con inmunotiras. La identificación molecular de 27 cepas aisladas se realizó por PCR con los primers Cm3/Cm4 y posterior amplificación y secuenciación del gen 16S rADN. Se determinó el

potencial patogénico a nivel molecular por medio de la amplificación de los genes *tomA*, *Chpc*, *ppaA*, *celA* y *pat-1*. Las pruebas de patogenicidad y virulencia se realizaron con cada una de las cepas aisladas por infiltración de 10 µL de una suspensión 9×10^8 UFC en una yema axilar ubicada en la parte media de la planta. Los resultados indican que todas las cepas tienen la capacidad de causar la enfermedad; sin embargo, existe variabilidad en cuanto a la virulencia presentada; en ese sentido, se observó que las cepas 84 y 98 fueron significativamente menos agresivas que el resto posiblemente por la ausencia del gen *pat-1*.

162

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA DE AMPLIO ESPECTRO POR *Paenibacillus polymyxa* NMA1017; UNA CEPA CON POTENCIAL DE BIOCONTROL. [Broad spectrum antimicrobial activity by *Paenibacillus polymyxa* NMA1017; a strain with biocontrol potential]. Belén Chávez-Ramírez, Mari Carmen Acoltzi-Conde, Jennifer Chris Kerber-Díaz, José Antonio Ibarra-García, María Soledad Vásquez-Murrieta, Paulina Estrada-de los Santos. Instituto Politécnico Nacional-Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. belcha06@yahoo.com.mx

En la actualidad, es necesario aumentar la producción agrícola y control de enfermedades utilizando técnicas de agricultura sustentable. Estas pueden incluir el uso de los microorganismos como biofertilizantes o agentes de biocontrol con el fin de obtener altos rendimientos. El objetivo de este trabajo fue encontrar microorganismos antagónicos como una alternativa biológica a los fungicidas utilizados para enfermedades radiculares. Se utilizaron los hongos de suelo *Rhizoctonia solani* RhCh-14, *Fusarium* sp. FuFr-14 y *Pythium ultimum* PyFr-

14, aislados de la podredumbre de la raíz. Diferentes aislados bacterianos de suelo se caracterizaron en términos de actividad antimicrobiana y como promotores del crecimiento vegetal (PGPB), para proponer un agente biocontrol-biofertilizante. De acuerdo a los resultados *in vitro*, una cepa inhibió estos hongos y fue identificada mediante la secuenciación del gen 16Srrs y posteriormente la secuenciación del genoma como *Paenibacillus polymyxa* (designada NMA1017). Microscópicamente, afectó la estabilidad morfológica de las hifas y se observó su capacidad de micro-parasitizar, presentó características de organismo inocuo y promotor de crecimiento. Se realizaron pruebas de biocontrol *in vivo* utilizando plantas de frijol, con una n=10 por tratamiento (patógeno, bacteria, patógeno + bacteria y controles) donde se logró la inhibición de los patógenos, pues no se presentaron síntomas de ahogamiento y pudrición radicular, corroborado en microscopía de cortes transversales, la determinación de peso seco mostró diferencia significativa entre los tratamientos. Pruebas que permiten proponer esta cepa bacteriana, como un potencial agente de biocontrol de amplio espectro.

163

EFFECTO DEL ÁCIDO OLEICO Y QUITOSANO SOBRE EL DESARROLLO *IN VITRO* DE *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*. [Effect of oleic acid and chitosan formulations on the development *in vitro* of *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*]. Susan Alexa Castañón-Viveros, Cindy Salas-Marcial, Margarita de Lorena Ramos-García* Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Facultad de Nutrición.; Jesús Hernández-Romano Universidad Politécnica del Estado de Morelos; Dagoberto Guillen-Sánchez. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc. ale.cv94@outlook.com

Clavibacter michiganensis subsp. *michiganensis*, causa pérdidas económicas significativas en el cultivo de solanáceas, debido a que al infectarse, el cultivo debe ser desechado. El objetivo de este estudio fue evaluar formulaciones de ácido oleico y quitosano sobre el desarrollo *in vitro* de *C. michiganensis* subsp. *michiganensis*. La bacteria se aisló en medio NBY. Se elaboraron formulaciones acuosas de ácido oleico (1, 2 y 3%) y quitosano al 1%. Las técnicas utilizadas para evaluar el efecto bactericida de las formulaciones fueron pozos, antibiograma disco-placa y envenenamiento del medio, en este último caso, previo y posterior a la incubación de la bacteria. Se evaluó el crecimiento (cm) y peso (g) de la bacteria. La temperatura de incubación fue de 28° C durante 8 días. Los resultados mostraron que en la técnica de envenenamiento del medio, previo a la siembra del microorganismo, la solución de ácido oleico al 3% y quitosano 1%, controló el crecimiento de *C. michiganensis* (0.02g) al compararlo con el control (0.35 g). El ácido oleico y quitosano al aplicarlo de manera preventiva, disminuyeron el crecimiento de *C. michiganensis* subsp. *michiganensis in vitro*.

164

EVALUACIÓN DE EXTRACTOS VEGETALES PARA LA PROTECCIÓN DE BACTERIÓFAGOS A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA. [Evaluation of plant extracts for the protection of bacteriophages to ultraviolet radiation]. Felipe Alexis Avalos-Salgado, Evangelina E. Quiñones-Aguilar, Cecilia Guízar-González, Alejandro Solís-Sánchez, Jhony Navat Enríquez-Vara, Gabriel Rincón-Enríquez*. Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ. *grincon@ciatej.mx.

La aparición de bacterias multi-resistentes en el área agrícola, médico-farmacéutico y veterina-

ria han impulsado el desarrollo de nuevas formas de control de sus correspondientes enfermedades. De la mano con el impulso de innovar en tecnologías verdes para evitar dañar el medio ambiente, resurge la tecnología de bacteriófagos (fagos), virus depredadores de bacterias, como herramientas de biocontrol, una limitante del uso de fagos es su sensibilidad a la de radiación ultravioleta (UV). El objetivo de este trabajo fue evaluar compuestos fotoprotectores a UV en las partículas virales. Se realizó un experimento completamente al azar con cinco tratamientos con cuatro repeticiones. Los tratamientos fueron 4 extractos de *Thymus vulgaris* con los solventes hexano, acetona, metanol y metanol-HCl y uno sin extracto. En una placa se colocaron 2.5 mL de extracto vegetal (500 µg mL⁻¹) y bacteriófagos (10¹⁰ virus mL⁻¹). Posteriormente esta placa fue expuesta a luz UV (λ=254 nm) y se tomaron muestras a 0, 30, 60 y 90 min. Se cuantificó la concentración viral a los distintos tiempos en unidades formadoras de placa (UFP). Los resultados mostraron que los extractos de acetona y hexano proveen protección de las partículas virales a los 90 min (10⁸ UFP/mL, Tukey, P≤0.05), respecto al bacteriófago sin protección (10⁵ UFP/mL). Esto sugiere que estos extractos contienen compuestos fotoprotectores para emplearse con bacteriófagos a nivel de campo. Esta biotecnología pueden ser una opción para el empleo en el biocontrol de bacterias fitopatógenas.

165

AISLAMIENTO DE PROTEÍNAS DE *Xanthomonas vesicatoria* PARA USARLAS COMO INDUCTORES DE RESISTENCIA EN *Solanum lycopersicum*. [Isolation of proteins of *Xanthomonas vesicatoria* for use as inducers of resistance in *Solanum lycopersicum*]. Sergio David Valerio-Landa¹, Evangelina Esmeralda Quiñones-Aguilar¹,

Jhony Navat Enríquez-Vara¹, Rodolfo Hernández-Gutiérrez¹, Luis Guillermo Hernández-Montiel², Gabriel Rincón-Enríquez^{1*}. ¹Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ; ²CIBNOR *grincon@ciatej.mx.

En México la mancha bacteriana del tomate (MBT) causada por *Xanthomonas vesicatoria* es una enfermedad importante. La capacidad inherente de plantas para percibir moléculas conservadas entre microorganismos e inducir un estado de resistencia (IER) que les confiere protección contra patógenos ha surgido como alternativa de control al uso convencional de bactericidas de cobre y antibióticos. El objetivo de este estudio fue obtener proteínas de *X. vesicatoria* (cepa BV801) y evaluar su capacidad para IER en *Solanum lycopersicum* contra la MBT. Se obtuvo un extracto de proteínas de la cepa bacteriana BV801, cuyo perfil por SDS-PAGE mostró 35 bandas. Un experimento completamente al azar con siete tratamientos (seis soluciones de proteínas: 100, 10, 1, 0.1, 0.01 y 0.001 µg/mL; y un testigo sin proteínas) fue realizado con 10 repeticiones por tratamiento bajo condiciones semi *in vitro*. La inducción de resistencia en planta se realizó 36 horas antes del reto con la bacteria fitopatógena BV801. Plantas tratadas con las concentraciones de 10, 1 y 0.1 µg de proteína/mL redujeron significativamente (Tukey, $P \leq 0.05$) el índice de daño en un 55, 50 y 50% respectivamente, en relación a plantas sin tratar con proteínas dos semanas después del reto con el patógeno. Ensayos *in vitro* de inhibición del crecimiento bacteriano mostraron la usencia compuestos con actividad antibacteriana presente en el extracto de proteína, por lo que se hipotetiza que mecanismos de inmunidad inducidos en jitomate pudieron estar involucrados en el control del patógeno.

166

OBTENCIÓN DE PROTEÍNAS DIFERENCIALES DE *Pseudomonas syringae* Y *Xanthomonas* spp. POR INDUCCIÓN EN MEDIO DE CRECIMIENTO CON EXTRACTOS VEGETALES.

[Obtaining differential proteins from *Pseudomonas syringae* and *Xanthomonas* spp. by induction in growth medium with vegetable extracts]. Sergio David Valerio-Landa¹, Evangelina Esmeralda Quiñones-Aguilar¹, Jhony Navat Enríquez-Vara¹, Rodolfo Hernández-Gutiérrez¹, Luis Guillermo Hernández-Montiel², Gabriel Rincón-Enríquez^{1*}. ¹Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ; ²CIBNOR *grincon@ciatej.mx.

Durante la interacción entre plantas y fitopatógenos, patrones de moléculas asociadas a patógenos (PMAPs) son percibidos por receptores de membrana del sistema de inmunidad de plantas, tras su percepción, inicia una respuesta inmune que brinda resistencia contra patógenos no adaptados. Por su parte, patógenos adaptados producen efectores de virulencia (EV) con lo cual evaden el sistema de inmunidad de plantas y establecen una infección. El objetivo de este trabajo fue determinar las proteínas expresadas diferencialmente (PED) por *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (cepa DC3000) y *Xanthomonas* spp. (cepa BV801) durante su crecimiento en medios suplementados con un extracto vegetal de un hospedero compatible (*Solanum lycopersicum*, para ambas bacterias) e incompatible (*Capsicum annum*, únicamente para DC3000). Las bacterias crecieron en medio sólido rico KB (DC3000) y NYGA (BV801), medio sólido suplementado con cada extracto vegetal (0.2%) y agar (1.5%); y medio sólido mínimo dextrosa (0.2%) y agar (1.5%). Los tapetes bacterianos se cosecharon a las 36 h. El

perfil de proteínas (PP) se visualizó mediante SDS-PAGE. Los resultados mostraron PED para ambas bacterias entre los dos medios suplementados con extracto vegetal. Particularmente el PP de DC3000 obtenido con un hospedero incompatible mostró la sobrerregulación de proteínas específicas. Los resultados de este trabajo contribuirán a elucidar la participación de PMAPs y/o EV en las vías de inmunidad de plantas solanáceas contra patógenos bacterianos.

167

HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES EN EL BIOCONTROL DE LA MANCHA BACTERIANA (*Xanthomonas vesicatoria*) EN EL CULTIVO DE CHILE TIPO PASILLA EN INVERNADERO. [Arbuscular mycorrhizal fungi in the biocontrol of the bacterial spot (*Xanthomonas vesicatoria*) in the “pasilla” pepper at greenhouse]. Susana Bautista-Villegas^{1,2}, Nuria Gómez-Dorantes², Philippe Lobit², Gabriel Rincón-Enríquez¹, Jonhy Enríquez-Vara¹, Cecilia Guízar-González¹, Luis Pérez-López^{2*}, Evangelina E. Quiñones-Aguilar^{1*}. ¹Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ; ²IIAF-UMSNH. *lexquilax@yahoo.com.mx, *equinones@ciatej.mx.

La mancha bacteriana (*X. vesicatoria*) es una enfermedad devastadora que afecta al cultivo del chile tipo pasilla. En la búsqueda de alternativas de control sustentables, se evaluó el efecto de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) contra *X. vesicatoria* en plantas de chile “pasilla” en invernadero; se realizó un experimento completamente al azar bifactorial (4 niveles de HMA: *Rizophagus intraradices*, *Funneliformis mosseae*, consorcio, sin HMA. 2 niveles de bacteria: con y sin), con 8 tratamientos 10 repeticiones. A los 38 días de la micorrización, se inocularon 2 mL de *X. vesicatoria* (10⁷

UFC/mL); 22 días después de esta inoculación, se midió altura de planta, diámetro de tallo, número de hojas, biomasa seca de follaje y raíz, área foliar, porcentaje de colonización (PCM), densidad de esporas, defoliación, manchas foliares, hojas con manchas y área foliar enferma por la mancha bacteriana. Los datos obtenidos se analizaron mediante un análisis de varianza y prueba Tukey ($P \leq 0.05$). Se encontró un 33% del PCM, *R. intraradices* mostró mayor número de hojas y una disminución de la defoliación de las plantas (Tukey, $P \leq 0.05$), mientras que con el consorcio de HMA las plantas presentaron menor número de manchas foliares (21) en comparación a plantas no micorrizadas (32 manchas, Tukey, $P \leq 0.05$). Los resultados muestran que los HMA pueden promover el crecimiento vegetal y bioproteger de enfermedades bacterianas en plantas de chile.

168

INTERACCIÓN DEL BACTERIÓFAGO Φ XaF-18 CON LA BACTERIA FITOPATÓGENA *Xanthomonas vesicatoria* EN CONDICIONES *in vitro*. [Interaction of the bacteriophage XaF-18 with the phytopathogenic bacterium *Xanthomonas vesicatoria* under *in vitro* conditions]. Marcela Ríos-Sandoval, Gabriel Rincón-Enríquez, Alejandro Solís-Sánchez, Evangelina E. Quiñones-Aguilar*. CIATEJ. *equinones@ciatej.mx

Los bacteriófagos, son virus que infectan a las bacterias, el bacteriófago Φ XaF-18 infecta a *X. vesicatoria*, bacteria causante de la mancha bacteriana en tomate y chile. El uso de bacteriófagos para el control de enfermedades bacterianas es una estrategia que genera gran interés. Una de las características más importantes a tomar en cuenta para su uso como agente de control biológico es que sean líticos (lisen a su hospedero). Además de determinar

las características particulares del ciclo replicativo de cada fago con el fin de optimizar su uso para el control biológico. El objetivo del presente trabajo fue determinar la interacción del bacteriófago con su bacteria huésped mediante curva de crecimiento bacteriano. Para lo cual, se realizó la propagación y purificación del bacteriófago ΦXaF-18. Se determinó la multiplicidad de infección (MOI) adecuada para la fase exponencial del bacteriófago y por último se realizó una curva de crecimiento de la bacteria y del bacteriófago*bacteria para determinar el efecto del bacteriófago sobre el crecimiento bacteriano, se inoculó con 6.5×10^7 UFC/mL de bacteria para ambas curvas y el bacteriófago se inoculó a MOI de 1 en la fase media exponencial. El bacteriófago presentó un efecto negativo sobre el crecimiento de *X. vesicatoria*, teniendo la bacteria sola un crecimiento de 1.2×10^9 UFC/mL las 14 h después de iniciado el crecimiento y la bacteria en interacción con el bacteriófago no creció, lo cual sugiere una actividad lítica estricta del fago ΦXaF-18 hacia su huésped bacteriano.

169

EXTRACTOS DE HOJAS DE GUANÁBANA INOCULADA CON HONGOS MICORRÍZICOS ARBUSCULARES CONTRA BACTERIAS FITOPATOGÉNAS. [Soursop tree extracts inoculated with arbuscular mycorrhizal fungi against phytopathogen bacteria]. Michelle González-López, Evangelina Quiñones-Aguilar, Cecilia Guízar-González, Jhony Enríquez-Vara, Gabriel Rincón-Enríquez*. Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ. *grincon@ciatej.mx.

Los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) establecen simbiosis con plantas, provocando cambios en la producción de metabolitos secundarios. Al aumentar los compuestos, estos podrían

utilizarse en el control de fitopatógenos. El objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad bactericida de extractos de guanábana colonizadas por HMA contra bacterias fitopatógenas (*Dickeya dadantii*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola* y *Erwinia amylovora*). Se colectaron hojas de árboles de 3 años de edad cultivados en un huerto en Nayarit, México. Los árboles estaban colonizados por consorcios nativos de HMA, los cuales presentaban especies pertenecientes a los géneros *Acaulospora*, *Scutellospora*, *Rhizophagus* y *Funneliformis*. Los extractos se elaboraron a partir de 1 g de hojas liofilizadas y molidas. Los solventes empleados fueron metanol, etanol, acetona y hexano y se disolvieron en Dimetilsulfóxido (DMSO) al 100% para ajustarlos a una concentración de 1000 mg mL⁻¹. Los bioensayos se realizaron mediante la técnica de agar de doble placa. Como controles se utilizó neomicina (1 mg mL⁻¹) y DMSO 100 %. Las placas se incubaron 48 h a una temperatura de 30 °C. La variable analizada fue el diámetro del halo de inhibición. No se observó inhibición bacteriana en ninguno de los extractos evaluados (Tukey, P≤0.05). Las cuatro especies bacterianas evaluadas presentaron halos de inhibición para el tratamiento con neomicina. Se concluye que *D. dadantii*, *P. aeruginosa*, *P. syringae* pv. *phaseolicola* y *E. amylovora* no son sensibles a extractos de hojas de guanábana provenientes de árboles micorrizados.

170

DETECCIÓN DE *Xylella fastidiosa* EN CICADELIDOS ASOCIADOS AL CULTIVO DE VID (*Vitis vinifera* L.). [Detection of *Xylella fastidiosa* in Cicadellidae associated to grapevine (*Vitis vinifera* L.)]. Bárbara Hernández-Macías, Sandra L. Moya-Hernández, Lidia Guadarrama-Valencia, Román Martínez- Rosas y Andrés Aguilar-Granados.

Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. barbara.hernandez@senasica.gob.mx

La enfermedad de Pierce ocasionada por *Xylella fastidiosa* (*Xf*) en vid, se encuentra presente en las zonas vitícolas de Valle de Guadalupe, Baja California; Parras de la Fuente, Coahuila; y Ezequiel Montes, Querétaro. Estos estados se encuentran bajo Campaña Fitosanitaria por lo que se realizan actividades de manejo y control de la enfermedad, entre ellas el monitoreo mediante trapeo de insectos que pueden ser vectores de la bacteria. El objetivo de este trabajo fue estandarizar los métodos de detección de *Xf* en insectos Cicadelidos (chicharritas) provenientes de los tres sitios. Primero se seleccionaron e identificaron un total de 132 insectos reportados como vectores de la bacteria. Para la detección de *Xf*, se realizó la extracción de DNA de cada insecto, se seccionó la cabeza y se siguió el protocolo estandarizado CTAB 2%. El DNA se analizó por PCR convencional (HL5 y HL6; FXYgyr499 y RXYgyr907), qPCR (XF-F y XF-R, XF-P sonda) y LAMP (F3/b3, LF/LB, FIB/BIP), también se analizó con el kit comercial Amplify RP® de Agdia. Los resultados mostraron la presencia de *Xf* en 46 insectos, pertenecientes a los géneros: *Cuerna aria*, *Draeculacephala* sp., *Graphocephala* sp., *Homalodisca vitripennis*, *H. lacerta*, *H. liturata*, *Texanus* sp., y *Xyphon* sp. Las condiciones estandarizadas en cada técnica permiten la detección de *X. fastidiosa* en insectos. La técnica de LAMP y el kit Amplify RP® son confiables para la detección de *Xf* directamente de insectos sin realizar extracción de DNA y ambas pueden ser empleadas para monitoreo en campo.

171

MÉTODOS DE CONSERVACIÓN DE LA COLECCIÓN DE BACTERIAS FITOPATÓGENAS

DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA FITOSANITARIA. [Preservation methods of phytopathogenic bacteria collection at Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria]. Ana Abigail Vega Aragón¹, Sandra L. Moya-Hernández¹, Bárbara Hernández-Macías¹ Lidia Guadarrama Valencia¹, Andrés Aguilar-Granados¹. Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. ana.vega.i@senasica.gob.mx

El Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria cuenta con una colección de bacterias fitopatógenas, constituida por cepas que se han identificado en el análisis de material vegetal de diferentes cultivos del territorio nacional, y en material propagativo de importación. El objetivo primordial de la colección es conservar y mantener en resguardo las bacterias fitopatógenas que afectan a la agricultura. Para llevar a cabo estas acciones, se verificaron tres puntos clave de cada cepa: viabilidad, pureza y estabilidad genética; para lo cual se realizó la caracterización morfológica, pruebas de patogenicidad, sensibilidad, bioquímicas, PCR, amplificación del gen 16S, genes específicos, Multilocus en algunos casos, para el análisis e inferencia filogenética de las secuencias. Para su preservación se estandarizaron los métodos de Lote-Semilla y Liofilización. Para la técnica Lote-semilla se preservó la cepa madre, ésta fue el primer aislamiento puro que se obtuvo, y a partir de este, se realizó la resiembra para obtener los pases siguientes y conservarlos en microviales cryobank™ en dos temperaturas de almacenamiento -20°C y -80°C. Para la liofilización, se probaron distintos lioprotectores en distintas concentraciones dando mejor resultado la leche baja en grasa al 20%. Ambos procedimientos son favorables para la conservación de la mayoría de las cepas. El acervo de la colección cuenta con 170 ejemplares de los cuales se tienen 18 géneros y 47 especies, la información de cada cepa esta capturada

en el Sistema BIOTICA5.0 perteneciente a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

172

RELACIÓN ENTRE LA SEVERIDAD DE SÍNTOMAS DEL HUANGLONGBING Y LA CONCENTRACIÓN DE *Candidatus Liberibacter asiaticus* EN HÍBRIDOS DE LIMÓN MEXICANO (*Citrus aurantifolia*). [Relationship

between the severity of huanglongbing symptoms and the concentration of *Candidatus Liberibacter asiaticus* in Mexican lime hybrids]. Mario Orozco-Santos¹, Manuel Robles-González¹, Luis Felipe Guzmán-Rodríguez², José Joaquín Velázquez-Monreal¹, Miguel Ángel Manzanilla-Ramírez¹, Manuel Bermúdez-Guzmán¹, Karina García-Marriscal¹, Silvia Heréndira Carrillo-Medrano¹ y José Concepción García-Preciado¹. ¹INIFAP, Campo Experimental Tecomán. ²INIFAP, Centro Nacional de Recursos Genéticos. orozco.mario@inifap.gob.mx

México es el principal productor de limón mexicano en el mundo. El huanglongbing (HLB) causado por *Candidatus Liberibacter asiaticus* (CLas) es la enfermedad más importante que afecta esta especie cítrica. No se conocen variedades tolerantes y no existen medidas de control del agente causal. El programa de mejoramiento genético del INIFAP-Campo Experimental Tecomán generó 870 híbridos mediante hibridación convencional, utilizando cruces de limón mexicano (*Citrus aurantifolia*) con limón italiano (*C. lemon*), citranges (*C. sinensis* x *Poncirus trifoliata*) y limequat (*C. aurantifolia* x *Fortunella japonica*) con el objetivo de buscar tolerancia al HLB. En 82 muestras de limón mexicano y sus híbridos mostrando diferente intensidad de síntomas de HLB, se determinó la concentración de

CLas mediante PCR en tiempo real. Basado en el número de copias del gen S16 ribosomal de la bacteria en los híbridos de limón mexicano con diferente severidad de HLB y tonalidad del moteado se encontró una relación positiva entre severidad y la concentración de la bacteria, registrando un valor de $R^2=0.9295$. A medida que los síntomas de HLB son más severos, se incrementa el número de copias del gen de la bacteria. Los árboles con intensidad de moteado foliar 1 (mancha color verde claro), 2 (mancha color verde amarillento) y 3 (hojas color amarillento) tuvieron 128776, 274935 y 2342563 copias del gen de la bacteria, respectivamente.

173

EFFECTO *IN VITRO* DE DIFERENTES DOSIS DE SULFATO DE GENTAMICINA Y CLORHIDRATO DE OXITETRACICLINA EN EL CONTROL DE *Pectobacterium carotovorum* subsp. *carotovorum*. [In vitro effect of different

doses of gentamycin sulphate and oxitetracycline chlorhydrate for controlling *Pectobacterium carotovorum* subsp. *carotovorum*]. Daniela Daylin Olivas-Peraza, Rubén Félix-Gastélum, Noel Gerardo Olivas-Peraza. Universidad Autónoma de Occidente. daylin_24@hotmail.com

Las especies del género *Pectobacterium*, son responsables de pudriciones blandas en distintos cultivos de importancia agrícola y afectan la producción de papa en México. En el presente trabajo se evaluó el efecto inhibitorio *in vitro* de diferentes dosis de sulfato de gentamicina + clorhidrato de oxitetraciclina en un aislado de *Pectobacterium carotovorum* subsp. *carotovorum* obtenido de tallos sintomáticos de papa. La bacteria se identificó mediante pruebas, fisiológicas y bioquímicas. Para la evaluación se utilizaron placas de agar nutritivo con una suspensión bacteriana (1×10^8 UFC/mL).

Enseguida se les colocaron discos de papel filtro estéril de 1.5 cm de diámetro, impregnados con 30 µl de las diferentes dosis del antibiótico (6000, 5000, 4000, 2000 y 1000 ppm); las placas testigo contenían discos con agua estéril. Los tratamientos se distribuyeron en un arreglo completamente al azar con cinco repeticiones. El halo de inhibición de crecimiento bacteriano con las dosis 6000, 5000, 4000, 2000 y 1000 ppm del antibiótico fue de 6.2, 7.0, 4.2, 3.4 y 3.2 mm, respectivamente, a las 48 hrs de incubación. Hubo diferencias significativas ($P \leq 0.05$) entre dosis, donde las dosis de 6000 y 5000 ppm mostraron un mayor efecto inhibitorio en contraste con el testigo que no mostró inhibición. Se sugieren futuras líneas de investigación deberán incluir trabajos de campo donde se determine la efectividad biológica del antibiótico en mención para el control de la pudrición blanda del tallo de papa causada por *P. carotovorum* subsp. *carotovorum*.

174

ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS GENÉTICOS DE LAS VÍAS DE RESPUESTA A ESTRÉS BIÓTICO Y DEFICIENCIA DE HIERRO MEDIADA POR LA DIMETILHEXADECILAMINA EN PLANTAS DE *Medicago truncatula*.

[Expression analysis of the genetic elements of the response routes to biotic stress and iron deficiency mediated by dimethylhexadecylamine in *Medicago truncatula* plants]. Vicente Montejano-Ramírez, Eduardo Valencia-Cantero. Laboratorio de Ecología Microbiana. Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas UMSNH. vcantero@umich.mx

Los microorganismos producen moléculas que son reconocidas por las plantas para desencadenar la respuesta de defensa. Adicional a la presencia de

fitopatógenos, las plantas experimentan estrés por deficiencia de hierro. La defensa y deficiencia de hierro son vías que se encuentran interrelacionadas. Se ha demostrado que la interacción con diversos compuestos orgánicos volátiles (COV) producidos por bacterias, activan tanto la defensa como la resistencia a estrés abiótico. Por lo anterior, es de nuestro interés evaluar el efecto del COV dimetilhexadecilamina (DMHDA) sobre la expresión de genes marcadores de las vías de respuesta a estrés biótico y deficiencia de hierro en plantas de *Medicago truncatula*, para lo cual se crecieron plantas de *M. truncatula* en condiciones de suficiencia o deficiencia de hierro con DMHDA. Se extrajo el ARN de la planta completa, se sintetizó cDNA y se evaluó la expresión de los genes mediante RT-qPCR. Como controles positivos de la vía de defensa se usaron las fitohormonas ácido salicílico y ácido jasmónico. Se observó que la DMHDA aumenta la expresión de genes involucrados en la toma de hierro. Mientras que los genes relacionados a las vías de defensa, únicamente se indujeron cuando se combinó DMHDA y condiciones de deficiencia de hierro. Estos resultados proponen a la DMHDA como un compuesto novedoso para proteger a las plantas tanto a estrés biótico como abiótico.

175

ANÁLISIS *in silico* DEL GENOMA DEL BACTERIÓFAGO ΦXaF-13 ASOCIADO CON *Xanthomonas vesicatoria*.

[*In silico* analysis of the genome from ΦXaF-13 bacteriophage associated with *Xanthomonas vesicatoria*]. Alejandro Guillermo Solís-Sánchez¹, Evangelina Esmeralda Quiñones-Aguilar¹, Saul Fraire-Velázquez², Julio Vega-Arreguín³, Gabriel Rincón-Enríquez^{1*}. ¹Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ; ²UACB-UAZ; ³ENES-UNAM León. *grincon@ciatej.mx.

Los bacteriófagos o fagos son virus bacterianos y considerados las entidades biológicas más abundantes y ampliamente distribuidas en el mundo. A la fecha se han descrito cerca de 6300 fagos y secuenciado alrededor de 2500. Sin embargo, esto solo representa una pequeña parte del total de fagos que se calcula pueden estar presentes en la naturaleza ($\sim 10^{32}$). Actualmente los fagos representan el mayor reservorio de secuencias nuevas con un elevado potencial biotecnológico aún por descubrir. En el presente trabajo se realizó la caracterización genómica del fago XaF-13 específico de *Xanthomonas axonopodis* pv. *vesicatoria*, agente causal de la mancha bacteriana en chile (*Capsicum annuum*). El ADN del fago XaF-13 fue aislado purificado y secuenciado utilizando el sistema MiSeq de Illumina, posteriormente el genoma fue ensamblado utilizando SPAdes, anotación del genoma se realizó mediante análisis comparativo con BlastX, Phanotate y Phaster. Los resultados muestran que XaF-13 posee un genoma lineal de ADN de aproximadamente 7 kb y 16 marcos de lectura abierta, adicionalmente el análisis bioinformático mostró que posee secuencias relacionadas con fagos que infectan diversas especies de *Xanthomonas* de interés agrícola.

176

EFFECTO DE LOS EXTRACTOS DE ACTINOMICETOS SELECCIONADOS POR SU ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA EN EL CRECIMIENTO DE LARVAS DE *Spodoptera frugiperda*

[Effect of extracts of actinomycetes selected by antimicrobial activity on larval growth of *Spodoptera frugiperda*]. Jhony Navat Enriquez-Vara¹, Evangelina E. Quiñones-Aguilar², Jesús Rafael Trinidad-Cruz², Gabriel Rincón-Enríquez². ¹CONACYT-CIATEJ-Biotecnología Vegetal; ²CIATEJ-Biotecnología Vegetal. jnenriquez@conacyt.mx.

Los actinomicetos son un grupo de bacterias gram positivas que tienen el potencial de producir una gran diversidad de metabolitos secundarios con actividad antimicrobiana e insecticida. En el presente trabajo, se puso a prueba si los extractos de ocho actinomicetos que han mostrado actividad antimicrobiana sobre bacterias y hongos fitopatógenos inhiben el crecimiento de herbívoros como el gusano cogollero *Spodoptera frugiperda*. Los actinomicetos se cultivaron en medio líquido papa-dextrosa-levadura por 12 días a 28° C y 200 rpm. Los extractos de los ocho actinomicetos se obtuvieron centrifugando y filtrando los cultivos. En una cavidad de una caja de 12 cavidades se colocó 1 gramo de dieta artificial que se usa para la cría del gusano cogollero. Los extractos se aplicaron sobre la superficie de la dieta. En cada una de las cavidades se colocó una larva del tercer instar de *S. frugiperda*. Por cada extracto y el testigo (sin extracto) se utilizaron 30 larvas. Las larvas se dejaron alimentar por 5 días. Se registró el peso inicial y final de las larvas, y se calculó el índice relativo de crecimiento (IRC). Se encontró que las larvas que consumieron dieta con el extracto del actinomiceto ABZ-46 tuvieron significativamente el menor IRC (Tukey, $P \leq 0.05$) en comparación con los otros extractos de los actinomicetos y el testigo. Estos resultados muestran que el extracto del actinomiceto ABZ-46 tiene actividad antialimentaria sobre las larvas del gusano cogollero.

177

ACTIVIDAD ACC DESAMINASA, PRODUCCIÓN DE INDOLES TOTALES Y ACUMULACIÓN DE TREHALOSA EN *Pseudomonas* sp. UW4. [Activity ACC deaminase, total indol production and accumulation of trehalose in plant growth promoting bacteria *Pseudomonas* sp. UW4]. Claudia Ivonne Muñoz-Sánchez, Ma. del

Carmen Orozco-Mosqueda, Sandra Herrera-Pérez, Gustavo Santoyo-Pizano. Tecnológico Nacional de México en Celaya, Instituto de Investigaciones Químico Biológicas, UMSNH. gsantoyo@umich.mx

Uno de los principales problemas para la agricultura es la salinidad del suelo. Sin embargo, el éxito de los cultivos puede mejorarse por medio de la inoculación de plantas con bacterias benéficas que promueven el crecimiento de las plantas bajo condiciones de estrés, tales como salinidad. En el presente trabajo se evaluaron la actividad de la enzima 1-aminociclopropano-1-carboxilasa (ACC) y la acumulación de trehalosa de la bacteria promotora del crecimiento de plantas *Pseudomonas* sp. UW4. Se analizaron las cepas mutantes (*acdS*-, *treS*-, *acdS*-/*treS*-) y la sobreexpresante para trehalosa (*OxtreS*). La mutante *acdS*- resultó ACC desaminasa negativa; la mutante *treS*- tuvo un decremento importante en la acumulación de trehalosa; y la doble mutante fue afectada en ambas características. La sobreexpresante *OxtreS* acumuló más trehalosa que la tipo silvestre UW4. Se inocularon plantas de tomate sometidas a estrés salino, las cuales tuvieron un impacto importante en la longitud del tallo y raíz, peso seco y contenido de clorofila. Al inocular con las mutantes *acdS*- o *treS*-, de manera individual, resultaron afectadas respecto a la cepa silvestre. La doble mutante *acdS*-/*treS*-, fue afectada negativamente en mayor grado que las mutantes individuales, sugiriendo una acción sinérgica de estas actividades en la protección de plantas contra el estrés salino.

178

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y GENÉTICA DEL BACTERIÓFAGO ΦXaF-13 ASOCIADO A *Xanthomonas vesicatoria*.

[Morphological and genetic characterization of bacteriophage ΦXaF-13 associated to *Xanthomonas vesicatoria*]. Guillermo Alejandro Solís-Sánchez¹, Evangelina Esmeralda Quiñones-Aguilar¹, Marcela Rios-Sandoval¹, Felipe Alexis Avalos-Salgado¹, Saul Fraire-Velázquez², Julio Vega-Arreguín³, Gabriel Rincón-Enríquez^{1*}. ¹Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ; ²UACB-UAZ; ³ENES-UNAM León. *grincon@ciatej.mx.

Los bacteriófagos o simplemente fagos son virus que infectan específicamente a bacterias, los cuales son las entidades biológicas más abundantes y diversas en el planeta, superando la población bacteriana por un factor de 10. Son un grupo heterogéneo que ha sido clasificado con base en su morfología y análisis de su genoma. La biología de los fagos es un campo enorme que abarca desde la ecología bacteriana hasta el desarrollo biotecnológico de ingeniería genética y terapéutica. El objetivo de este estudio es la caracterización morfológica y genética del fago ΦXaF-13 que infecta a *Xanthomonas vesicatoria*, agente causal de la mancha bacteriana en chile (*Capsicum annum*). El análisis por microscopía electrónica señala que ΦXaF-13 está formado por una cápside icosaédrica de ~32 nm de diámetro. La secuencia del genoma se obtuvo con el equipo MiSeq de Illumina, su análisis bioinformático sugiere que el genoma de ΦXaF-13 mide ~7 kb, análisis enzimáticos indican que este genoma es de cadena sencilla. Se identificaron 16 marcos de lectura abierta, algunos de los cuales están relacionados con otros fagos de *Xanthomonas* (Xf409, Cf1c y XacF1). El fago ΦXaF-13 presenta elevada resistencia a la luz UV, esta característica es importante para su potencial uso en el biocontrol de la mancha bacteriana del chile. Estos resultados señalan que se trata de un nuevo fago específico para *Xanthomonas*.

179

TRATAMIENTO QUÍMICO A SEMILLA DE TRIGO PARA DISMINUIR LA INCIDENCIA DE BACTERIAS FITOPATOGENAS.

[Chemical treatment to wheat seed to reduce the incidence of phytopathogenic bacteria]. ¹María Florencia Rodríguez-García, ¹Julio Huerta-Espino, ¹Eduardo Villaseñor-Mir, ¹Patricia Rivas-Valencia, ²Sergio Aranda-Ocampo, ¹Leticia Robles-Yerena, ¹Miguel González-González, ¹René Hortelano-Santarosa y ¹Eliel Martínez-Cruz. ¹INIFAP-CEVAMEX. ²CP-FITOSANIDAD. rodriguez.maria@inifap.gob.mx

En los últimos años la presencia de enfermedades en trigo causadas por bacterias ha aumentado. Se ha especulado que la causa es debido a baja resistencia en las variedades, el cambio climático, y contaminación de semilla, lo que implica restricción del intercambio de germoplasma. El objetivo de esta investigación fue probar diferentes tratamientos químicos para el control de bacterias fitopatógenas del género *Pseudomonas* en semilla de trigo. El experimento fue establecido en el LANAREC-INIFAP-CEVAMEX durante mayo del 2018, bajo un diseño factorial con tres repeticiones. Se utilizó semilla de Gálvez M87, Tlaxcala F2000 y Nana F2007 proveniente de Terrenate y Nanacamilpa Tlaxcala, dicha semilla era portadora de bacterias fitopatógenas principalmente del género *Pseudomonas* y bacterias saprofitas. Los tratamientos fueron peróxido de hidrogeno, hipoclorito de sodio (2%) e hipoclorito de sodio (5%) a 1, 2 y 3 m; Metacaptan a 80, 90 y 100 g/100 Kg de semilla y Cupravit Hidro a 200, 300 y 400 g/100 Kg de semilla. La semilla después de recibir el tratamiento fue sembrada en cajas Petri con Agar nutritivo. La unidad experimental fue 10 semillas y tres repeticiones. La variable evaluada fue porcentaje de semilla infectada (PSI). El análisis de varianza

mostró alta significancia para PSI y con base en la comparación de medias obtenidas (Tukey, $p=0.05$), el mejor producto para el control de bacterias fue hipoclorito de sodio al 5% a 2m quien redujo en un 70% la incidencia, seguido de Cupravit Hidro a 200 y Metacaptan a 90, mientras que el menos efectivo fue peróxido de hidrogeno a 2m y ningún producto funciono al 100%.

180

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INHIBITORIA *IN VITRO* DE PRODUCTOS DE CONTROL BIOLÓGICO Y BIORRACIONALES FRENTE A *Xanthomonas fragariae*.

[*In vitro* evaluation of the inhibitory activity of biological control and biorational products against *Xanthomonas fragariae*]. Juan Carlos Jiménez-Morales^{1,2}, Douglas Rodríguez-Martínez², Héctor Flores-Martínez¹, Irma López-Muraira¹. ¹Instituto Tecnológico de Tlajomulco, ²Driscoll's Inc. ing.jcjm91@gmail.com.

México es el tercer mayor productor de fresa (*Fragaria x ananassa*) en el mundo. Este cultivo es afectado por la mancha angular de la hoja, causada por *Xanthomonas fragariae*, cuyo control se dificulta por las restricciones en el uso agrícola de antibióticos. Se evaluó mediante difusión en agar, la actividad inhibitoria *in vitro* de tres aislados de esta bacteria, por 10 productos biológicos y biorracionales. 16 μ l de una suspensión bacteriana (3×10^8 UFC/ml) se mezclaron con 250 ml de medio Wilbrink (40°C) y fueron vertidos en cajas Petri de 90 mm. Después de la solidificación se colocaron discos de papel filtro (6 mm) impregnados de los productos a evaluar y cuatro días posteriores se determinó el diámetro de inhibición. Los resultados mostraron diferencias significativas ($p \leq 0.05$) en los porcentajes de inhibición. Sanosil® ($H_2O_2 + Ag$)

mostró los mejores resultados, inhibiendo el 100 % del crecimiento, similar al control (Cloranfenicol). Serenade® (*B. subtilis*) inhibió el 95 %; mientras que Javelin WG® (*B. thuringiensis*) y Prot 1 (*Streptomyces* spp.) mostraron resultados del 50 % de inhibición. Progranic mega® (extracto de *Larrea tridentata*), Actinovate® (*Streptomyces lydicus*), Trylogy® (extracto de *Azadirachta indica*), Silikare® (Silicato de potasio) y otros 3 productos a base de *Streptomyces* spp. resultaron menos eficaces, con porcentajes de inhibición inferiores al 40 %. Los resultados evidencian la factibilidad de algunas de estas alternativas dentro del manejo integrado de esta enfermedad, por lo que se recomienda su evaluación y validación en sistemas agrícolas.

181

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD BACTERICIDA *IN VITRO* DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA RECUBIERTAS DE DIÓXIDO DE SILICIO FRENTE A *Xanthomonas fragariae*.

[*In vitro* evaluation of bactericidal activity of silver nanoparticles coated with silicon dioxide against *Xanthomonas fragariae*]. Juan Carlos Jiménez-Morales^{1,2}, Douglas Rodríguez-Martínez², Eugenio Rodríguez-Martínez³, Guadalupe Hernández-Callela², ¹Instituto Tecnológico de Tlajomulco, ²Driscoll's Inc., ³Instituto Politécnico Nacional, CICATA U. Altamira. ing.jcjm91@gmail.com

Xanthomonas fragariae causante de la mancha angular de la hoja de fresa (*Fragaria x ananassa*) es uno de los patógenos de mayor importancia en este cultivo en México. El manejo y control de esta bacteria se dificulta por las restricciones en el uso agrícola de antibióticos. El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad bactericida *in vitro* de nanopartículas de plata recubiertas de dióxido de silicio (NPsAgSiO₂) Sobre *X. fragariae*. 150 µl de suspensión bacteriana (D.O. de 0.1 a 450 nm)

fueron colocados en un vaso de precipitado (5 ml) donde se le agregaron 15 µl de NPsAgSiO₂ (0.3 mM) e irradiadas por 60 min a 410 nm que es la λ capaz de activar su efecto bactericida mediante la detonación de la resonancia de plasmón superficial, y bajo la luz del sol. Posteriormente, 5 µl de la mezcla fueron sembrados en medio Wilbrink sólido mediante dispersión en placa e incubadas a temperatura ambiente durante 4 días para conteo de unidades formadoras de colonias (UFC). Los resultados mostraron diferencias significativas ($p \leq 0.05$) en los porcentajes de inhibición. Los tratamientos de bacteria y AgNPS@SiO₂ irradiadas a la luz solar inhibieron el crecimiento total de colonias seguido de las muestras irradiadas a una $\lambda=410$ nm, con un porcentaje de inhibición del 80%. Los tratamientos con $\lambda=632$ nm (que no detona la resonancia de plasmón superficial) y en oscuridad no presentaron inhibición de la bacteria.

182

ANÁLISIS DE FACTORES MOLECULARES QUE CONTROLAN GENES INVOLUCRADOS EN LA PATOGENICIDAD Y VIRULENCIA EN *Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*, AGENTE CAUSAL DEL TIZÓN DE HALO DEL FRIJOL. [Analysis of molecular factors controlling genes involved in pathogenicity and virulence in *Pseudomonas syringae* pv. *phaseolicola*, the causal agent of halo blight disease of beans]. Lizeth Guardado-Valdivia¹, Mónica Álvarez-Rendón¹, José Luis Hernández-Flores², Alejandra Chacón-López¹, Ulises López-García¹, Selene Aguilera-Aguirre^{1*}. ¹Instituto Tecnológico de Tepic. ²CINVESTAV-Unidad Irapuato. *seleagui@gmail.com

El frijol es una leguminosa importante a nivel mundial; sin embargo, con frecuencia es atacado por el tizón de halo cuyo agente causal es *Pseudo-*

monas syringae pv. phaseolicola. Se ha reportado que la faseolotoxina potencia esta enfermedad. Se ha descrito que el sistema GacS/GacA controla la expresión de diversos factores de patogenicidad y virulencia, entre ellos la síntesis de faseolotoxina y producción de sideróforos. El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto de los reguladores transcripcionales RpoN, RpoS, HrpL e IHF relacionados con el sistema GacS/GacA, sobre la patogenicidad y virulencia. Mediante eventos de recombinación homóloga sencilla, se obtuvieron las mutantes en genes que codifican para los reguladores transcripcionales y se evaluó el crecimiento bacteriano, producción de sideróforos, desarrollo de enfermedad y producción de faseolotoxina. Se observó que los genes que codifican para los reguladores globales *rpoN* e *ihfA*, aunque no producen un fenotipo Tox muestran una disminución en la producción de la toxina, lo que sugiere que estos genes pudieran tener una participación en la síntesis o regulación de faseolotoxina, asimismo dichas mutantes afectan el crecimiento bacteriano y la producción de sideróforos. La mutante en el gen *hrpL* fue incapaz de desarrollar la enfermedad en vainas de frijol. Los reguladores globales RpoS y HrpL no participan en la síntesis de faseolotoxina.

183

DETECCIÓN DE FITOPLASMAS MEDIANTE NESTED-PCR Y LAMP, PARA LA CERTIFICACIÓN DE MATERIAL DE PROPAGACIÓN Y VIGILANCIA FITOSANITARIA EN BERRIES. [Detection of phytoplasmas by Nested-PCR and LAMP for the certification of propagation material and epidemiological phytosanitary surveillance on berries]. Inocente Aguilar-Olmos¹, Douglas Rodríguez-Martínez¹, María L. Rojas¹, Edel

Pérez-López², Tim J. Dumonceaux². ¹Driscoll's-México. ²University of Saskatchewan, Canadá; ³Agriculture & Agri-Food, London Research & Development Center, Canadá. inocente.aguilar@driscolls.com

Los fitoplasmas (*Candidatus phytoplasma* spp.) causan pérdidas devastadoras en cultivos agrícolas. En las *berries* en México, han sido detectados el grupo 16SrI en fresa y 16SrXIII-(A/I) I en fresa, frambuesa, arándano y zarzamora. Estos patógenos se transmiten mediante material vegetal e insectos vectores, por lo que Programas de certificación del material de propagación (PCMP) y la erradicación de plantas infectadas constituyen herramientas importantes para evitar su introducción y el desarrollo de epidemias devastadoras, por lo que se necesitan técnicas de detección eficaces. Se modificó y se estandarizó la *nested*-PCR para 16S rRNA, utilizándose los *primers* P1/P7, PCR master mix 2X (12µl): 1µl de *primers* (10nm) y 3µl de DNA muestra (20 ng) y programa de amplificación: 94°C/5min, 94°C/1min, 54°C/50seg, 72°C/2min, 72°C/5min y 4°C∞, obteniendo un amplicón de 1830pb, que se diluyó (1:30) para la segunda PCR con los *primers* R16F2n/R16R2n, y programa 94°C/2min, 94°C/1min, 55°C/2min, 72°C/2min, 72°C/10min ambas a 35 ciclos. El producto obtenido (1245pb) se verificó mediante electroforesis y secuenciación. Adicionalmente se estandarizó la amplificación isotérmica mediada por lazos (LAMP) para una región del gen Chaperonina-60, que proporciona una detección rápida (30min.) del DNA del fitoplasma. Ambas técnicas se utilizan en PCMP y vigilancia fitosanitaria de Driscoll's en México y están disponibles en otras empresas, a fin de evitar posibles daños devastadores por estos patógenos en la industria de *berries* en México.

6.3. *Nematodos*

184

ACTIVIDAD NEMATICIDA DEL EXTRACTO DE *Moringa oleifera* CONTRA EL NEMATODO FALSO AGALLADOR *Nacobbus aberrans*. [Nematicide activity of the extract of *Moringa oleifera* against the false root-knot nematode *Nacobbus aberrans*]. Liliana Aguilar-Marcelino¹, Susan Yaracet Páez-León¹, Manuel Carrillo-Morales², Olga Gómez-Rodríguez³, Gloria Sarahi Castañeda-Ramírez¹, Pedro Mendoza-de-Gives¹. ¹Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Salud Animal e Inocuidad, INIFAP. ²Universidad Politécnica del Estado de Morelos, ³Colegio de Postgraduados (COLPOS). olgago@colpos.mx

Los productos naturales contra fitopatógenos representan un potencial como estrategia de manejo. En el presente estudio se evaluó *in vitro* la inhibición de la eclosión de juveniles del segundo estadio (J₂) de *N. aberrans* y la mortalidad de éstos por el extracto de acetato de etilo de *M. oleifera* (EAEMO). Se utilizó una placa de microtitulación de 96 pozos, con 7 tratamientos y 4 repeticiones. Tratamiento 1, agua destilada (testigo); Tratamiento 2, antihelmíntico (Ivermectina 5 mg/mL); Tratamientos 3-7 diferentes concentraciones del EAEMO. En cada pozo de la placa se colocaron 100 huevos/repeticion (experimento 1) y 100 J₂/repeticion (experimento 2). A las 24 h se contaron los J₂ muertos, y a las 72 h la inhibición de la eclosión de los J₂ post-confrontación. Se sacó el porcentaje de mortalidad e inhibición de la eclosión de acuerdo a: promedio testigo-promedio tratado/promedio testigo*100. Los conteos se realizaron al microscopio óptico (10X). Los datos obtenidos fueron analizados mediante un ANOVA a través de un diseño factorial completamente al azar en el programa SAS

(V9), factores analizados: EAEMO, concentración y nematodo. Los resultados sobre inhibición de la eclosión de J₂ mostraron que el mayor porcentaje de inhibición fue de 92.61±4.17 a una concentración de 1.25 mg/mL; esta misma concentración presentó el mayor porcentaje de mortalidad de J₂ (89.32±19.03). El EAEMO a bajas concentraciones podría tener compuestos bioactivos con actividad nematicida.

185

ACTIVIDAD *in vitro* DE TRES ESPECIES DEL HONGO COMESTIBLE *Pleurotus* CONTRA EL NEMATODO FITOPARÁSITO *Nacobbus aberrans*. [Nematicide activity *in vitro* of three species of edible fungus *Pleurotus* against the plant-parasitic nematode *Nacobbus aberrans*]. Gloria Sarahi Castañeda-Ramírez¹, Liliana Aguilar-Marcelino¹, Jose Ernesto Sánchez², Susan F. Sánchez-Salgado¹, Edgar Villar-Luna³, Olga Gómez-Rodríguez⁴. ¹Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria, INIFAP. ²El Colegio de la Frontera Sur | ECOSUR. ³Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR), Unidad Michoacán (IPN). ⁴ Colegio de Postgraduados (COLPOS). aguilar.liliana@inifap.gob.mx

El falso agallador *N. aberrans*, causa pérdidas cuantiosas en la agricultura principalmente en los cultivos de jitomate, chile y papa. Para combatirlo se ha utilizado el control biológico, estrategia que tiene la ventaja de ser económica y segura con el medio ambiente. El objetivo del ensayo fue evaluar la actividad nematicida *in vitro* de micelio de tres especies de *Pleurotus* (*P. ostreatus*, *P. eryngii* y *P. djamor*) contra juveniles del segundo estadio (J₂) de *N. aberrans*. Se evaluó la mortalidad de los J₂ mediante la confrontación en placas de Petri

(60x15 mm) en agua-agar al 2%. Los tratamientos fueron las tres especies de *Pleurotus* de ocho días de edad y el testigo (solo el nematodo), cada tratamiento con 300 J₂ y 10 repeticiones en un diseño experimental completamente al azar. Se calculó la mortalidad de los juveniles a los siete días post-confrontación, se analizó con el procedimiento GLM y la prueba de Tukey (P<0.05). Los resultados mostraron un 76.77% de mortalidad de J₂ con el micelio de *P. djamor*, 68.05% con *P. ostreatus* y del 13.19% con *P. eryngii* con respecto al testigo. Las especies *P. djamor* y *P. ostreatus* con actividad nematicida significativa (P<0.05) constituyen una alternativa sustentable en el manejo de este fitone-matodo.

186

NIVELES DE AGALLAMIENTO DE RAÍCES DE PEPINO POR *Meloidogyne* spp., EN SINALOA. [Galling levels in cucumber roots due to *Meloidogyne* spp., at Sinaloa]. Guillermo Gómez-González, Ricardo Castro-López, Isidro Márquez-Zequera, Raymundo Saúl García-Estrada. Universidad Autónoma de Sinaloa. guillermo.gomezg@icloud.com

El cultivo de pepino es afectado por el nematodo agallador (*Meloidogyne* spp.), el cual se caracteriza por causar malformaciones de raíces que limitan la absorción de agua y nutrientes. El nivel de agallamiento ocasionado está directamente relacionado con la cantidad de nematodos infectando la raíz. El objetivo del estudio fue evaluar distintos niveles de agallamiento de raíces del cultivo de pepino. El experimento se estableció en invernadero en macetas de 15 litros, llenas con suelo (7% arena, 60% limo, 33% arcilla; pH 6.8) pasteurizado por vapor. La inoculación se realizó por medio de alícuotas de suspensión del nematodo, depositadas en

tres agujeros alrededor de las plantas; el momento de inoculación fue a los 14 días después de la siembra (dds) y se manejó durante 140 dds. Se establecieron densidades de 0, 450, 900, 1800, 3600 y 7200 huevecillos/maceta. Se dispusieron cinco bloques completos al azar con dos repeticiones (60 unidades experimentales). Se evaluó el porcentaje de agallamiento de raíces al final del experimento. Los datos se transformaron por raíz cuadrada (x+1) y se realizó un análisis de varianza, correlación, regresión lineal y una comparación de medias LSD Fisher ($\alpha=0.05$). El nivel de daño de raíces osciló desde un 22% hasta un 49% de agallamiento y dependió en un 84% de la densidad de inóculo. Fue posible observar diferencias estadísticas entre los rangos de 450 a 900 huevecillos/maceta y de 3600 a 7200 huevecillos/maceta respecto al agallamiento provocado. Se aportó información para la estimación previa del daño que una población del nematodo agallador en el suelo puede ocasionar al cultivo de pepino.

187

DISTRIBUCIÓN DE NEMATODOS FORMADORES DE QUISTES EN EL VALLE DE TEPEACA, PUEBLA, MÉXICO. [Distribution of cyst-forming nematodes in the Tepeaca Valley, Puebla, Mexico]. Cruz-Alvarado Yedit, Escobar-Avila Iliá Mariana y Tovar-Soto Alejandro. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. yedca018@gmail.com

Los Nematodos Formadores de Quistes (NFQ) son un grupo de endoparásitos sedentarios de importancia agrícola y económica. En México, hay pocos estudios sobre la distribución de estos patógenos. El objetivo fue conocer la distribución de los NFQ en el Valle de Tepeaca, Puebla. Durante 2008 a 2019 se realizaron muestreos de suelo y

raíces en 113 campos con diversos cultivos en los municipios de Amozoc, Acatzingo, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, Quecholac y Tepeaca. De las raíces de los cultivos muestreados se llevó a cabo la búsqueda de hembras blancas y del suelo se extrajeron quistes por la técnica de Fenwick. Se utilizó el software Qgis 2.14.5 para determinar la distribución de géneros y especies de NFQ con las coordenadas de cada campo. En el 100% de las muestras se encontraron de 1 a 1390 quistes por 200 cm³ de suelo; así mismo en 38% de los campos se encontraron hembras blancas adheridas a las raíces de zanahoria, betabel, brócoli y verdolaga. De éstos, en 32 cultivos de zanahoria se identificó por morfología, morfometría y biología molecular a *Heterodera carotae*; mientras que en betabel y brócoli a *H. schachtii*. También se identificó morfológicamente a *Heterodera* sp. en cuatro campos con betabel y *Cactodera* sp. se encontró adherida a las raíces de la maleza verdolaga en cinco campos. Los NFQ presentaron un patrón de distribución continuo entre los municipios seleccionados para el estudio. El municipio de Acatzingo presentó el mayor número de registros para NFQ.

188

BIOCONTROL DEL NEMATODO *Meloidogyne incognita* EN PEPINO. [Biocontrol of the nematode *Meloidogyne incognita* in cucumber].

José Francisco Díaz-Nájera¹, Sergio Ayvar-Serna¹, Antonio Mena-Bahena¹, Hatzel Rinconi-Reyes¹, Maricela Apáez-Barrios², Javier Gatica-Godinez¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ayvarsernas@hotmail.com

El cultivo de pepino es afectado por *Meloidogyne incognita* que atrofia el tejido radicular de las plantas lo cual reduce su potencial productivo.

Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar diferentes agentes de biocontrol sobre el índice de agallamiento y reproducción de *M. incognita* en el cultivo de pepino. Se utilizaron plantas sanas de pepino genotipo Poinsett H-714. Los Tratamientos evaluados fueron: T1: *M. incognita*, T2: *M. incognita*+*Myrothecium verrucaria*, T3: *M. incognita*+*Paecilomyces lilacinus*, T4: *M. incognita*+*Bacillus thuringiensis*, T5: *M. incognita*+*Bacillus subtilis*. El experimento se desarrolló bajo un diseño completamente al azar y utilizando cuatro repeticiones por tratamiento. La unidad experimental constó de una bolsa de polietileno con 2 Kg de sustrato estéril. Se inocularon las plantas sanas de 16 días de edad con 1,546 huevecillos por unidad experimental. Las variables evaluadas fueron: número de agallas, huevecillos y larvas en raíz, los datos fueron sometidos a un análisis de varianza con el programa SAS. El experimento concluyó a los 60 días después de la emergencia del cultivo. En las tres variables se detectaron diferencias significativas (<.0001), las plantas tratadas con *M. verrucaria* y *B. subtilis* registraron el menor número de agallas y de huevecillos de *M. incognita*, *P. lilacinus* y *Bacillus thuringiensis*, afectaron la reproducción de juveniles del nematodo.

189

EFEECTO DE LA INTERACCIÓN DE *Meloidogyne incognita* Y HONGOS FITOPATÓGENOS DEL SUELO EN MELÓN. [Effect of the interaction of *Meloidogyne incognita* and soil plant pathology fungi in melon].

Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera², Antonio Mena-Bahena¹, Benjamín Reyna Guadarrama¹, Maricela Apáez Barrios², Clemente Montoya Palacios¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. apigro1988@hotmail.com

Meloidogyne incognita afecta la producción de melón, limita su desarrollo y productividad. El objetivo fue evaluar la interacción de *M. incognita* con hongos habitantes del suelo (*Sclerotium rolfsii*, *Rhizotocnia solani* y *Macrophomina phaseolina*) en el cultivo de melón. Se evaluaron los siguientes tratamientos: *M. incognita*, *M. incognita*+*S. rolfsii*, *M. incognita*+*M. phaseolina*, *M. incognita*+*R. solani*, *M. incognita*+*S. rolfsii*+*M. phaseolina*+*R. solani*, *S. rolfsii*+*M. phaseolina*, *M. phaseolina*+*R. solani*, *S. rolfsii*+*M. phaseolina*+*R. solani*, *S. rolfsii*+*R. solani* y un testigo. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar, con cuatro repeticiones; la unidad experimental fue una maceta de polietileno con 3.5kg de tierra lama esterilizada. El inóculo de hongos fitopatógenos se multiplicó en glumas de avena y se agregaron 2.8g por maceta al igual que 7,800 huevecillos de *M. incognita*. El daño de los fitopatógenos se evaluó a los 50 ddt midiendo la longitud de raíz principal (LRP), peso de raíz fresca (PRF) y seca (PRS) y el peso del follaje fresco (PFF). El PRF y PRS no fueron afectados estadísticamente por la infección individual o combinada de los patógenos; la LRP registró diferencias estadísticas ($P=0.0010$), en donde las plantas afectadas por la interacción de *M. incognita*+*S. rolfsii*+*M. phaseolina*+*R. solani*, el menor promedio, finalmente la inoculación de *S. rolfsii*+*M. phaseolina*+*R. solani* provocó variaciones estadísticas ($P=0.0110$), porque provocaron el menor promedio del PFF plantas de melón.

190

EFFECTO DE AGENTES BIOLÓGICOS SOBRE EL DESARROLLO DEL JITOMATE CON Y SIN *Meloidogyne incognita*. [Effect of biological agents on the development of tomatoes with and without *Meloidogyne incognita*]. Sergio

Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera², Antonio Mena-Bahena¹, Benjamín Reyna-Guadarrama¹, Maricela Apáez-Barrios¹, Vargas Nava-Refugia¹, ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. apigro1988@hotmail.com

Meloidogyne es considerado el nematodo más importante del jitomate debido a la severidad de los daños y la reducción en producción del cultivo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de *Bacillus* spp., *Paecilomyces lilacinus* y *Myrothecium verrucaria* sobre el desarrollo del jitomate con y sin *Meloidogyne incognita*. Se evaluaron los tratamientos Testigo, *Bacillus subtilis*, *Bacillus thuringiensis*, *Paecilomyces lilacinus*, *Myrothecium verrucaria*, *Meloidogyne* (M), M+Bacillus subtilis, M+Bacillus thuringiensis, M+Paecilomyces lilacinus y M+Myrothecium verrucaria; los cuales se compararon en un diseño experimental completamente al azar con cuatro repeticiones, la unidad experimental fue una bolsa de polietileno de 25×15 cm, la cual se llenó con 2.5 kg de materia orgánica y tierra limo esterilizada. Las variables de estudio fueron diámetro del cuello de la planta (DC), altura de la planta (AP), número de ramas (NR) y hojas (NH), se les realizó un análisis de varianza con el software SAS y una prueba complementaria de separación de medias por el método de Tukey ($\alpha=0.05$). El análisis registró diferencias estadísticas en DC, AP y NH ($P=0.0023$ y 0.0001), las plantas tratadas con *Paecilomyces lilacinus* y *Myrothecium verrucaria* sin *Meloidogyne* registraron el mayor promedio de DC y AP, las plantas inoculadas únicamente con *Meloidogyne* obtuvieron menor DC y AP. La inoculación de *P. lilacinus* en plantas sin *Meloidogyne* exhibieron el mayor promedio de NH, finalmente la inoculación solo de *Meloidogyne* provocó una disminución del NH.

PESTICIDAS BIOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE *Meloidogyne incognita* EN CHILE MIRASOL. [Biological pesticides for the control of *Meloidogyne incognita* in chile mirasol]. Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera¹, Antonio Mena-Bahena¹, Adolfo Roman Sandoval-Arteaga¹, Omar Guadalupe Alvarado-Gómez², Maricela Apáez-Barrios³ y María Guadalupe Herminio-Maldonado¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Autónoma de Nuevo León. ³Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. apigro1988@hotmail.com

El control biológico en una alternativa contra la erradicación de los nematodos, se implementa como un medio preventivo. En el presente estudio se determinó la incidencia de agallas, huevos y larvas por efecto de bionematicidas. Los tratamientos evaluados fueron: T₁= *Meloidogyne incognita*, T₂= *M. incognita*+*Paecilomyces lilacinus*, T₃= *M. incognita*+*Myrothecium verrucaria*, T₄= *M. incognita*+*Bacillus thuringiensis*. El experimento se desarrolló bajo un diseño completamente al azar, con cuatro repeticiones generando 16 unidades experimentales, cada una constó de una maceta de polietileno de 25×25 cm, con 2.5 kg de sustrato estéril. Se utilizó la variedad criollo mirasol y se inocularon 2, 211 huevecillos por cada unidad experimental. Las variables de estudio fueron: incidencia de agallas, huevecillos y larvas, las cuales fueron sometidas a un análisis de varianza y a una comparación múltiple de medias por el método de Tukey ($\alpha=0.05$). La reproducción de *Meloidogyne incognita* en plantas de chile criollo mirasol se afectó estadísticamente por los agentes de biocontrol *Paecilomyces lilacinus*, *Myrothecium verrucaria* y *Bacillus thuringiensis*. Las plantas inoculadas únicamente con el nematodo registraron la mayor

incidencia de agallas, huevecillos y larvas. Los agentes biológicos no permitieron la formación de agallas y provocaron nula incidencia de huevecillos en plantas de chile criollo mirasol; *Myrothecium verrucaria* suprimió totalmente la incidencia de larvas de *Meloidogyne incognita*.

PRODUCTOS ORGÁNICOS PARA EL CONTROL DE *Meloidogyne incognita* EN SANDÍA. [Organic products for the control of *Meloidogyne incognita* in watermelon]. José Francisco Díaz-Nájera¹, Sergio Ayvar-Serna¹, Mateo Vargas-Hernández², Antonio Mena-Bahena¹ Adolfo Roman Sandoval-Arteaga¹ y Vitaliano Hernandez-Urrioso¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Autónoma Chapingo. apigro1988@hotmail.com

En los últimos años los nematodos agalladores han provocado problemas fitosanitarios que limitan la producción de las cucurbitáceas. Por otro lado, debido a problemas de contaminación ambiental, surge la necesidad de buscar otras opciones de control que sean prácticas y económicamente factibles. Por tal motivo el objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de extractos vegetales sobre la reproducción de *Meloidogyne incognita* en el cultivo de sandía. El genotipo utilizado fue la variedad "Fantasy". Los tratamientos fueron los siguientes: T₁= *Meloidogyne incognita*, T₂= *Meloidogyne incognita*+extracto de ajo, T₃= *Meloidogyne incognita*+extracto de canela y T₄= *Meloidogyne incognita*+extracto de cebolla y chile, en todos los tratamientos se utilizó la dosis recomendada por el fabricante. Se implementó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. La unidad experimental estuvo constituida de una bolsa de polietileno de 20×15 cm con 2.5 kg

de sustrato estéril, en cada unidad experimental se inocularon 3,800 huevecillos. Las variables fueron número de agallas, número de huevos y larvas en 100 g de sustrato, y fueron sometidas a un análisis de varianza y una prueba de medias (Tukey $\alpha=0.05$) con el programa SAS. Los resultados indicaron que únicamente existió diferencia estadística en el número de agallas ($P=0.0270$) porque en las plantas tratadas con extracto de canela y ajo se registró la menor incidencia de agallas; a pesar de no existir evidencia estadística los tratamientos con extracto de cebolla y chile obtuvieron el menor promedio de huevecillos y larvas de *Meloidogyne incognita*.

193

EFFECTO DE AGENTES BIOLÓGICOS SOBRE *Meloidogyne* sp. EN TOMATILLO. [Effect of biological agents on *Meloidogyne* sp. in tomatillo]. Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera², Antonio Mena-Bahena¹, Adolfo Román Sandoval-Arteaga¹, Maricela Apáez-Barrios² y Daniel Bahena-Gómez¹. ¹Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. ²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. apigro1988@hotmail.com

Physalis ixocarpa es atacado por el nematodo agallador (*Meloidogyne* sp.) que infecta la raíz, produce agallas e induce cambios morfológicos, bioquímicos y fisiológicos que repercuten adversamente en el desarrollo y rendimiento del cultivo. La presente investigación tuvo como objetivo determinar el efecto de agentes biológicos sobre la reproducción de *Meloidogyne* sp. en tomatillo. Fueron evaluados los siguientes tratamientos: T1: *Meloidogyne*, T2: *Meloidogyne*+*Paecilomyces lilacinus*, T3: *Meloidogyne*+*Myrothecium verrucaria*, T4: *Meloidogyne*+*Bacillus subtilis* y T5: *Meloidogyne*+*Bacillus thuringiensis*. Fue utilizado

un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones, generando así 20 unidades experimentales, cada una consistió en una bolsa de polietileno de 25×25 cm, las macetas fueron inoculadas con 2,400 huevecillos de *Meloidogyne*. Las variables tomadas para esta evaluación fueron incidencia de huevecillos y larvas. Los datos de las variables fueron sometidos a un análisis de varianza y a una comparación múltiple de medias por el método de Tukey ($\alpha=0.05$). Los resultados indicaron que para la incidencia de huevecillos se detectó diferencia altamente significativa ($P=0.0001$) porque las plantas tratadas con *Myrothecium verrucaria* obtuvieron la menor incidencia de huevecillos de *Meloidogyne*. La incidencia de larvas no fue afectada significativamente ($P=0.1291$), sin embargo, la menor incidencia del patógeno se obtuvo donde se inoculó *M. verrucaria*; en las unidades experimentales inoculadas únicamente con *Meloidogyne* (Testigo) se registró la mayor incidencia del nematodo.

194

EFFECTO DE EXTRACTOS VEGETALES SOBRE CHILE SERRANO INOCULADO CON *Meloidogyne incognita*. [Effect of vegetable extracts on serrano chili inoculated with *Meloidogyne incognita*]. Maricela Apáez-Barrios², Sergio Ayvar-Serna¹, José Francisco Díaz-Nájera¹, Antonio Mena Bahena¹, Antonio Rodríguez Ponce², Rosy Lizeth Corral-Castrejon¹. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Iguala, Guerrero, México¹. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Facultad de Ciencias Agropecuarias². apigro1988@hotmail.com

El chile forma parte de la dieta de la población mexicana, el cual es afectado por factores bióticos que reducen la producción, entre ellos el nematodo

del género *Meloidogyne*. Para el control actualmente se usan extractos vegetales que son seguros al ambiente y salud humana. El objetivo fue evaluar el efecto de extractos vegetales sobre el desarrollo de las plantas e identificar la especie de *Meloidogyne* en chile cultivar "HMX-5651". El estudio se realizó en el Laboratorio de Fitopatología-Invernadero del Centro de Estudios Profesionales del Colegio Superior Agropecuario del estado de Guerrero. Los tratamientos evaluados fueron diez, T1: Testigo, T2: *Meloidogyne*, T3: GAMA (Ajo, chile, canela), T4: AJICK (Ajo), T5: QANUM (Canela), T6: EDOCA (Ajo), T7: *Meloidogyne* + GAMA, T8: *Meloidogyne* + AJICK, T9: *Meloidogyne* + QANUM, T10: *Meloidogyne* + EDOCA, la unidad experimental constó de una maceta, el diseño experimental fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Los datos se analizaron con SAS y Tukey al 5%. Se evaluó en la planta diámetro, altura, número ramas y hojas, biomasa, volumen de raíz, número huevos y juveniles en raíz. Todas las variables morfológicas fueron mayores en el tratamiento testigo superiores en 66% a T2, el número huevos y de juveniles fue mayor con la inoculación del nematodo. De acuerdo con las características morfológicas la especie fue *Meloidogyne incognita*.

195

NIVELES POBLACIONALES DE *Meloidogyne incognita* EN CACAHUATE (*Arachis hypogaea*). [Population levels of *Meloidogyne incognita* in peanut (*Arachis hypogaea*)]. Sergio Ayvar-Serna¹, Maricela Apaez-Barrios², José Francisco Díaz-Nájera¹, Antonio Mena-Bahena¹, Antonio Rodríguez-Ponce², Ulises Hernández-Lucena¹. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Iguala, Guerrero, México¹. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Facultad de Ciencias Agropecuarias². mary_230488@hotmail.com.

El cacahuete es una de las leguminosas más importantes para la alimentación humana. Sin embargo, presenta problemas fitosanitarios que reducen su potencial de rendimiento. El objetivo del estudio fue identificar la especie de nematodo inoculado y determinar el efecto de la inoculación en variables morfológicas de plantas de cacahuete. El estudio se realizó en el Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Los tratamientos evaluados fueron: sin y con inóculo (huevos); Testigo T1 (sin inóculo), T2 (5,000), T3 (10,000), T4 (15,000), T5 (20,000), T6 (25,000) T7 (30,000). El diseño experimental fue bloques completos al azar con cuatro repeticiones por tratamiento. Las variables medidas en la planta fueron acumulación de biomasa, altura, diámetro del tallo, número de hojas, ramas, peso y longitud de la raíz. Las variables diámetro del tallo, peso y longitud de raíz no presentaron diferencias por efecto de tratamientos. Sin embargo, en las variables número de hojas y ramas si existieron diferencias significativas únicamente con relación a T7, los valores más altos se encontraron con el tratamiento testigo 25% mayor a T7. Las variables altura y biomasa presentaron tendencia similar fueron más altas en 70 y 79% con relación a T7. La especie identificada fue *Meloidogyne incognita* de acuerdo con sus características morfológicas, la densidad alta de nematodos (30,000) en las plantas tiene efecto negativo en el desarrollo de esta, mientras que las densidades bajas de inóculo no tienen efecto sobre las variables evaluadas.

196

INTERACCIÓN DE HONGOS HABITANTES DEL SUELO CON *Meloidogyne incognita* EN PEPINO. [Interaction of soil habitant fungi with *Meloidogyne incognita* in cucumber]. José Francisco Díaz-Nájera¹, Maricela Apaez-Barrios², Sergio Ayvar-Serna¹, Antonio Mena-Bahena¹. Antonio Rodríguez-Ponce², Violeta Alejandra Lazaro-Flores¹.

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Iguala, Guerrero, México¹. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-Facultad de Ciencias Agropecuarias². ayvarsernas@hotmail.com

El pepino es un cultivo importante en México. Sin embargo, éste es atacado por nematodos, principalmente del género *Meloidogyne* que reduce el desarrollo de la planta. Dicho nematodo interactúa con patógenos como los hongos. El objetivo fue determinar el efecto de la interacción nematodo (*Meloidogyne incognita*)- hongos sobre el crecimiento del pepino. El estudio se realizó en el Colegio Superior Agropecuario del estado de Guerrero. Se utilizó la variedad Poinsett 76. Los tratamientos fueron diez, T1: Testigo; T2: *Meloidogyne* (M); T3: *Rhizoctonia* (R); T4: *Fusarium* (F); T5: *Sclerotium* (S); T6: *Meloidogyne* (M) + *Rhizoctonia* (R); T7: *Meloidogyne* (M) + *Fusarium* (F); T8: *Meloidogyne* (M) + *Sclerotium* (S); T9: *Meloidogyne* (M) + *Fusarium* (F) + *Sclerotium* (S) + *Rhizoctonia* (R), T10: *Fusarium* (F) + *Sclerotium* (S) + *Rhizoctonia* (R). Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones. El inóculo del nematodo se obtuvo de raíces de jitomate y las cepas de *Fusarium*, *Rhizoctonia* y *Sclerotium* de frijol. Las variables evaluadas fueron altura de planta, diámetro y número de hojas. Los datos se analizaron con SAS y Tukey al 5%. El tratamiento testigo presentó mayor altura de planta, diámetro y número de hojas, 50% mayor que T9. El resto de los tratamientos no presentaron diferencias significativas. El grado de severidad de la interacción nematodo-hongo fue mayor que el efecto causado por el nematodo solo.

197

CONTROL BIOLÓGICO DE *Meloidogyne incognita* (KOF.) CHITD. CON *Paecilomyces*

lilacinus (THOM) SAMSON Y *Bacillus subtilis*, EN EL CULTIVO DE RÁBANO. [Biological control with *Paecilomyces lilacinus* (Thom) Samson and *Bacillus subtilis* against *Meloidogyne incognita* on radish crop]. Sergio Ayvar-Serna¹, Arturo Peláez-Arroyo², José Francisco Díaz-Nájera¹, Mateo Vargas-Hernández³, Antonio Mena-Baheña¹, Karla Marlen Ramos-Reyes¹. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero¹, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 316², Universidad Autónoma Chapingo³ pelaezarroyo_24@hotmail.com

Meloidogyne incognita es un problema fitosanitario para los productores y comercializadores de rábano, debido al decremento en el rendimiento y deformaciones en la raíz carnosa. Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de los biocontroladores contra *M. incognita*, en seis tratamientos: T1) *M. incognita*, T2) *M. incognita* + *Paecilomyces lilacinus*, T3) *M. incognita* + *Bacillus subtilis*, T4) Control, T5) *Paecilomyces lilacinus* y T6) *Bacillus subtilis*; con cuatro repeticiones, en un diseño completamente al azar. Se inocularon 2,500 huevecillos de *M. incognita* maceta¹. Las variables de respuesta fueron: diámetro polar del bulbo (DPB) y el peso del bulbo fresco (PBF). El ANOVA reveló diferencias significativas entre los tratamientos ($P < 0.001$) en ambas variables. Significativamente el mayor PBF se obtuvo con T5 (*Paecilomyces lilacinus* solo) y T2 (*Paecilomyces lilacinus* + *M. incognita*). En el DPB los mayores valores se registraron cuando se aplicó *Bacillus subtilis* solo (T6), seguido de *Bacillus subtilis* + *M. incognita* (T3). Por otro lado, el tratamiento con *M. incognita* solo (T1) ocupó los grupos estadísticos más bajos. Según investigadores, los biocontroladores pueden mejorar el crecimiento de las plantas suprimiendo al patógeno de la raíz con sustancias biológicamente activas o

transformando minerales y compuestos orgánicos no disponibles a formas disponibles para las plantas.

198

BIOCONTROL DE *Meloidogyne incognita* EN *Physalis ixocarpa* [Biocontrol of *Meloidogyne incognita* in *Physalis ixocarpa*]. Sergio Ayvar-Serna¹, José Alfredo Flores-Yáñez², Mateo Vargas-Hernández², Antonio Mena-Bahena¹, Rosalía Mendoza-García¹. ¹CEP-CSAEGro, ²Posgrado en Protección Vegetal UACH. ayvarsernas@gmail.com

La producción de tomatillo en 2017 generó más de \$48 millones de ingresos para Guerrero. En Coquila Gro., se han observado plantaciones con clorosis, marchitez y pérdida del vigor. Por lo anterior, se realizó esta investigación con el objetivo de identificar al agente causal y evaluar agentes biológicos para su manejo. De raíces de tomate recolectadas en parcelas de la colonia Álvaro Obregón municipio de Coquila, se extrajeron huevecillos de nematodos para su inoculación y hembras adultas para su identificación mediante el patrón perineal. Se evaluaron los tratamientos: T1= Control (sin nematodos), T2= *Meloidogyne incognita*, T3= NEMAQUIN (*Paecilomyces variotii*), T4= *M. incognita*+NEMAQUIN, T5= NEMAGRO (*Paecilomyces lilacinus*) y T6= *M. incognita*+NEMAGRO, los cuales se distribuyeron completamente al azar con 4 repeticiones en un invernadero; la unidad experimental fue una maceta con 3 kg de arena-composta (1:1 v/v) estéril, una planta de tomate verde cv. Puebla, 3,000 huevos del nematodo + la dosis recomendada por el fabricante de los productos. A los 5 y 20 días después de la inoculación (d.d.i.), se aplicaron los biocontroladores. 60 d.d.i., se midió la altura de la planta (AP), peso seco del follaje (PSF), juveniles en 100 g de suelo y huevecillos en la raíz. Se realizó un

ANOVA y una comparación de medias de Tukey. La población se identificó como *Meloidogyne incognita*; se encontraron evidencias ($P < 0.0001$) de que *P. variotii* generó la menor cantidad de huevos y juveniles de *M. incognita* y causó la mayor AP y PSF en las plantas de tomate inoculadas con el nematodo, con respecto al testigo.

199

INTERACCIÓN NEMATODO-HONGO (*Meloidogyne* sp.- *Rizhoctonia solani* Y *Macrophomina phaseolina*) EN EL CULTIVO DE PEPIÑO. [Nematode-fungi interaction (*Meloidogyne incognita*- *Rizhoctonia solani* and *Macrophomina phaseolina*) on cucumber crop]. Sergio Ayvar-Serna¹, Arturo Peláez-Arroyo², José Francisco Díaz-Nájera¹, Antonio Mena-Bahena¹, Mateo Vargas-Hernández³ y Delfina Flores-Jimon¹. Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero¹, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 316², Universidad Autónoma Chapingo³ pelaezarroyo_24@hotmail.com

La infestación por *Meloidogyne* sp. es uno de los principales problemas del cultivo de pepino, contribuyendo a la incidencia de enfermedades provocadas por hongos del suelo, por las heridas causadas en la raíz. Es por lo anterior que la presente investigación tuvo como objetivos evaluar la interacción de *Meloidogyne* sp -hongos fitopatógenos sobre la biomasa de raíz y altura de planta de pepino. Se evaluaron los tratamientos: *Meloidogyne* sp., hongos fitopatógenos (*Rizhoctonia solani* y *Macrophomina phaseolina*), la interacción de nematodo-hongo y un testigo absoluto, con 4 repeticiones, generando 32 unidades experimentales, distribuidas en un diseño completamente al azar. La unidad experimental fue una maceta de 3 kg. Los datos obtenidos se sometieron a un ANOVA y

una prueba de comparación múltiple de medias por el método de Tukey ($P=0.05$), mediante de SAS. Estadísticamente no se encontraron diferencias significativas para ninguno de los tratamientos en ambas variables, sin embargo, el nematodo, ambos hongos, la interacción de nematodo-hongo causaron

decrementos del 65, 58 y 45% respectivamente, sobre el peso de la raíz fresca; mientras que la inoculación del nematodo solo y el nematodo más *Rizhoctonia solani*, numéricamente obtuvieron las menores alturas. Corroborando que la infección por estos patógenos causa decrementos significativos durante el desarrollo de las plantas de pepino.

6.4. *Virus*

200

MITIGACIÓN DE LA PATOGÉNESIS DE *Tobacco mosaic virus* EN LA FENOLOGÍA DEL TOMATE POR 360°AGROCKER® [Mitigation of the pathogenesis of *Tobacco mosaic virus* on tomato phenology by 360°Agrocker®]. ¹Omar Cordero-García, ¹Leila Minea Vásquez-Siller, ¹Alfonso López-Benítez, ¹Alfredo Sánchez-López, ¹Norma Angélica Ruiz-Torres, ¹Arturo Mancera-Rico, ¹Gustavo Alberto Frías-Treviño, ²Gerado Santos Leyva-Mir. ¹Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN); ²Universidad Autónoma de Chapingo (UACH). corderogarcia92@hotmail.com

TMV causa pérdidas entre 15 y 65% en producción de tomate en invernaderos. Se evaluó la respuesta de plantas de tomate inoculadas con TMV a la aplicación del producto 360°Agrocker®, con activo nanoparticulado. Se inocularon con TMV las variedades Villa Narro y SofiMely en etapas vegetativa y antesis; confirmando la infección con ELISA (ADGIA®); se asperjó al follaje 360°Agrocker® (3.33ml/L) con frecuencias de 3 y 7 días. Se incluyeron testigos inoculados en etapa vegetativa y antesis sin aspersión y testigos sin inoculación ni aspersión foliar, aplicando cuatro repeticiones. Después de la primera aplicación foliar se tomaron cuatro lecturas de ELISA en intervalos de 15 días cada una por etapa inoculada, incluyendo testigos. Se midieron parámetros de etapas de desarrollo. Se realizó un análisis de varianza con un diseño completamente al azar y prueba de Tukey 5%, con SAS.9.1. Hubo diferencias altamente significativas ($P=0.0001^{**}$) para: altura de planta, número de hojas, lecturas de ELISA, peso fresco y seco de planta, peso y número de semillas por fruto, diámetro y longitud por fruto. 360°Agrocker® mitigó la

patogénesis de TMV en 65.4% la altura de planta, 29.61% peso de fruto y 32.54% en número de semillas por fruto en Villa Narro y en SofiMely se mitigó 56.20%, 28.37% y 34.19%, respectivamente.

201

DETECCIÓN POR RT-PCR DEL *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV) EN CULIACÁN, SINALOA. [Detection by RT-PCR of *Tomato brown rugose fruit virus* (ToBRFV) in Culiacán, Sinaloa]. Raymundo S. García-Estrada, Isabel Cruz-Lachica, Isidro Márquez-Zequera, Luis A. Osuna-García, Juan M. Tovar-Pedraza. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A. C., Coordinación Culiacán. rsgarcia@ciad.mx

México se encuentra entre los principales productores de tomate (*Solanum lycopersicum* L.) a nivel mundial. A nivel nacional, Sinaloa es el principal estado productor de esta hortaliza. Durante el ciclo 2018–2019, se registró la presencia de plantas de tomate con síntomas asociados al ToBRFV en campos comerciales en Culiacán, Sinaloa. En hojas, se observaron mosaicos, mientras que en frutos se presentaron áreas necróticas de color marrón con rugosidades e internamente un aspecto acartonado. El objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia del ToBRFV mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa (RT-PCR). El ARN total para la síntesis de ADN complementario se extrajo de hojas de 300 plantas con síntomas con apariencia de virosis y se incluyó en el análisis 10 plantas control (sin síntomas). La amplificación se realizó usando los iniciadores F-3666/R-4718, obteniendo como producto un fragmento de 1052 pb en el 10% de las muestras sintomáticas. La secuencia obtenida de una de las muestras mostró 99.89% de identidad de nucleótidos con secuencias del ToBRFV depositadas en la base

de datos del GenBank (N° Accesos KT383474, KX619418 y MH891505). Debido a lo anterior, se confirma la presencia del ToBRFV afectando campos comerciales de tomate en Culiacán, Sinaloa. Se sugiere determinar la distribución, cuantificación de pérdidas, y estrategias de manejo del ToBRFV en Sinaloa.

202

EFFECTO DE INHIBIDORES EN EL CONTROL DEL PAPAYA RINGSPOT VIRUS Y PRODUCTIVIDAD EN PAPAYA (*Carica papaya* L.).

[Effect of viral inhibitors in the control of Papaya ringspot virus and productivity in papaya (*Carica papaya* L.)]. Isaac Magaña-López¹, Dagoberdo Guillén-Sánchez², Irán Alía-Tejaca¹, Víctor López-Martínez¹, Porfirio Juárez-López¹, María Andrade-Rodríguez¹, Ricardo Hernández-Pérez³. ¹Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Facultad de Ciencias Agropecuarias. ²UAEM - Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc. ³Laboratorio de Agrobiodiagnóstico Fitolab S.A de C.V. dagoguillen@yahoo.com

La papaya (*Carica papaya*) es un frutal muy aceptado en el mercado de exportación por generar alta rentabilidad, en México se cultiva en zonas tropicales y subtropicales. El *Papaya ring spot virus* (PRSV) ocasiona la enfermedad más restrictiva de la producción de este cultivo en México y el mundo, por lo cual se evaluó la eficacia de Inhibitovir[®] y Virus Stop[®] en campo a 3 mL L⁻¹ y 6 mL L⁻¹ sobre incidencia, intensidad y control de la virosis, altura de planta, diámetro de tallo, número de flores y frutos, peso del fruto y rendimiento. Se utilizó un diseño de bloques completamente al azar. La unidad experimental constó de una cama con dos hileras a 2.0 m de ancho y 21 m de largo, con distancias entre plantas de 1.5 m, alojando 28

plantas. Se realizó un análisis de varianza y comparación de medias mediante Duncan (P<0.05) con el paquete estadístico SAS. El PRSV se detectó mediante ELISA-DAS hasta el quinto mes después del trasplante, tiempo para que la plantación lograra un buen amarre de frutos. Las aplicaciones de Inhibitovir[®] y Virus Stop[®] no ejercieron efecto en la incidencia e intensidad del PRSV, de igual manera en la eficacia de control. Así mismo no se observó respuesta en altura de planta, diámetro de tallo, número de flores y frutos por planta, peso de fruto y rendimiento potencial.

203

VIRUS ASOCIADOS CON EL MOSAICO DE LA HIGUERA (*Ficus carica* L.) EN NUEVO LEÓN, MÉXICO.

[Viruses associated with fig mosaic (*Ficus carica* L.)] in Nuevo Leon, Mexico. Maricela Indira Rodríguez-Herrejón, Omar Guadalupe Alvarado-Gómez, Guillermo Niño-Medina y Emilio Olivares-Sáenz. Facultad de Agronomía, UANL. omaralvarado085@gmail.com

La enfermedad del mosaico de la higuera está ampliamente distribuida en el mundo y se ha reportado en varios países de los cinco continentes. En México existe un reporte de virus en plantas de higuera. En el presente trabajo se recolectaron 26 muestras de 3 variedades de higuera (Black Mission, Brown Turkey y Adriatica) en forma dirigida que incluyó plantas sintomáticas y asintomáticas, en el invernadero del Centro de Agricultura Protegida de la FAUANL en Gral. Escobedo, N.L., en el Campo Experimental Marín, en Marín, N.L. y en una huerta de Sabinas Hidalgo, N.L. Se tomaron discos de 5 mm de hojas de nuevo crecimiento incluyendo parte de la nervadura central, y se les realizó una extracción de RNA utilizando el reactivo TriReagent^{MR} y el kit RNeasy^{MR} siguiendo

las instrucciones de los fabricantes con modificaciones. Las reacciones de RT-PCR se aplicaron a todas las muestras utilizando siete pares de primers para la detección e identificación a nivel de especie de siete virus asociados con la enfermedad mosaico de la higuera. Se detectó e identificó el virus del mosaico de la higuera (FMV) en tres plantas del invernadero en Gral. Escobedo, N.L. de seis muestras. Se realizó una secuenciación parcial del DNAc del virus-amplificado y una comparación mediante un análisis BLAST con la base de datos del GenBank encontrándose un 99% de similitud con la secuencia del virus FMV de aislamientos de Argentina con números de accesión KP796424 y KP796425.

204

DETECCIÓN DE *Cymbidium ringspot virus* (CymRSV) MEDIANTE EL ENSAYO DE IC-RT-PCR MULTIPLEX. [Detection of *Cymbidium ringspot virus* (CymRSV) by multiplex IC-RT-PCR assay]. Marcos Pérez-García, Jessica Berenice Valencia-Luna, Marisela Contreras-Hernández, Leticia Robles-Yerena, Edgar Octavio Ceballos-Rodríguez, Liliana Elizabeth Ronces-Frutos, María del Rocío Hernández-Hernández, José Gustavo Torres-Martínez, José Ulises García-Romero, José Abel López-Buenfil, Dirección General de Sanidad Vegetal, Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. abel.lopez@senasica.gob.mx

A nivel mundial *Cymbidium ringspot virus* (CymRSV) afecta a plantas susceptibles de las familias Amaranthaceae, Boraginaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Compositae, Cucurbitaceae, Labiatae, Leguminosae-Papilionoideae, Orchidaceae, Phytolaccaceae, Polemoniaceae, Polygonaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae, Tetragnoniaceae y Tropaeolaceae; para México, el

CymRSV es una plaga cuarentenaria y se encuentra en la “Lista de Plagas Reglamentadas de México” ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC). La detección de CymRSV se realiza mediante el Ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) con kits comerciales, en una revisión de literatura no se encontraron oligonucleótidos reportados en artículos científicos de este virus. Esta investigación presenta una metodología alternativa para su detección mediante un proceso de inmunocaptura (IC) del virión para aislar los ácidos nucleicos, acoplado a la retrotranscripción (RT) y amplificación simultánea de fragmentos altamente específicos a nivel de especie de la ARN replicasa (RdPd), la proteína de la cápside (CP) y la proteína de movimiento (MP) [IC-RT-PCR multiplex]. Durante la estandarización del protocolo se usaron controles liofilizados positivos y negativos de la empresa Agdia™ y una muestra de *Phalaenopsis* spp., que resultó positiva por ELISA, procedente de Costa Rica, detectada en punto de ingreso al país. La identidad del virus ha sido confirmada con la secuencia nucleotídica de los amplicones, obtenida a partir de secuenciación tipo Sanger. Este protocolo demostró ser una herramienta confiable, rápida y de bajo costo en procedimientos de diagnóstico de CymRSV.

205

DETECCIÓN DE VIRUS EN *Agave attenuata* (ORNAMENTAL) POR SECUENCIACION MASIVA DE ARN (RNA-SEQ). [Detection of virus in *Agave attenuata* (Ornamental) by RNA massive sequencing (RNA-seq)]. David Vargas-Peralta, Karla Álvarez-Angeles, Héctor Salgado-Ortiz, Rodolfo De La Torre-Almaraz ¹. FES Izta-cala, Universidad Nacional Autónoma de México. vpdvargas@gmail.com

México es el centro de diversidad biológica de los agaves a escala mundial. El género *Agave* cuenta con alrededor de 211 especies, de las cuales 159 tienen presencia en México, es decir, 75 por ciento del total. Una especie utilizada como planta de ornato es *Agave attenuata*, conocida comúnmente como cuello de cisne. En algunas plántulas de esta especie se han observado daños foliares consistentes de rayas tenues de color amarillo, que al coalescer forman manchas irregulares de aspecto aceitoso y en hojas bien desarrolladas se observan anillos cloróticos con márgenes necróticos, daños similares a los causados por virus. No existen antecedentes sobre la identidad de los posibles virus asociados a estos daños, por lo tanto los objetivos del trabajo fueron identificar y caracterizar a los posibles virus asociados a los daños ya descritos. Pruebas de diagnóstico serológicas indicaron la presencia de un virus de la familia Potyviridae. La identidad parcial del virus se corroboró por secuenciación directa de los productos de la RT-PCR específicos para *Potyvirus*. El análisis de secuenciación masiva de ARN (RNA-Seq) realizado en un secuenciador Illumina por extremos pareados con un tamaño de biblioteca de 200 pb, arrojó un total de 10 millones de lecturas que fueron procesadas por diferentes programas bioinformáticos, Trinity, BLASTn y Geneious ver. 9; con los datos procesados se construyeron filogenias con el programa MEGA7 empleando el método de Neighbor-Joining y ajustando el modelo evolutivo más adecuado, confirmando la presencia del genoma completo de un *Potyvirus*.

206

***Poinsettia mosaic virus* EN ESPECIES DEL GÉNERO *Euphorbia*.** [*Poinsettia mosaic virus* in species of the genus *Euphorbia*]. Omar Jacobo-Villegas¹, María Teresa Colinas-León¹, Héctor Lozoya-Saldaña¹, Irán Alia-Tejaca², Gerardo Leyva-

Mir³, Moisés Camacho-Tapia⁴, Juan Manuel Tovar-Pedraza⁵ y Mónica Laura Pérez-Nicolás¹. ¹Instituto de Horticultura, Universidad Autónoma Chapingo. ²Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ³Parasitología Agrícola, UACH. ⁴LANISAF, UACH. ⁵Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. omarjacobovillegas@gmail.com

La familia Euphorbiaceae es una de las más diversas a nivel mundial, el 50% de las especies pertenecientes a esta familia reportadas en México son endémicas, el género con mayor número de especies es *Euphorbia*. En la Universidad Autónoma Chapingo se está desarrollando mejoramiento genético en especies de *Euphorbia* con potencial ornamental, sin embargo, la sanidad de las especies en estudio se encuentra amenazada por plagas y enfermedades, uno de los patógenos recurrentes son los virus. El objetivo de la presente investigación fue determinar la presencia de *Poinsettia mosaic virus* (PnMV) en *Euphorbia leucocephala*, *E. fulgens*, *E. milii* y *E. heterophylla*. Se recolectaron plantas silvestres sintomáticas y asintomáticas de *E. heterophylla* en los estados de Nayarit, Michoacán, Veracruz y Guerrero, *E. fulgens* en el estado de Oaxaca, muestras vegetales de *E. leucocephala* en el banco de germoplasma de nochebuena de la Universidad Autónoma Chapingo y plantas comerciales de *E. milii* en el estado de México. Se realizaron pruebas serológicas (DAS-ELISA con anticuerpos policlonales) y moleculares (RT-PCR con iniciadores específicos) para determinar la presencia del virus PnMV. Las plantas de *E. heterophylla* presentaron un mosaico amarillo brillante, *E. fulgens* presentó deformación foliar y mosaico, *E. milii* y *E. leucocephala* síntomas de mosaico y clorosis. Los resultados obtenidos en las pruebas serológicas y moleculares fueron negativos. *Euphorbia leucocephala*, *E. fulgens*, *E. milii* y *E. heterophylla* no son hospedantes del PnMV.

MEZCLA DE VARIANTES SEVERAS DEL *Citrus Tristeza Virus* (CTV) EN VERACRUZ, MÉXICO.

[Mixture of severe variants of *Citrus Tristeza Virus* (CTV) in Veracruz, Mexico]. E. Iobana Alanís-Martínez¹, Patricia Rivas-Valencia², Eufrosina Cora-Valencia¹ y Emiliano Loeza-Kuk³.

¹Estación Nacional de Epidemiología, Cuarentena y Saneamiento Vegetal-DGSV. ²INIFAP-CE Valle de México, ³INIFAP-CE Mocochoá. rivas.patricia@inifap.gob.mx

México tiene 36 años conviviendo con el *Citrus Tristeza Virus* (CTV), las primeras detecciones de aislados severos de este virus se presentaron en 2003 y actualmente las variantes severas del virus son de mayor preocupación al detectarse en la principal entidad productora: Veracruz, Municipio de Cazonces de Herrera. Se evaluaron muestras procedentes de siete áreas con antecedentes de detección

de variantes severas de CTV en Veracruz (incluyendo huertas en las que fueron eliminados los árboles positivos) para determinar la presencia de mezclas del virus y del tipo de variante (43 muestras). Las muestras se sometieron a RT-PCR empleando iniciadores dirigidos al gen p25. Se obtuvo la secuencia del gen p25 de algunas muestras para compararlas en el Gen Bank (NCBI). Se utilizaron iniciadores específicos para los diferentes tipos de aislados T30/RB/VT/T3/T68/T36. Los resultados obtenidos indican la presencia de aislados de tipo severo (VT, T3 y T68) en el 75.5% de las muestras, el resto de las muestras (11), se obtuvo solo la presencia de T30 (variante moderada) y éste fue el que predominó en seis de las siete áreas muestreadas. La mayor combinación de mezcla de variantes se obtuvo en el Municipio de Cazonces de Herrera (T30/VT, T3/T30, T68/T3). La detección y diagnóstico oportuno del CTV, permite el planteamiento de estrategias de control y manejo del mismo.

6.5. *Oomycetos*

208

IDENTIFICACIÓN DE GENES HOMÓLOGOS A INHIBIDORES DE PROTEASAS PRESENTES EN EL GENOMA DE *Phytophthora capsici*. [Identification of homologous genes to protease inhibitors, in *Phytophthora capsici* genome]. Estefanía Ramírez-Delgado, José L. Hernández-Mendoza, Verónica Ancona, Israel García-León, Jesús D. C. Quiroz-Velásquez, Gustavo A. Frías-Treviño. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Centro de Biotecnología Genómica-IPN, Texas A&M University-Kingsville Citrus Center. biol.estefaniarmz@gmail.com

La secuenciación de genomas de diversos patógenos del género *Phytophthora* ha conducido a la identificación de genes que codifican proteínas efectoras que permiten la evasión y manipulación de la defensa de la planta. En este estudio se describe un enfoque bioinformático para la búsqueda e identificación de secuencias homólogas a proteínas inhibidoras de proteasas y glucanasas, dentro del genoma de *P. capsici*. Se tomaron como referencia inhibidores de proteínas extracelulares (EPI), inhibidores de proteasas con dominios tipo cistatina (EPIC) y proteínas inhibidoras de glucanasas (GIP) reportadas en *P. infestans*, *P. sojae*, *P. ramorum* y *P. brassicae*. La búsqueda de genes homólogos se realizó con las herramientas Trace Archive Nucleotide BLAST y UGENE 1.31. El análisis *in silico* reveló la presencia de genes homólogos a EPI10, EPIC3, PiGIP y PsGIP a partir de los cuales se diseñaron iniciadores específicos. Las secuencias obtenidas de los productos amplificadas por PCR permitieron identificar homólogos a inhibidores de proteasas tipo cistatina (PcEPIC3) e inhibidores de glucanasas (PcGIP), en el genoma de *P. capsici*.

Además, se identificó un ORF de 396 nucleótidos (nt) y 131 aminoácidos (aa) para PcEPIC3 y para PiGIP y PsGIP se determinó un mismo ORF, con una longitud de 777 nt y 258 aa. La presencia de estas proteínas permite estimar que *Phytophthora* comparte herramientas genéticas para bloquear los sistemas de defensa de la planta y ser más eficiente en la colonización de un hospedero.

209

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y PATOGENICIDAD DE *Pustula helianthicola* EN GIRASOL EN EL ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO. [Morphological characterization and pathogenicity of *Pustula helianthicola* on sunflower in the State of Mexico, Mexico]. Victoria Ayala-Escobar¹, Alma Rosa Solano-Báez², Moisés Camacho-Tapia³, Santos Gerardo Leyva-Mir⁴, Juan Manuel Tovar-Pedraza⁵. ¹Colegio de Postgraduados, Fitopatología. ²Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Ingeniería en Agronomía. ³Universidad Autónoma Chapingo (UACH), LANISAF. ⁴ UACH, Parasitología Agrícola. ⁵Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Coordinación Culiacán. juan.tovar@ciad.mx

Durante 2012–2017, síntomas de roya blanca se observaron en plantas de girasol, en lotes experimentales en la Universidad Autónoma Chapingo en Texcoco, Estado de México, México. Las plantas mostraron lesiones irregulares cloróticas en la superficie adaxial de las hojas, y abundantes pústulas sobre la superficie abaxial y en las brácteas involucrales. El objetivo de este estudio fue determinar la identidad del patógeno causante de la enfermedad mediante caracterización morfológica y pruebas de patogenicidad. La observación microscópica mostró esporangios primarios hialinos, catenados y deprimidos; los esporangios secundarios fueron

subtruncados. Las oosporas fueron subglobosas, de color café oscuro, y con patrón reticulado. Se realizaron pruebas de patogenicidad sobre 20 hojas de girasol sanas, las cuales se asperjaron con una suspensión de esporangios ajustada a 1×10^4 esporas/ml. Diez hojas de girasol que se asperjaron con agua destilada estéril, sirvieron como control. Las hojas inoculadas desarrollaron síntomas de la enfermedad 13 días después de la inoculación, mientras que las plantas control permanecieron asintomáticas. El oomicete presente en las plantas inoculadas fue morfológicamente idéntico al observado sobre plantas enfermas en campo, completando los postulados de Koch. Con base en las características morfológicas, el oomicete se identificó como *Pustula helianthicola*. Se plantea la necesidad de generar estudios enfocados a evaluar diferentes estrategias de manejo de la enfermedad.

210

PROGRAMAS BIOINFORMÁTICOS PARA EL ENSAMBLE DE GENOMAS DE *Phytophthora capsici*. [Bioinformatic programs for the *Phytophthora capsici* genome assembly]. Alfredo Reyes-Tena, José Huguet-Tapia, Erica M. Goss, Ricardo Santillán-Mendoza, Gerardo Rodríguez-Alvarado, Sylvia Patricia Fernández-Pavía. UMS-NH, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. eyesnator@hotmail.com.

La secuenciación de genomas completos de organismos fitopatógenos permite la búsqueda y caracterización de múltiples secuencias de interés. El abaratamiento de los costos de secuenciación ha incrementado la frecuencia de este tipo de estudios. Debido a la necesidad de ensamblar millones de secuencias con precisión y en el menor tiempo posible, se han desarrollado diversos programas bioinformáticos, los cuales facilitan la obtención

de genomas de calidad. El objetivo de este trabajo fue ensamblar seis genomas *de novo* del oomicete *Phytophthora capsici* usando diferentes programas bioinformáticos. Secuencias pareadas Illumina de 150 pb se ensamblaron mediante los ensambladores: Spades, MaSuRCA y Platanus-Allee, empleando un “cluster” de cómputo. Secuencias menores a 1 kb se eliminaron de los ensamblados obtenidos, los cuales se sometieron a un análisis de calidad para el cálculo de estadísticas básicas mediante el programa QUAST. La búsqueda y predicción de genes secuencias de proteínas se realizó por medio del programa Genemark_ES y se estimó la integridad de los ensamblados usando BUSCO mediante la comparación de los genes obtenidos contra una base de datos de Stramenopila. La anotación de las secuencias proteicas obtenidas se realizó con el programa PfamScan. De acuerdo con los valores de N50, L50, longitud total, el porcentaje de genes completos y la comparación de estas medidas contra el genoma de referencia, los mejores ensamblados se obtuvieron con Platanus-Allee, éste ensamblador permite la obtención de genomas de calidad de *P. capsici*.

211

SISTEMA DE INFECCIÓN *IN VITRO* PARA EL ESTUDIO DE MECANISMOS DE DEFENSA EN COCOTERO. [*In vitro* infection system for the study of defense mechanisms in coconut]. Carmen Silverio-Gómez¹, Julio Vega-Arreguín², María Narváez-Cab¹, Germán Nic-Matos¹, Carlos Oropeza-Salín¹.¹CICY, Mérida, Yucatán. ²ENES-León, UNAM. cos@cicy.com.mx.

El cocotero se cultiva en zonas húmedas tropicales ocupando 12 millones de hectáreas aproximadamente en 100 países. Aunque es un cultivo relativamente resistente, es afectado por diversos

patógenos en diferentes etapas de su desarrollo. Grandes pérdidas económicas son causadas por enfermedades letales y no letales, reduciendo su productividad. Por lo tanto, existe una necesidad de estudiar amenazas bióticas en el cocotero y diseñar estrategias para combatirlas. Las herramientas moleculares son útiles y esenciales para comprender y desarrollar estrategias de control. El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar los mecanismos de defensa sistémica adquirida/inducida en plántulas de cocotero *in vitro* infectadas con *Phytophthora capsici* y *Phytophthora palmivora*, aplicando inductores químicos como el SA y JA, para la búsqueda de genes fundamentales para la inducción de respuestas de defensa en el cocotero, generando nuevo conocimiento en mecanismos de defensa contra estos patógenos. Se evaluaron diferentes formas de inoculación con *P. capsici* en plántulas *in vitro* de cocotero, también la inoculación con *P. capsici* y *P. palmivora* en plántulas pretratadas con MeJA y SA, así como el análisis de infección causada por el patógeno por el método de resiembra en tejido de plántula inoculada. Los inóculos de ambos patógenos causaron la muerte del 100 % de las plántulas después de 40 días, indicando una relación causa-efecto por infección del patógeno. Las plántulas pretratadas con MeJA y SA, presentaron una reducción de aproximadamente el 40% del daño causado por los patógenos, lo que sugiere una probable respuesta de defensa inducida en cocotero.

212

IDENTIFICACIÓN Y PATOGENICIDAD DE HONGOS Y OOMYCETES ASOCIADOS AL AMARILLAMIENTO Y MARCHITEZ DE LA FRAMBUESA (*Rubus idaeus* L.) EN MICHOACÁN Y JALISCO, MEXICO. [Identification and pathogenicity of fungi and oomycetes

associated with yellowing and wilt of raspberries in Michoacan and Jalisco, Mexico]. Abraham Martínez-Gómez, Ángel Rebollar-Alviter, Hilda Victoria Silva-Rojas, Santos Gerardo Leyva-Mir, Moisés Camacho-Tapia, Leticia Robles-Yerena. Universidad Autónoma Chapingo, CRUCO, Morelia-Michoacán rebollaralviter@gmail.com

Entre las enfermedades de mayor importancia en frambuesa roja (*Rubus idaeus* L) se encuentran las causadas por oomycetes y otros patógenos del suelo. El objetivo de este trabajo fue identificar los patógenos causantes de la pudrición de corona y raíz en la frambuesa en Michoacán y Jalisco. Se colectaron plantas sintomáticas en parcelas comerciales. Porciones de tejido de la base del tallo, corona y raíz se sembraron en medios de cultivo PDA, V8A, y PARPH. Los hongos aislados se identificaron morfológicamente y mediante la amplificación y secuenciación del Espacio Transcrito Interno del rDNA y secuenciación parcial del Factor de Elongación TEF 1- α . Para el caso de oomycetes además de la amplificación del Espacio Transcrito Interno del rDNA se amplificó por PCR una región del gen Citocromo Oxidasa II y β -Tubulina. Las pruebas de patogenicidad se realizaron en plantas de frambuesa var. Autumn bliss de 2 meses de edad inoculando plantas a raíz desnuda para el caso de los hongos y el método de infestación de vermiculita para oomycetes. Entre los oomycetes se identificaron las especies *Phytophthora citricola* y *Phytophthora cryptogea*. Asimismo, se encontró a *Phytophthium mercuriale*, *Phytophthium helicoides* y *Phytophthium chamaehyphon*, todos causando pudrición de raíz y corona ocasionando marchitez de las plantas. Se identificaron *Fusarium oxysporum* y *Dactylonectria* sp. como especies asociadas a la necrosis radical de la frambuesa ocasionando amarillamientos en zonas productoras de Michoacán y Jalisco.

213

TIZÓN DEL EJOTE CAUSADO POR *Phytophthora capsici* EN MICHOACÁN. [Pod blight caused by *Phytophthora capsici* in Michoacán]. Alfredo Reyes-Tena, Marlene Díaz-Celaya, Nuria Gómez-Dorantes, Ricardo Santillán-Mendoza, Gerardo Rodríguez-Alvarado, Sylvia Patricia Fernández-Pavía. UMSNH, Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. eyesnator@hotmail.com.

El tizón del ejote (*Phaseolus vulgaris*) es un problema postcosecha frecuente en Michoacán. El objetivo de este estudio fue identificar al agente causal del tizón del ejote en postcosecha en Morelia, Michoacán. Se obtuvo un aislado del género *Phytophthora* a partir de ejotes que presentaban manchas café y abundante micelio algodonoso. Se determinó la morfología comparativa del aislado obtenido con base a las estructuras sexuales y asexuales. Las pruebas de patogenicidad en ejotes frescos se realizaron en cámara húmeda, colocando trozos (0.5 x 0.5 cm) de agar con micelio directamente en la superficie de los ejotes. Ejotes con agar se emplearon como controles negativos. Se re-aisló al patógeno y se corroboró su identidad mediante la observación de estructuras sexuales y asexuales y la amplificación del gen de la enzima citocromo oxidasa 1 (CO1). La secuencia obtenida se comparó contra la base de datos del GenBank mediante análisis BLAST (NCBI). El aislado mostró esporangios elipsoides, globosos, limoniformes, papilados, con pedicelo largo y caduco, dispuestos en un esporangióforo simple simpódico. Se registraron oosporas pleróticas con anteridio anfígino y el tipo de compatibilidad sexual fue A1. Se observaron manchas café alrededor del sitio de infección y abundante micelio higroscópico en los ejotes inoculados con el patógeno 24 h después de la inoculación.

De acuerdo a las características morfológicas y moleculares el agente causal del tizón del ejote es *Phytophthora capsici*. Este es el primer reporte de *P. capsici* causando tizon en ejote en postcosecha en México.

214

EFEECTO ANTIFÚNGICO DE EXTRACTOS HEXÁNICOS DE GOBERNADORA (*Larrea tridentata*) SOBRE *Pythium sp.* y *Sclerotium rolfsii* IN VITRO. [Antifungal Effect of Ethanolic Extract of Gobernadora (*Larrea tridentata*) on Inhibition of *Pythium sp.* and *Sclerotium rolfsii*]. Adolfo Padilla-Mendiola, Ivonne Jaqueline Cordeiro-García, Elva Marcela Coria-Quñones, Sandra Iliana Torres-Herrera, Diana Barraza-Jiménez, Manuel Alberto Flores-Hidalgo. Facultad de Ciencias Químicas Durango Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) ingpadilla@hotmail.com

Se evaluó la actividad fungicida de *Larrea tridentata*, colectada en el estado de Durango: Cuencame, Gómez Palacio y Bermejillo. Se evaluaron, los estados de floración y no floración mediante bioensayos inhibitorios para los hongos caracterizados como *Sclerotium rolfsii* y *Pythium sp.* a dosis de 0, 500, 750, 1000 y 2000 ppm y un blanco solvente, mediante la técnica de crecimiento radial. La resina de hojas, de ramas pequeñas y de ramas gruesas fue extraída con hexano. Los resultados fueron analizados mediante un diseño completamente al azar de tres factores. Factor A, con cinco niveles: tres zonas de recolección y estado de floración y no floración; Factor B: 4 concentraciones y Factor C: tiempo de incubación que fue de 8 días para *S. rolfsii* y de 29 días para *Pythium sp.* El análisis de los rendimientos obtenidos mostró diferencias para las zonas de recolección y la parte de las plantas utilizadas. El mayor rendimiento fue de 14.65% y

se obtuvo para hojas recolectadas de la localidad de Gómez Palacio en estado de no floración. La mayor inhibición la mostraron las especies en floración, tanto de Bermejillo como de Gómez Palacio a una concentración de 750 ppm, para *S. rolfsii*. Mientras que para *Pythium* sp. No hubo diferencias significativas entre concentraciones probadas y zonas de recolección, pero si entre los extractos y el testigo y el blanco solvente.

215

EFFECTO ANTIFÚNGICO DE EXTRACTOS ETANÓLICOS DE GOBERNADORA (*Larrea tridentata*) *in vitro* SOBRE *Pythium* sp. Y *Sclerotium rolfsii*. [Antifungal Effect of Ethanolic Extract of Gobernadora (*Larrea tridentata*) on *Pythium* sp. and *Sclerotium rolfsii*]. Adolfo Padilla-Mendiola, Brian Armstrong Rodríguez-Carrillo, Elva Marcela Coria-Quñones, Sandra Iliana Torres-Herrera, Diana Barraza-Jiménez, Manuel Alberto Flores-Hidalgo. Facultad de Ciencias Químicas Durango Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). ingpadilla@hotmail.com

La gobernadora (*Larrea tridentata*), es un arbusto, sus hojas presentan resina que contiene metabolitos secundarios, entre los que destacan fenoles, lignanos y flavonoides que actúan como defensas bioquímicas para repeler la agresión de microorganismos como los hongos. Numerosos estudios han demostrado que los extractos de gobernadora tienen acción antifúngica bajo condiciones *in vitro* en al menos 17 hongos fitopatógenos de importancia económica, pero pocos trabajos se han realizado con la planta procedente del estado de Durango. En el presente estudio se evaluó la eficiencia de extractos vegetales de *L. tridentata* obtenidos con etanol, para los bioensayos *in vitro* se aplicó un diseño completamente al azar con tres factores

la zona de recolección conjunto con el estado de floración, concentración de los extractos (0, 250, 500, 1000, 2000 y 3000 ppm) para ambos hongos y tiempo de incubación en días. Se realizaron cuatro repeticiones y los experimentos fueron corridos para cada hongo y para las hojas y tallos procedentes de la planta; se trabajó con *Sclerotium rolfsii* y *Pythium* sp. En cuanto a las pruebas *in vitro*, se determinaron inhibiciones del 100% para *S. rolfsii*, con extracto etanólico a partir de una concentración de 500 ppm y 90.91 % para *Pythium* sp. a 3000 ppm. Se concluye que los extractos de *L. tridentata* obtenidos con etanol son efectivos para el control de los hongos fitopatógenos bajo estudio *in vitro*.

216

VARIABILIDAD MORFOLÓGICA Y SENSIBILIDAD DE *Phytophthora capsici* CAUSANDO MARCHITEZ EN CHILE PIMIENTO MORRÓN EN CHIHUAHUA, MÉXICO. [Morphological variability and sensitivity of *Phytophthora capsici* causing wilt in bell pepper in Chihuahua, Mexico]. Celina Sánchez-Gurrola, Nuria Gómez-Dorantes, Gerardo Rodríguez-Alvarado, Sylvia Patricia Fernández-Pavía*. Laboratorio de Patología Vegetal-IIAF. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Graciela Ávila-Quezada. Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, Universidad Autónoma de Chihuahua. *Autor de Correspondencia: fpavia@umich.mx

A nivel mundial, México es el principal exportador del chile pimiento morrón. El cultivo es afectado por diversas enfermedades, siendo la marchitez del chile ocasionada por *Phytophthora capsici* una de las más importantes. Este fitopatógeno posee alta variabilidad en virulencia y sensibilidad a fungicidas. No existen en México estudios sobre poblaciones de *P. capsici* para pimiento morrón.

El objetivo de este trabajo fue determinar la variabilidad de aislados de *P. capsici* obtenidos de plantas de pimiento morrón con marchitez en Delicias, Chihuahua, México, mediante los marcadores fenotípicos: patrón de crecimiento de la colonia, tipo de compatibilidad, virulencia y sensibilidad a fungicidas. Los tipos de colonia fueron: estrellado (74%), ligeramente petaloide (14%) y radial (12%). Se detectaron aislados sensibles (53%), con sensibilidad intermedia (42%) e insensibles (5%) a mfenoxam. El 86.6% de los aislados inoculados

fueron altamente virulentos, produjeron síntomas cuatro días después de la inoculación. Se detectaron los dos tipos de compatibilidad (TC) A1 y A2. Se formaron oosporas in planta al inocular los dos TC detectados en una misma planta. Los resultados sugieren que existe reproducción sexual en campo, lo que puede explicar la alta variabilidad en las características evaluadas entre los aislados de *P. capsici*, responsables de la marchitez en cultivos de chile pimiento morrón.